


Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1825/A





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1825/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1825/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1825/A

1825 A

A. XXIX: D^{ed}


A 737


26. K. ③ 18741

MS. T.
Paris 8/07

Ith

73 2. 2.





18741

PRAXIS MEDICA
REMBERTI
DODONÆI ME-
CHLINIENSIS.

*Ex Libris Dionisij de Pona medicij
1627*



AMSTERDAMI,
Impensis Henrici Laurentij.
ANNO 1616.

Fabricando F'it Faber



Lectori benevolo.



N tibi, Candide Lector, Praxin Medicam D. Remberti Dodonæi Viri Excellentissimi, & in artis operibus per multos annos, inque varijs regionibus exercitatissimi; facili quidem, sed dilucido tamen, stilo scriptam, & quæ Medico practico necessaria sunt, ὡς ἐν συνοψείᾳ continentem. In ordine Pauli Æginetæ filum secutus illius libros hoc scripto non solùm explicare, sed & ad usum, curandique modum hoc tempore usitatum, accommodare, conatus est. Maluissimus quidem editionem hanc procurasse illos, quibus autor hoc mandasse perhibetur: sed quum id hactenus non fecerint, nec dein id facturos sperari possit, Typographo id petenti exemplar nostrum libenter concessimus. Plurima quidem hujus generis scripta reperiuntur; sed non pauca sunt, de quibus vetus illud verè dici possit; ὀλίγον κρείσσον, ὅσα πολλὰ. at bonam operam Provinciæ Medicæ navasse putandi sint, qui aurum de terra selectum, lectoribus proponunt. quum enim artem longam, vitamque brevem esse certissimum sit, quæ dementia fuerit, in inutilia, &

quæ ad ægros curandos nihil faciunt, bonas horas malè, & inutiliter locare?

Statuerat Dodonæus noster isti scripto tractatum peculiarem de arthritide subungere; sed quod ab alijs in Causis istius Affectus dissentiret, ut accuratius id facere posset, distulit; nec morte præventus, quod pollicitus fuerat, præstare potuit.

Porro quæ margini adscripta vides partim ex autoris illa quæ dictarat fusius explicantis ore excerpta; partim à nobis interjecta scias. quæ si non tanti ut in publicum darentur, fuisset judices, pro non adjectis habeas. Vale, & opellam hanc nostram, propter circumsilientium occupationem agmina, non minus accuratam, æqui bonique consule.

Philiatrīs.

Q*ui cupit egregiā Medicinæ addiscere Praxin.
Hunc legat ac relegat nocte dieq; librum:
Est brevis & clarus, coryphæis equiparandus
Auctor; ubique suum non leve pondus habet.
Hujus & auditor Phæbi clarissimus artem
Explicat, augmentat: Dignus uterque legi.*

M. Herculani Blonck Med.

Libri primi capita.

- F**ebres. cap. 1. pag. 1.
Putridæ. cap. 2. pag. 6.
Tertiana intermittens. cap. 3. pag. 11.
Tertiana spuria. cap. 4. pag. 17.
Quartana. cap. 5. pag. 20.
Erroneæ. cap. 6. pag. 29.
Quotidiana. cap. 7. pag. 31.
Epiala. cap. 8. pag. 34.
Continuæ. cap. 9. pag. 36.
Synochi. cap. 10. pag. 39.
Ardens exquisita. cap. 11. pag. 44.
Ardens non exquisita. cap. 12. pag. 48.
Feb. ex erysipel. affectu. cap. 13. pag. 50.
Hæctica. cap. 14. pag. 53.
Marasmus. cap. 15. pag. 57.
Semitertiana. cap. 16. pag. 61.
Morbi publicè grassantes. cap. 17. pag. 67.
Pestis. cap. 18. pag. 72.
Febris puncturalis. cap. 19. pag. 84.
Variolæ & morbilli. cap. 20. pag. 87.
Febres cum animi deliquio ingruentes. cap. 21.
pag. 90.
Dolor. cap. 22. pag. 96.
Vigiliæ. cap. 23. pag. 99.
Syntexis. cap. 24. pag. 102.
Cataphora. cap. 25. pag. 105.
Capitis dolores in feb. cap. 26. pag. 106.
Sudores. cap. 27. pag. 108.
Tussis. cap. 28. pag. 110.

Starnutamentum. cap. 29. pag. 111.
Sitis. cap. 30. pag. 112.
Nausea cap. 31. pag. 114.
Vomitus. cap. 32. pag. 117.
Singultus. cap. 33. pag. 118.
Sanguinis fluor in feb. cap. 34. pag. 121.
Vlcus circa os sacrum. cap. 35. pag. 123.
Epicarpia. cap. 36. pag. eadem.

Libri secundi capita.

A Lopecia, defluvium capillorum &c. externa
capitis vitia. cap. 1. pag. 125.
Cephalalgia. cap. 2. pag. 132.
Hemicrania. cap. eod. pag. 159.
Phrenitis. cap. 3. pag. 166.
Erysipelas cerebri. cap. 4. pag. 172.
Erysipelas faciei. cap. 5. pag. 174.
Erysipelas crurum aut aliarum partium. cap. 6.
pag. 176.
Mania. cap. 7. pag. eadem.
Carus cap. 8. pag. 179.
Lethargus cap. 9. pag. 186.
Catochus. cap. 10. pag. 191.
Memoria læsa. cap. 11. pag. 194.
Melancholia. cap. 12. pag. 198.
Epilepsia. cap. 13. pag. 210.
Vertigo. cap. 14. pag. 217.
Apoplexia. cap. 15. pag. 220.
Paralyfis. cap. 16. pag. 227.
Stupor. cap. 17. pag. 236.
Convulsio. cap. 18. pag. 238.

Tre-

Tremor. cap. 19. pag. 245.
Palpitatio. cap. 20. pag. 249.
Ophthalmia. cap. 21. pag. 251.
Angina. cap. 22. pag. 268.
Destillatio. cap. 23. pag. 283.
Raucedo. cap. eod. pag. 288.
Tussis. cap. 24. pag. 290.
Respirationis difficultas. cap. 25. pag. 297.
Sanguinis sputum. cap. 26. pag. 309.
Hæmorrhagia. cap. 27. pag. 330.
Pleuritis. cap. 28. pag. 335.
Peripneumonia. cap. 29. pag. 349.
Empyema. cap. 30. pag. 361.
Phthisis. cap. 31. pag. 364.
Palpitatio cordis. cap. 32. pag. 375.
Syncope & lipothymia. cap. 33. pag. 385.
Cardialgia. cap. 34. pag. 391.
Inappetentia. cap. 35. pag. 394.
Appetentia depravata. cap. 36. pag. 400.
Bulimia. cap. 37. pag. 403.
Κίτλα. cap. 38. pag. 405.
Sitis. cap. 39. pag. 409.
Nausea & vomitus. cap. 40. pag. 413.
Imbecillitas ventriculi. cap. 41. pag. 419.
Cruditus. cap. 42. pag. 424.
Inflatio ventriculi. cap. 43. pag. 430.
Inflammatiō ventriculi. cap. 44. pag. 432.
Cholera. cap. 45. pag. 436.
Diarrhœa. cap. 46. pag. 438.
Lienteria. cap. 47. pag. 454.
Dysenteria. cap. 48. pag. 458.
Tinesmus. cap. 49. pag. 481.

Para-

Starnutamentum. cap. 29. pag. 111.
Sitis. cap. 30. pag. 112.
Nausea cap. 31. pag. 114.
Vomitus. cap. 32. pag. 117.
Singultus. cap. 33. pag. 118.
Sanguinis fluor in feb. cap. 34. pag. 121.
Vlcus circa os sacrum. cap. 35. pag. 123.
Epicarpia. cap. 36. pag. eadem.

Libri secundi capita.

A Lopecia, defluvium capillorum &c. externa
capitis vitia. cap. 1. pag. 125.
Cephalalgia. cap. 2. pag. 132.
Hemicrania. cap. eod. pag. 159.
Phrenitis. cap. 3. pag. 166.
Erysipelas cerebri. cap. 4. pag. 172.
Erysipelas faciei. cap. 5. pag. 174.
Erysipelas crurum aut aliarum partium. cap. 6.
pag. 176.
Mania. cap. 7. pag. eadem.
Carus cap. 8. pag. 179.
Lethargus cap. 9. pag. 186.
Catochus. cap. 10. pag. 191.
Memoria læsa. cap. 11. pag. 194.
Melancholia. cap. 12. pag. 198.
Epilepsia. cap. 13. pag. 210.
Vertigo. cap. 14. pag. 217.
Apoplexia. cap. 15. pag. 220.
Paralysis. cap. 16. pag. 227.
Stupor. cap. 17. pag. 236.
Convulsio. cap. 18. pag. 238.

Tre-

Tremor. cap. 19. pag. 245.
Palpitatio. cap. 20. pag. 249.
Ophthalmia. cap. 21. pag. 251.
Angina. cap. 22. pag. 268.
Destillatio. cap. 23. pag. 283.
Raucedo. cap. eod. pag. 288.
Tussis. cap. 24. pag. 290.
Respirationis difficultas. cap. 25. pag. 297.
Sanguinis sputum. cap. 26. pag. 309.
Hæmorrhagia. cap. 27. pag. 330.
Pleuritis. cap. 28. pag. 335.
Peripneumonia. cap. 29. pag. 349.
Empyema. cap. 30. pag. 361.
Phthisis. cap. 31. pag. 364.
Palpitatio cordis. cap. 32. pag. 375.
Syncope & lipothymia. cap. 33. pag. 385.
Cardialgia. cap. 34. pag. 391.
Inappetentia. cap. 35. pag. 394.
Appetentia depravata. cap. 36. pag. 400.
Bulimia. cap. 37. pag. 403.
K^hl^a. cap. 38. pag. 405.
Sitis. cap. 39. pag. 409.
Nausea & vomitus. cap. 40. pag. 413.
Imbecillitas ventriculi. cap. 41. pag. 419.
Cruditus. cap. 42. pag. 424.
Inflatio ventriculi. cap. 43. pag. 430.
Inflammatiō ventriculi. cap. 44. pag. 432.
Cholera. cap. 45. pag. 436.
Diarrhœa. cap. 46. pag. 438.
Lienteria. cap. 47. pag. 454.
Dysenteria. cap. 48. pag. 458.
Tinesmus. cap. 49. pag. 481.

Pura-

Purulentus secessus. cap. 50. pag. 485.
Colicus dolor. cap. 51. pag. 486.
Ileus. cap. 52. pag. 494.
Vermes. cap. 53. pag. 503.
Hæmorrhoides. cap. 54. pag. 513.
Inflammatio jecoris. cap. 55. pag. 525.
Scirrhus jecinoris. cap. 56. pag. 531.
Obstructio jecinoris. cap. 57. pag. 535.
Inflatio hepatis. cap. 58. pag. 539.
Imbecillitas hepatis. cap. 59. pag. 540.
Icterus. cap. 60. pag. 550.
Lienis inflammatio. cap. 61. pag. 559.
Scirrhus & obstructio lienis. cap. 62. pag. 564.
Magni lienes, & Scorbutus. cap. 63. pag. 567.
Cachexia. cap. 64. pag. 572.
Hyposarca. cap. 65. pag. 575.
Ascites. cap. 66. pag. 580.
Tympanites. cap. 67. pag. 589.
Renum affectus, & calculus. cap. 68. pag. 593.
Stranguria & dysuria. cap. 69. pag. 605.
Ishuria. cap. 70. pag. 616.

PRAXIS

PRAXIS MEDICINÆ

REMBERTI DODONÆI.

De Febribus.

CAP. I.

Febbris est calor extraneus, seu præter naturam, corpus infestans, & cordi communicatus.

1. Febris à fervēdo dicta creditur. Πυρετός apud Græcos ab igne, quàm πυρ, ut & ipsam quandoq; Febrem, præsertim ardētissimam, appellant. Hippocr. passim. Orientales itidem linguæ ab incendio deducta voce Febrem denominare solent. Deuteronom. 28. v. 22. Germani contrà, à præcedente Horrore, vel Rigore, das Kaltvree, der frörer; Belgæ olim, die Zage, quæ vox metum denotat, vocabant (ut Latini veteres Querquerā) nunc, die coortse, forte à cooren, quod nauseare significat. Tam frequens autem hic morbus est, ut quidam veterum neminem sine illa mori contenderint: & febris vocē pro quovis morbo posuerint, sic Horat. pro illo Hesiodi; Νόστι δ' ἀνδρώποισι Φοιτῶσι; Nova Febrium terris incubuit cohors, reddidit. Romani itaque Febri inter ceteros cruciarios exitus erogando homini deputatæ, ut cum Tertulliano loquamur, templum & aram sub monte Palatino, statuerunt. Ælian. var. histor. l. 12. c. 11. eiqua sacrificabant. Clem. Alex. in protrept. 2. Actionesq; consuetas ledens. nam siquidem seipso calidior factus sit aliquis, neutrum tamen horum patiatur, talem sanè febri citare nondum dicimus. Gal. 8. meth. med. 3. Vbi fons caloris nativi. 2. de fractur. quem in præter naturalem converti oportet, ut febris sit.



4. Vitalibus potissimum,
& Naturalib. qui num-
dentur, controverti ta-
mē solet. Animales Mer-
curial. nihil detrimenti
pati, adserit. Contra-
rium Bertrut. credidisse
videtur. cui & nos magis
adsentimur. quamvis ob-
temperie & paucitatem
non magnum forte mo-
mentum ad febris gene-
rationem afferant. Est
autem Febrium essentia
in caliditate præter na-
turam, quæ pro materia
paria est. 1. de Febr. b.
& 10. Meth.

5. ΕΦΗΜΕΡΟΙ, & ΠΟ-
ΛΥΗΜΕΡΟΙ opponuntur.
8. Meth. c. 8.

6. Officiositas, sedulitas,
& opella forensis Ad-
ducit febres &c. Horat.
1. epistol.

7. Ad lactis generatio-
nem consequuntur Ephe-
meræ tertio, quarto, vel
quinto die in puerperis.
Amat. cent. 1. curat. 34.
Referunt, inquit Car-
dan, in flumine Arotam

Accenditur autē hic vel
in Spiritibus, vel in Humo-
ribus, vel in Solidis parti-
bus. In Spiritibus calor ex-
traneus febrem procreat
Ephemerā, seu Diariam; in
Humoribus, Putridam; in
solidis corporis Partibus,
Hecticam.

Simplicissimæ, ac mitissi-
mæ, minimèque periculosa
sunt, Ephemeræ. Diemistæ
non excedunt, propter te-
nuitatē Spiritus in quo con-
sistunt, qui diu excedentem
Calorem non retinet: Et
quia idem blandus ac va-
porosus, mites quoque, ac
minimè vehemētes [sunt.]
Causæ sunt; ex labore, vel
alia motione corporis, las-
situdines. Ebrietates, maxi-
mè ex vini potu. Exustio,
sive corporis supercalefa-
ctio; veluti ex diutina sub
sole mora. Refrigeratio ni-
mia. Vigilia excedens. Ira-
cundia, & quævis animi ve-
hemens motio, ut subita-
neus, gravisque metus. 7

Signa sunt, 1. Calor mi-
tis, non mordax, non acris,
absque

absque rigore invadens, & insula beatissime Zeilan
 citra evidentē alicujus par- esse piscium genus quod
 tis dolorem; & cum levi manu deprehensum fe-
 • sudore, sive madore roru- brē accendat. 10. l. Sub-
 lento, desinens. 2. Pulsus tilit. Amisso pisce statim
 ad magnitudinem, & cele- liberatur qui eum tene-
 ritatem quidem in ipsa Ac- bat. Febriū idcirco ap-
 cessione accedens, sed qui pellavimus eum. Ceterū
 mox cessante hac ad natu- piscosissimus hic est flu-
 ralē statum revertatur, ne- vius. verū pisces illi neu-
 que ullam inæqualitatē præ tiquā esculēti sunt. Sca-
 se ferat. 3. Urina qualis fa- lig. Exercit. 218. §. 6.
 norum, quæ si talis postri- 8. Quum Ephemera in
 die perstiterit; pulsu quo- Spiritibus, unde sudor,
 que ad naturalem constitu- aut saltem mador in il-
 tionem reverso, non aliam larū declinatione? Spi-
 febrem quàm Ephemeram ritus calefactus dum ex-
 fuisse sperandum est. nam, cernitur, succum in su-
 ut Galenus ait, ex solutionis perficie corporis repar-
 modo species Febris cer- tū, in sudores attenuat,
 tius cognoscitur. in Diarijs & secū ducit. Stephan.
 enim cessante Accessione Athan. comm. 8. in libr.
 omnia simul abolentur. do- ad Glaucon.
 lores, si qui fuerint, non am- 9. Urinæ in Bubonum
 plius manent. Ephemerâ pallidæ, pri-
 vationebilis ad Inflam-

Curatio omniū Diaria- mationē vergētis, quem-
 rum Februm per Balnea, admodum in Phreniti-
 autore Galeno fit, acceden- cis. Sæpè tamē in his ob-

servavimus Urinas biliosas; quod fit in habitu biliosiore.
 unde & tunc Erysi pelatodes inflammatio est. Stephe-
 Athen. comm. 18. &c.

PRAXIS MEDICINÆ

te idonea victus ratione. Ægineta verò subinde etiā Frictiones adhibet, & quādoque corpus oleo perfundijubet; modo uno, modo alio, pro ratione efficientis Causæ. Verum, quum nunc Balneorum, Frictionum, ac Perfusionum usus cessarit, Victus rationi maximè insistendum est.

Ex labore igitur lassī ac defatigati, frequentius cibandi sunt, exhibendusque ipsis cibus facilis concoctionis; & vini usus mediocris permittendus. Parcius nutriendi qui ex Ebrietate in Diariam inciderunt Febrē¹⁰. Qui verò ab exustione, aut super calefactione, aut diuturna sub sole mora febricitarunt, Cibo humidiorē reficiendi sunt. Refrigerati verò, & quibus cutis adstricta est, siquidem humorum non adsit plenitudo, mediocriter alendi sunt, admissō etiā vini usu. Vehementer autem Refrigeratos, si humorum copia adsit, à vino abstinere expedit.

10. Ingeniosissimus seculi nostri medicus Cassius, quē nuper vidimus, febricitanti cuidam & magna siti affecto, quum post ebrietatē eum premi cœpisse cognosceret, aquam frigidam ingessit. quā ille epotā, quum vini vim miscendo frengisset, protinus febrē somno, & sudore discussit. quod auxiliū medicus oportunè prævidit, ex causa quæ ante præcesserat. Celsus in præfat.

pedit. Inter Diarias Febres,
 præter illas quæ ex supra-
 dictis causis factæ sunt, re-
 feruntur & à Galeno, & ab
 Ægineta quæ cum Buboni-
 bus superveniunt¹¹. Causæ
 autem harum Februm non
 sunt ipsi Bubones, sed ex
 alijs causis simul cum Bu-
 bonibus gignuntur. Appa-
 rentibus igitur Bubonibus
 vel in Inguinibus, vel sub
 alis, vel in collo, confide-
 randum est, An simul cum
 Febribus, vel mox initio ap-
 pareant, vel post Febres
 diurnas succedant. Nam
 qui Febribus diurnis suc-
 cedunt Abscessus sunt per
 quos Febres terminantur¹²,
 & boni sunt. Qui una cum
 Febri, vel initio superve-
 niunt, duplices sunt; vel
 enim citra manifestam ac-
 apparentem causam gignun-
 tur; Et tales¹³ maligni &
 pestilentes habentur; præ-
 sertim accedentibus & alijs
 malis signis: Aut ex mani-
 festis causis originem ha-
 bent; Et tales non maligni
 sunt; Et Febres quæ ipsos

¹¹. Ad tumorem exter-
 nū in Emunctorio, præ-
 sertim parvū, non sequi-
 tur nisi Ephemera. nam
 vapores putridi tū per-
 veniunt ad cor, non cum
 sua substantia, sed cū
 suā virtute & alteratio-
 ne solā. Bertruzius.

¹². Omnes Crises cum
 manifesta evacuatione
 sunt, vel cum Abscessu.
 Hippocr. 3. Progn. Ca-
 lidi humores ad excre-
 tionem commodi; crassi
 in Abscessus abeunt. Ib.
 Crassi autē sunt in mor-
 bis diurnis. Gal. 2. de
 crisib. c. 11.

¹³. Vide comment. 59.
 libri 4. Aphor.

A

PRAXIS MEDICINÆ

comitatur inter Diarias reponuntur. Manifestæ causæ sunt, ut Ulcera crurum, vel brachiorum; dolores magni pedū, aut manuum, aut digitorum. item, & casus, ictus, vel aliqua similis manifesta causa.

Ex huiusmodi causis si supervenient Bubones & simul Febres, causis occurrendū est, quibus desinentibus Febres etiam cessant. Interea tamē æger tenuiori victu nutriendus est, & à vino arcendus, ut Galenus & Aegineta suadent.

De Febribus putridis.

CAP. 2.

¶. Alterius generis Februm quod in divisione opponitur Diarijs, commune quidem nomē non habetur; differentia tamen illarum duæ sunt, quæ non obscuris speciebus seu formis distinguuntur. nam quædam ipsarum ab humorum putredine succenduntur; quædam ipsas solidas animalis invadunt partes, quas Hæcticas vocant. Gal. 1. de diff. Febr. 6. 7.

Febres, quæ ex corruptione Humorū proveniunt, Putridæ appellantur. propterea quod ex corruptis, & à natura sua permu-

tatis

tatis • Humoribus , originem habeant.

Duplices autē istæ sunt. vel enim Symptomaticæ, si-
ve Accidentales [sunt,] ut
quæ ad Inflammationes, &
Erysipelata consequuntur:
Vel per se consistūt. de qui-
bus nunc agendum. Con-
tingit tamen quandoque ex
Sanguine fieri Febrem ci-
tra corruptionem, ut in Sy-
nocho. sed hujusmodi Fe-
bres non diu permanent ta-
les; sed citò in Putridas per-
mutantur, nisi tempestivè
remedium adhibeatur.

Putridarum autem Fe-
brium quædam Continuæ
sunt¹; quædam Intermit-
tentes, ut sunt Quotidianæ,
Tertianæ, Quartanæ, & Er-
raticæ.

Agnoscentur autem Pu-
tridæ septem modis. 1. Ex
Causis. si enim nulla præ-
cesserit Externa & manife-
sta causa, Putrida est Fe-
bris, à causa proveniens In-
trinseca, si-ve Antecedente.
2. Ex Urinis, quæ in istis
Febribus à naturali colore,

2. Putredo enim est es-
sentia totius corporis
putrescentis in corrup-
tionē ab externo calore,
commutatio. Gal. 11.
Meth. Hujus autem ini-
tium calorem internum
intendit, & igneum, hoc
est, febrilem facit. Est
verò, ut in Tumoribus,
sic & in Vasis, Humo-
rū duplex Putredo; ex
quarum mixtione tertia
resultat ac provenit.

1^a. Quæ fit vincente Na-
tura, ac manente adhuc
Partium, ac Vasorum
Coëctrice facultate; quæ
non solum Putredo, sed
& Coëctio quædam est.

2^a. Quæ fit Natura vi-
cta, & Coëctrice usque-
adeo debili ut nullam in
bonū mutationē produ-
cat. 3^a. Quando ex his
mixtis, quasi Semiputre-
do quædā existit. Gal. 1.
de differ. Febr. c. 6.

3. Quando focus Putre-
dinis in Vasis quæ intra
Alas, & Inguina excu-
runt.

4. Quia pars humorum putrescentium sunt.

5. Concoctio enim, ut omnis alia naturæ actio, non nisi in tempore fieri potest.

6. Quia necessitas refrigerationis nondū magna est, ut in Augmento.

7. Ut fulgines circa præcipua hærentes viscera quanto ocius expellantur.

8. Propter putridos humores viscerum principalium, inprimis verò Cordis Vires quasi aggravantes.

9. Quæ propter revocationē naturæ, nocuementi sensum percipientis; & propter vellicationem membranarū aliarumq; sentientium partiū quæ in præcordijs existunt, ab humoribus acribus, magis minusve motis, fieri consueverunt.

& substantia mutantur⁴; & initio⁵ crudæ sunt. 3. Ex Pulsu, qui in Accessionis initio parvus est, & exiguā faciens *Ἀσολῶ*,⁶ velocem habet *συσολῶ*; ⁷ qui & hac de causâ, depressus dicitur: in Augmento verò Accessionis ad frequentiam & magnitudinem mutatur: Et utroque tempore Inæqualis⁸ est. 4. Ex Frigore, aut Horrore, aut Rigore in Initio Accessionis, quæ Febrē esse Putridā, & Intermittentē ostendunt. 5. Ex Caloris specie in Augmento, aut Statu Accessionis. si enim acris ac mordax tangenti sentitur calor ex putredine Febrē esse constat. 6. Ex Circuituum reditu. nam Ephemera non habet Accessiones plures quam unam. Putridæ autem plures habent Accessiones. 7. Ex diuturnitate Accessionis. Ephemera enim nō extēditur ultra viginti quatuor horas: Synochus non habet Accessiones, sed in multos dies prorogatur.

Putri-

Putridarum Febriū Curatio primò fit per Venæ sectionem. Optimum enim,

Curatio generalis Putridarum Febrium.

inquit Gal.¹⁰ in omnibus Febribus quas putrescens humor procreat Sanguinē mox detrahare; modo Vires ferat, ac imbecillitas ac cruditas Ventriculi non obstant. 2. Per ea quæ Humores contemperant, concoquunt, lentes incidunt, crassos attenuant ac ad expurgationem idoneos reddunt; quæ talia esse debent ut Viscera etiā expurgent.

3. Per mollientia Enemata. quādo videlicet alvus dura est, & opportunū non fuerit Purgans medicamentum exhibere; veluti in die Accessionis; vel materia morbi adhuc existente cruda.

4. Per Medicamenta quæ vitiosos Humores concoctos & præparatos per alvū subducunt. 5. Aliquando, sed tamen rarò per

Vomitiones. Et tunc quidē quando natura suā sponte ad has fertur, & conatur vitiosos humores expellere

10. *Meth. med. l. 11. cap. 14.* Natura namq; quæ corpora nostra gubernat, sublevata, & illo quod ipsam gravabat onere deposito, reliquū facilius vincet, & propriarum facultatū memoria veluti revocata, quod concoqui aptū est, concoquet, quod verò expelli poterit, expellet. *Ib. c. 15.*

11. *Vomitiones hominī monstrasse canis videtur. Plinius l. 29. c. 4. Vide eundē l. 11. c. 37. Damnavit has Æsclepiades. Id. l. 26. c. 3. & Cels. l. 1. c. 3. Si tamen natura suo sponte ad has fertur, quo vergit ducere oportet. 1. Aphor. 28*

12. *Vieta, & Potua* san-
ctissima Dea victui po-
tuitq; præerant, ut Ar-
nob. 3. contra gentes re-
fert. Victum appello, in-
quit Gal. non hunc tan-
tum qui in cibis, & poti-
bus est, sed & qui in
omnibus alijs, ut otio,
exercitijs, balneis, vene-
re, somno, vigilijs, alijsq;
omnibus quæ quomodo-
cunque in hominum cor-
poribus fiunt. Gal. 3.
epid. sect. 3. comm. 9.
Victus autem ratio Me-
dicinæ quæ per se mag-
na est, non minimi mo-
menti pars existit. Me-
thodi 11. c. 15.

13. *Vix, nisi in univer-*
sali declinatione; quod
etiam tum vel decocto
hordei, vel aqua aliqua
stillatitia ut cicchorij,
acetosæ &c. diluere satius erit. Vinum quod in Thebaide
[Ægypti,] & maxime circa Copton civitatē provenit tam
tenue est, tamq; facile distribuitur, citoq; concoquitur, ut
febricitantibus datum minimè illos lædat. Athenæus 1. di-
pnosoph. in fine. Tale nostrum Rhenanum existit.

per vomitum, & non po-
test. tunc aliquid exhiben-
dum quod vomitionem ad-
juvet, ut Syrupus acetosus
simplex per se, vel cū aqua
decoctionis ptisanæ. Con-
tingit tamen quandoque ut
Febres Quartanæ, Errati-
cæ, diurnæ, & pertinaces
per Vomitorium medica-
mentum curentur. 6. Cu-
rantur Febres per 12. Victus
rationem, quæ & in om-
nium morborum curatio-
nibus plurimum habet mo-
menti, & absque qua nul-
lus morbus rectè curari
potest. Ad Victus rationem
pertinent & illa Potionum
genera quæ ab Ægineta re-
feruntur. Item Vinum te-
nue & pauciferum, quod in
Febribus intermittentibus
nullo præsentē Capitis do-
lore, 13. admittitur. sed in
Febre vehementi, & quan-
do Ca-

do Capitis dolores adsunt 14. *Præmissis vacuationibus. de quib. jã dictum.*
 7. Providendum est Visceribus per Fomenta, Olea, Unguenta, aut Emplastra 14. *Requiritur autẽ ut initio Repellentia sint; In declinatione, laxantia, discutientiaq. sic tamen ut quæ nobiliorib. admoventur partib. præcipuè hepatis, Ventriculo, semper quid illorum admixtum habeant quod tonum & robur indere partib. istis possit. Vide Gal. 11. Meth. c. 15. &c.*
 Balneorũ verò, & Vnctionum totius corporis, quorum Ægineta mentionem facit, nunc nullus est usus: sicuti neque Potionis aquæ frigidæ, aut in frigida aqua natationis,

De Tertianâ Febre Intermitte.

CAP. 3.

Tertianæ Febres idcirco dicuntur quod tertio die recurrant.

Duplices autem hæ sunt; vel enim puræ sunt, sive exquisitæ; vel impuræ sunt, sive non exquisitæ; quæ & nothæ & spuria dicuntur. Pura est quæ sola Bile cum Sanguine putrescente gignitur. Incipit hujus Accessio cum Rigore, hoc est, cum Frigore, & voluntario Motu depravato, ab acri & bilioso humore musculos

1. Sanguis tamen, propriè loquendo, alijs putrescere non dicitur. quum enim putruit, in alios humores, bilem nempe, & melancoliam vertitur. quum putrescere incipit putridus dici vix potest, quod causa putredinis remota possit ad suam naturam redire. Gal. comm. 17. aph. libr. 2. Vide Oddu de Oddis in 1. fen. Avic. c. de humorib.

2. Initio paroxysmorum magis quam alio illius tempore; quod tum propè centrum hæreant qui febrem producant humores; post illud vero ad paripheriam magis ferantur.

3. Quâ flavabilis augeri solet. Vide 3. Aphor. 21

4. 3. Aph. 29. quia flavabilis in illis maximè redundat. quam ob causam fortè & leones tertiano circuitu laborant. Cardan. de variet. l. 7. c. 27.

5. Cause procatartice quæ corpus biliosum faciunt sunt labores, ustiones sub sole, vigiliae, cura, tristitia, excandescencia, alimentorum inopia, biliosorum alimentorum copiosior usus. Gal. 1. comm. in 6. Epid. 29. Aph.

6. Virium nempe debilitas, ventriculi cruditas, ætas &c.

& nervosas partes pungentes, & irritate. succedit mox acris, & mordax tangenti calor. sitis deinde magna. Vomitus: subinde biliosi ac meraci. sudores verò etiam copiosi circa Statum & in Declinatione Paroxysmi. Desinit hæc Febris ad integritatem, seu ἀπυρεξία; & Accessionis tempus non ultra duodecim horas extenditur. Urinæ rubent & intensioris coloris sunt quàm in sanitate. Vigent autem huiusmodi Febres maximè ætate. Promptissimè verò his corripiuntur & adolescentibus; & qui calido ac sicco sunt temperamento; ac in Exercitijs corporis versantur.

Incipienda curatio est à Sanguinis missione è dextri brachij interna vena, aut media; nisi sit quod prohibeat. quæ facienda oportuno tempore in die Intermissionis ac quietis. Deinde contemperandi sunt Humores frigidis, sed potissimum talibus quæ simul apeririendi

riendi vim obtineant. Frigida sunt ut Intybum, violaria, violæ ipsæ, lactuca, acetosa. Aperiunt verò etiā cichorium, dens leonis, lactuca sylvestris vulgo endivia dicta. item semina cucumeris, cucurbitæ, citrulli, & melonum. quibus addi possunt radices temperatæ aperientes & urinas provocantes; ut sunt asparagi, graminis, fœniculi. Ex his autē decocta parari queunt; quibus addi potest syr. ex intybo, vel ex cichorio, vel ex violis. Deficientibus herbis exhibentur aquæ istarum herbarum destillatæ cum aliquo Syruporum.

7. *Febris enim hæc ex putredine putrescūt autem putredini apta h. e. cal. & hum. in simili loco si ventilari non possint, propter obstructions. Vide Gal. 11. math. c. 2.*

8. *Decocta tamen præstant,*

Humoribus præparatis & signis concoctionis in Urina apparentibus, exhibendum erit in die quietis medicamentū clementer biliosos humores expurgans; veluti infusum Rhabarbari; cūjus in bile expurgandā eximia est facultas. cui addi potest vel Diacatholicō, vel medulla castæ fistulæ, vel manna, vel

9. Non stipitum, neque folliculorum, quod flatulenti sint. Corrigunt autē senam tormina excitantem, anisum, diacatholicon, syr. rosatus solut. & manna

10. Non conveniunt hæc in ijs qui proni ad lenteriam. lubricitatē enim post purgationem relinquunt. Scammonium inquit Gordon. facile inflammatur. unde nec in principio morbi, nec æstate dandum. c. proprio.

syrupus ex frequenti infusione rosarum. quorum singula etiam seorsim exhiberi possunt. Datur quandoque etiam decoctum, aut infusum, fol. senæ, quod quidem addito Rhabarbaro præstantius erit, futurū. exempli gratia: & rad. foeniculi, aut asparagi ʒ β. eichorij cum radicibus m. β. violarum. p.j. sem. frigidor. Comminum majorū quatuor ana ʒ j. fol. senæ, ʒ β. uvarum passarū mundatar. ʒ β. sem. anisi ʒ ij. vel ʒ β. fiat decoctio in aquæ. q. s. ad ʒ iiij. aut v. in qua infundantur rhabarbari ʒ β. aut ʒ j. colaturæ adde manna ʒ β. vel syr. rosati ex frequenti infusione rosarum. ʒ j. β. Conveniunt etiam robustis, ac duris corporibus, el. diaprū. & quod de psyllio dicitur¹⁰. item quod à succo rosarum nominatur: quod tūc maximè cōvenit quando utile est adstrictionem post evacuationē relinqui. Expediit verò etiam quandoque Enema, sive Clysterem

rem injicere; quando videlicet alvus dura est, & opportunum non est purgans exhibere. Componendum autem Enema ex decocto herbarum humectantium & mollientium; ut sunt malva, bis-malva, atriplex, violaria, mercurialis; quibus quandoque additur beta. utiliter & furfures tritici adduntur abstersionis causa. hujusmodi decocti accipitur libra, cui adduntur aliqua refrigerantia ut sunt ol. violarum, ol. rosarum; & aliquid quod expurgationem adjuvet ut est diacatholicum, vel diacassia, vel saccharum rubens; addita salis exigua quantitate, videlicet ʒj. vel ʒβ. ne clyster in intestinis hæreat: & malve, bis-malvæ, mercurialis ana m. j. violariæ. p. j. furfurum tritici. p. j. fiat decoctio ad ʒβ. j. colaturæ adde ol. violarum ʒij. ol. rosati, aut ol. amygdal. dulcium, ʒj. diacatholice. ʒiiij. sacchari rubri ʒj. salis ʒj. fiat Enema.

Quod si verò in Acces-

11. Præstat tamen Diacathol. nā diacass. raro bona habetur in phar-macopotijs, eo quod facile corrumpatur.

12. Quod tamen, ut & hieræ, præsertim validiores, qualis Logadij est, & alia omnia acriter vitandum in ijs qui Hæ-morrhoidibus obnoxij sunt.

13. In Tertianâ & omni Intermittente febre utilis in principio paroxysmi vomitus, præsertim spontaneus, vel non violentis provocatus; quemadmodum utile est in fine paroxysmi tolerare sudores. vacuetur enim quid de materia antecedente. unde conjunctam deinde facilius superat natura. hinc paroxysmi sensibilibus evacuationib. leviores fiunt, & tempore intermissionis videtur sibi ex toto curati. at nulla facta evacuatione tempore intermissionis toti

sunt ponderosi & graves, cum modica alleviatione. Gord. c. proprio. 14. V.g. capo hordeo infarctus & coctus.

cujus tamē jusculū quam carnes ipsas concedere satius erit. Vide 1. aph. 17. 15. Magis enim humectat. & sudores etiā promovere creditur Montano & alijs. Utile etiā serum

lactis cum violaria, dēte leonis, cichor. acetosa, vel similib. refrigerantib. decoctum. 16. Quod à febrium valetudi-

nes attinet non dandum in febre, nisi veterib. ægris vinum; nec nisi declinante morbo. in acutis verò periculis nullis, nisi quæ manifestas remissiones habeant; & has noctu potius. dimidia enim pars periculi est noctu, hoc est, sp. somni bibentibus, Plinius l. 23, cap. 2.

sionibus natura sit ad vomitiones propensa, neque hæc faciliè succedant, adjuvanda erit vomitio exhibitō syr. acetoso per se, vel cum aquâ tepidâ, aut cum ptisanæ decocto.

Victus ratio in Tertianis exquisitis humida sit oportet ac frigida, ut est ptisanæ cremor, vel cibi cum ptisanâ, vel refrigerantibus herbis decocti, ut sunt lactuca, cichorium, rad. cichorij. Potus sit ptisanæ decoctum, quod etiam tenuissimæ cerevisiæ præferendum est. à Vino abstinendum est: & si forte vi-

res hoc requirāt, parcè admodum eo utendū, eoque tenui, aquoso, ac diluto; nec prius tamen quam apparentibus concoctionis signis. A melle, sale, & omnibus calidis ac acris abstinendum; ut sunt sinapi, nasturtium, eruca, piper, zinziber, & alia.

De Tertiana spuria.

CAP. 4.

Tertiana non exquisita tertio quoque die recurrit. sed accessio hujus cum minore, quandoque nullo, aut exiguo invadit rigore; & diuturnior est, ac duodecim horas excedit.

1. Quod humor spuriam hanc producat minus acris sit propter permixtam pituitam.

Causa efficiens, non Bilis sincera, sed bilis pituitoso humori permixta cum sanguine putrescens.

Calor idcirco mitior est, nec adeò acris ac mordax, ut in purâ, sive exquisitâ. sitis quoque minor. Vomitione bilis pituitæ permixta succedit, sudores pauciores, vel qui difficiliter erūpant. urinæ ferè rubent, sed diu-

2. Peccans enim humor crassior & lentus magis existit. nude difficiliter & per habitum expelli, & à natura concoqui potest.

B

3. *Cruditates enim Repletio & Otiū faciunt.*

4. *Propter crassitiem, & lentorem pituitæ viscerum vasa, & pori, præsertim hepatis, facile solent obstrui.*

5. *Cannabinum, vel Avicennæ dictum.*

tius crudæ permanent. Vigēt hujusmodi febres etiam in æstate, aut in vere; & maxime his corripiūtur qui calidiore sunt tēperamento, sed cibo pleniore utuntur³, ac in otio vivunt. præsertim quādo cōsuetā exercitia intermiserunt. In hac febre viscera, & præsertim hepar⁴, facile obstruitur, & ventriculus nō rarò quoque cruditate laborat.

Sanguis in Tertianā spuria utiliter quoque detrahitur, observatis conditionibus quæ dictæ sunt, & postea quam alvi excrementa descenderint. Humores verò præparandi ac concoquendi nō omnino frigidis, sed ijs quæ vim habent obstructiones aperiendi. Cōveniunt quidem cichorium & dens leonis, sed utile ipsis addi radices fæniculi, vel apij, aut petroselini; & ex herbis cuscutam, luputum, & hepatorium vulgare; præsertim post morbi principia, ac febre inveterata. Ex syrupis initio quidem

dem utilis syr. ex cichorio,
vel similis. sed post paucos
dies illi admisceri cōvenit
vel syr. acetosum simplicē,
aut compositum, vel oxy-
meli, vel syr. de radicibus;
& morbo progrosso, syr. de
Byzantio⁶. Gal. verò ac Æ-
gineta etiā absinthium, sed
non nisi post septimū diem
exhibendum suadent.

*6. Cum aceto factus, ubi
majore incisione opus
fuerit.*

Purgatio instituenda est,
non ex solis ijs quæ bilem
educunt, sed expedit quoq;
addi quæ pituitam purgant,
ut est agaricus, vel turbita
in robustis corporibus. atq;
idcirco etiam, neque solum
ex prunis, aut ex psyllio, aut
ex succo rosarum electua-
rium exhibendum, sed ad-
dendum quoque est vel el.
diaphænicon, vel quod In-
dum dicitur. Clysteres verò
etiam in Tertianis spurij
non admodum molles esse
debere, Gal. ait. Vomitoriū
etiam medicamentum in
istis febribus, quando diu,
perseverāt & curationi re-
belles sunt, utile est post ad-
sumptum cibum, Gal. etiam

*7. Aetius dicit multos
se novisse qui hujus usu
curati sint. cap. pro-
prio. Dandum autem in
initijs paroxysmorum.
tunc enim facilius Vo-
mitus provocari poterit.
Lene verò Emeticum ex
radicula, rad. asari,
fol. atriplicis, cum oleo
parari poterit.*

autore. cuius tamen non est nunc usus frequens.

Victus ratio minus frigida esse debet, quam in exquisita Tertiana. Cibus coctus facilis; cum quo hyssopus, origanum, petroselinum commodè coqui possunt. qui exhibendus in die intermissionis, non copiosus, sed ut vires sustineat. Vinū tenue & aquosum concedi potest, modo caput non laboret. quod non solum apparentibus in Urina concoctionis notis, sed etiam prius admitti potest; præsertim si diu duraverit febris. Laudatur etiā propotu Oxymeli, sed aqua dilutum; præsertim quando crudæ pituitæ multa adest copia. potest etiam dari ptiisanæ decoctum cum cinnamomo paratum, vel cum zinzibere: cruditate existente magnâ.

De Quartana.

CAP. 5.

Quartana febris quandoque febri ardenti,
aut

aut continuæ : succedit; 1. Imò & tertianæ, quā-
quandoque nulli alteri fe- do non curatur. Hip-
bri, aut morbo supervenit, pocr. de Affect. Quar-
sed spontè oritur. tanam ferè præcedunt

Quæ febribus continuis, Erraticæ. nam melanco-
& maximè ardentibus suc- licus humor fit etiam
cedit, ex bile atra per adu- adustione; quæ dum in-
stionem genita magna ex æqualiter procedit in-
parte originem habet. Mo- æquales periodos facit.
lestior autem & difficilior Stephan. 1. ad Glaucon.
hæc est quam aliæ. comm. 43.

Quæ nulli alteri succe- 2. Quia & Atra bilis
dunt duplices sunt, vel Pu- malignior, & propter
ræ, & exquisitæ; vel impu- adjunctum calorem ma-
ræ & spuria. Exquisitæ sive joris activitatis est, præ-
puræ, ex humore melanco- sertim illa quæ ex supe-
lico frigido & sicco cum rassata flava bile gigni-
sanguine putrescente pro- tur; quam melancholia
veniunt. Impuræ sive spu- simpliciter dicta; quod
riæ generantur quando cū & bilis face sanguinis
humore melancholico alius magis activa. Vide Gal.
quoque, humor computres- de Atra bile. circa ini-
cit, biliosus, vel pituitosus. tium.

Quod si plures humores si- 3. Rarè videntur Quar-
mul computrescunt, febres tanæ puræ; quia semper
nascuntur Erroneæ certum aliquid Pituitæ permis-
ordinem ac typum non ser- cetur Melancholiæ. Mon-
vantes. tan. conf. 23.

4. Quartanæ omnes cum
Horrore invadunt, qui me- 4. Itaq. illud, Πύρ σὺ-
dium quiddam est inter Ri- ρωæ quod libr. de ty-
gorem & Frigus, calor inde pis Quartanis tribuitur
de diuturnitate potius,

quam vehementia, intelligendum venit. Rigor quum duplex sit, *δυσεντέριαν*, & *σφοδρὴς*, à Melancolico succo quandoque talem qui non nisi difficulter ad calorem deveniat; quandoq; vehementem, fieri testatur Gal. 1. comm. in 6. epid. aph. 9.

5. Quadrini circuitus febrem nunquam Bruma; nunquam hybernis mensibus incipere, Plinius refert l. 7. c. 50. An quod humor frigidus vix nisi tempore fervido putredinem, caloremq; concipiat? Huc referendū illud Iuvenalis: Iam lethifero cedente pruinis Autumno; jã Quartana sperantibus agris. Satyr. 4.

sequitur, in ijs quæ ardentibus febribus successerunt, & in spurijis biliosis, satis magnus; in alijs verò minor. Sitis non molesta est, nisi quandoque in ijs quæ ardentibus febribus supervenerunt, vel ex bile simul permixta. Vomitus bilis negat Galenus in quartanis succedere. Contingit tamē non rarò in quartanis non puris bilem vomitione reddi, & quandoq; etiam prasinā, aut æruginosam. Urinæ inconstantes sunt. In ijs quæ ardentibus febribus supervenerunt subinde rubent in alijs, die quæ febrē præcedit subinde tenues sunt & albæ; die verò paroxysmo succedente, ut plurimum crassæ, & turbatæ. Incipiunt quartanæ, declināte æstate, veluti & singulares accessiones etiam declinante die ac post meridiem invadunt.

Quædam autem sub finem æstatis ante Æquinoctiū autumnū superveniunt, quæ breviores sunt. Aliæ post

post Æquinoctiū vernum;
quæ diuturniores sunt. Sta-
tus Quartanæ 6 Solstitium
est hybernū; præsertim ea-
rum quæ puræ sunt, & Au-
tumnales. nam Spuriæ bi-
liosæ, quales sunt æstivæ,
prius quandoq; terminan-
tur; vel multo ultrà perseve-
rant. Superveniunt Quar-
tanis frequēter sudores, vel
sanguinis è naribus fluxus,
vel alvus lubrica. Nulla ha-
rum Vacuationum superve-
niente vel hydrops Ascites
non rarò succedit; qui &
post immodicam sangui-
nis profusionem aliquando
etiam sequitur; aut in tho-
racem humoribus destil-
lantibus Phtisis supervenit.
Hæmorrhoidū verò fluor
in Quartanis accedens, nō
exiguam utilitatē confert,
sicuti & quandoque Dysen-
teria. Cuivis Ætati Quarta-

na supervenire potest 7. Se-
nioribus qui sexagesimum
annū excefferunt, valde pe-

6. Quartana tarde fini-
tur, nisi primis diebus
discussa est. Cels. l. 3.
c. 15. Et; Vetus Quarta-
na rarò nisi vere solvi-
tur. Ib. Durat regulari-
ter per annum, inquit
Gordon. quia sicut acuti
morbi sequuntur motum
lunæ; ita diuturni motū
solis Id. Ad biennium
nonnunquam perdurat.
Gal. de typis. Ad annos
duos cum dimidio pro-
tractam vidimus, & ul-
tra annis. 1612 & se-
quentibus tribus, quib.
multi Quartanis labora-
rūt in hisce regionibus.
Vide Wieri observato-
nes.

7. In quavis etiam re-
gione; Scotiæ namque
prærogativam illam tri-
buere quod nemo illic
Quartana corripiatur,

ridiculum est. præsertim quum ipsi Scoti id controvertant:
Vide H. Steph. de latinitate Lipsij.

8. Sic tamen ut curari possit ; quemadmodum in viro amplissimo contigisse vidimus.

9. Ac tū aqua inter cute producta sepe interficit. Hippocr. 1. epid. sect. 3. aph. 4.

10. In Quartanis medicina Clinice propemodū nihil pollet, ut Plin. refert l. 30. c. 14. nec idcirco tamen ad Magorum remedia, quod ille facit confugiendum. neque enim hic locum habet illud ; Flectere si nequeo superos, Acherronta movebo. Et potest Clinice predicere morbi longitudinem ; & omnia nihilominus ad curandum facere quantū subiectum & morbi modus admittere possunt.

riculosa est^s. In hac febre facile lien obstruitur ac durescit ; & jecinoris ac ventriculi facultates debiliores redduntur⁹.

¹⁰ In Quartanis qui acutis morbis successerunt, non temerè sanguis est mittendus ; viribus ex priore morbo languidis, & nondum reparatis. In alijs Quartanis, si vires ferant, utile est sanguinem detrahare, ex sinistri brachij media, sive interna vena. & si sanguis fluat niger & crassus, audacius, ut Gal. ait, mittendus : si verò tenuis ac flavus statim supprimendus.

Leniter autem initio omnes Quartana laborantes tractandi sunt ; & diligenter cavendum, ne ullum intensæ qualitatis sive calidum, sive frigidum medicamentum ipsis exhibeatur. Si quæ autē videantur exhibēda, ea sint aperientia, & lieni maximè accommoda ; ut sunt rad. fæniculi, asparagi, capparorum. item asplenium, capillus veneris, fumus

fumus terræ, & si causa frigidi-
or, eupatorium vulga-
re; quæ in liquore aliquo fa-
miliari incoqui possunt. In-
terim levi aliquo medica-
mento ventrem quandoq;
expurgare utile fuerit; ut
ex decocto senæ, addito
epithymo, vel diacatholi-
co. Injici quoque poterunt
Enemata; præsertim alvo
existente duriore.

Victus ratio sit ex Ci-
bis boni succi, & facilis
concoctionis. Abstinendū
à carne suilla. præterea etiā
à piscibus; à carne volu-
crū circa paludes ac aquas
versantium; ab omnib. sal-
samentis & fumo duratis;
ab omnib. quæ lentum ha-
bent succum, ut sunt anima-
lium extrema. à legumini-
bus abstinendum, & fructi-

11. In Principio non
est nimis purganda ma-
teria, quia non potest
esse concocta. Decipit
autem quandoque bene
colorata & cum hypo-
stasi urina, in ijs qui
parco victu usi bene
dormiunt. proveniunt
autem à cibo concocto;
non à materia morbifi-
ca. Gordon. Vide Ca-
poracc. de urinis. Quod
si nec hæc exhibere quis
velit & alvus dura sit,
ex decocto Veronica, &
carduibened. similibusq;
facto clystere subduca-
tur. qualib. enematis so-
lis multos curatos te-
statur Crato, qui initio
paroxysmorum tormi-
na ventris sentierant.

12. In Quartanis vi-
ctus, inquit Aristot. ex-
tenuandus non est. 1. Probl. 57. An ut siccitas fæculenti
succu corrigatur! Vide Steph. Athen. in 1. ad Glauc.
comm. 140. 13. Danda opera est ut ne qua cruditas
id malum in Quotidianam vertat. nam quartana nemi-
nem jugulat; sed si ex ea facta Quotidiana est, in malis
ager est. Cels. l. 3. c. 15. Robori itaque ventriculi diligen-
ter quantum fieri potest consulendum.

bus crudis : nec casei usus confert. Utile est vinum tenue, albidum, & non valde calidum. admittitur & cerevisia tenuis ex bonis frugibus cocta. Eo die quo expectatur paroxysmus à Cibo abstinere valde expedit. si verò id vires non ferant, cibus exiguus septem aut octo horis ante accessionē dandus erit. In diebus verò intermissionis, ut ad consueta sese exercita¹⁴ transferant, permittendum est, autore Gal.

14. Oportet exercitijs uti ; & quo die paroxysmus futurus est somnum vitare conducit.
1. Probl. 57.

15. Ignis corporibus indendus est, ut à majore inquit Aristot. minor, qualis in Quartanis existit, marcescat; quemadmodum lampadis à majore igni flammam extinguere videmus. quod enim multū est id quod exiguum est ad se rapit.
1. Probl. 57.

In progressu morbi, præsertim circa solstitium hybernū, & in quartana pura, vel in ea quæ ex melancholico succo cum pituita permixto provenit, liberius calidis¹⁵ medicamentis uti licet. tunc decoctū thymi, ac hepatorij vulgaris utile est. item & piper nigrum aliquot diebus, ut Gal. tradit, adsumptum, vel etiam cibus permixtū. sic & Elect. diatrionpiper. & Diospoliticum exhiberi posset. Expurgari & tunc corpus expedit

pedit medicamentis paulò
valentioribus, ¹⁶ quæ atros
humores exinaniendi vim
habeant, ut est confectio
Hamech quæ decoctioni
ex folijs senę commodè ad-
ditur. Et non semel tantum
sed sæpius, si ne cessarium
fuerit, ut Gal. monet, pur-
gatio facienda; intermedio
verò tempore exhibenda
quæ aperiant & urinas mo-
veāt. Post purgationes Gal.
ac Ægineta suadent dari
Theriaca, aut medicamen-
tum ex succo Cyrenaico ¹⁷.
Prodest verò & Theria-
ca diateffaron ante acces-
sionē exhibita. profuit verò
& nonnullis pulvis zinzibe-
ris, & vulgaris usus zedoä-
riæ cum vino calente ante
accessionem datus.

Rondelet. post purgatio-
nes incipiente horrore spi-
nam dorsi ungendam do-
cet ol. calefacientib. ut sunt
ol. ex abrotano, rutæ, nu-
cum; pyretrum cum oleo.

dictaret narrabat. Succo condensati loco Extractum illius
sumi poterit,

¹⁶. Veteres Veratrum
dabant. Aet. 1. tetrab.
3. c. 125. Recentiores
etiam decoctum, infu-
sumq; cort. rad. elleb.
nigri. 3. j. aut 3. j. β.
cum fol. senæ, rhabarb.
& correctorijs exhibēt:
Aut etiam pil. Cochias
cum elleboro nigro fa-
ctas. Sed quæ Dodon.
proponit tutiora sunt.
Gal. alb. veratri etiam
meminit, quo Paulus
prudenter abstinet. cui
quam Salio tutum id
prædicanti fidem adhi-
bere, satius fuerit.

¹⁷. Qui Laser & Sil-
phium dicebatur. Cyre-
naicus autē succus, quod
arenæ Cyrenes Laser-
piciferae essent. Sunt qui
Asam fœtidam esse con-
tendant. Author succum
Angelicae se cū illo con-
tulisse, & prorsus eun-
dem reperisse, quum hæc

18. Commēdatur & linimentum ex Theriaca & succo rutæ quo spina dorsi immediatè ante paroxysmū ungenda, & linteo calido admoto, in lectum mit tendus ager.

19. Fovenda pars quæ invadente paroxysmo dolet. illic enim focus febris plerumq; existit.

20. Addunt quidam pulv. sol. senæ, rad. cappar. ellebori nigri, colocynth. & elaterij atque cū ol. chamom. & pauca resina ceratum quasi faciunt.

21. Venam nonnulli die paroxysmi majori cum fructu secant; quod omnium tum materia morifica in motu sit; ideoque facilius educatur.

18 quæ non solum faciunt ad horrorem depellendū, sed etiam ad sudores evocandos, & ad morbi concoctionem.

Providendum quoque est in Quartana visceribus 19, & maximè lieni, per ea quæ molliunt & aperiunt; ut sunt ung. ex ol. capparorum, li-
liorum, & rutaceo; addito ammoniaco. Item empl. ex ammoniaco dissoluto in aceto, & recocto, lienis regioni admoto; 20 vel aliud simile, ut est empl. de meliloto cui addi potest empl. ex mucilagibus. ita .n. fiet empl. molliens, aperiens, ac resolvens; qualia ung. & empl. lieni adhibenda maximè esse convenit.

Verè si Quartanæ perseverent, & vires ferant, sanguis non incommode iterum detrahatur, ex sinistro brachio, vel manu. 21 Nonnullis persuasum est si sanguis detrahatur ipso momento quo luna soli conjungitur, citò futurū finem Quartanæ. Post sanguinis missio-

missionē repetere etiā aperientia & purgationes utile est, nisi febris cessaverit. Gal. medicam. Vomitoria apparentib. signis concoctionis etiam consulit; quæ si exhibenda, veris tempore magis opportunè quam in hyeme exhiberi possunt. nam & Hippocr. satis apertè monet, hyeme à vomitione abstinendū. aph. 4. & 6. section. 4. Exhibenda autē sunt vomitoria paulo ante accessionem; sed prius adsumpto cibo aliquo liquidiore. pro vomitorio sufficere potest Gratiola dicta herba, cujus plus, minus 3. j. decocta cum aliquo jusculo, vel cum cerevisia, vel etiam aqua satis per vomitū purgat decocto ejus assumpto.

22. Hippocr. Κατ' αὐτὴν τὴν λήψιν, in ipsa invasione exhibet. libr. de Affection.

De Erroneis Febrilibus.

CAP. 6.

Erraticæ febres eodem ferè modo quo Quartanæ curandæ.

1. Quando plures humores simul putrescunt, erraticæ sunt, ut supra dixit autor. c. de quartana. Inter hos quum sint

sint & illi qui Quartana inducunt, crassi nempe qui obstructions faciunt; ideo curandæ de obstruentibus, ut sunt illa quæ attenuant & detergunt.

2. Eleoselini, seu paludapij.

Initio sanguis mittendus; sed potius è dextro, quam sinistro brachio.

Exhibenda quæ viscerum obstructions aperiunt, & simulentos ac crassos humores attenuare queant; ut est decoctum ex radicibus fœniculi, petroselini, & apij, capparorum; Et ex herbis, ut fumo terræ, cuscuta, eupatorio vulgari, chamædr. addito aceto, aut oxymelite. itē & syr. acetosus compos. vel de Byzant. cum aceto, aut aliquis similis.

Purgantia medicamenta tempestivè adhiberi in huiusmodi febribus commodum est; & talia quæ diversos humores educunt, ut ex rhabarb. agarico, fol. fenæ, epithymo, composita: Vele ex elect. diacathol. diaphœnici. & conf. Hamech; vel simili aliquò. Vomitoria etiam medicamenta, quale est è gratiola, in huiusmodi febribus subinde multum profuerunt.

Victus ratio potest esse talis, qualis in Quartana.

Ad

Ad has, & Quartanas referendæ, quas Hippocrat.

1. Epidē. Quintanas, Septimanas, & Nonanas appellat. quales tamen Gal. 1. de

differ. febr. 3 refert se nunquam observasse manifestē, scribens se nullum circuitum febris unquam vidisse, quæ ultra quatrimum extenderetur.

3. Vide etiam quæ scribit comm. 2. sect. 3. libri 1. Epidem.

De Febre Quotidiana.

CAP. 7.

Quotidiana exputrescente cum sanguine pituita provenit, humore videlicet humido, frigido, ac saporis experte.

Cum Frigore extremarum partium hæc febris invadit, absque horrore, aut Rigore. Calor qui succedit non intensus, aut acris est, sed remissus, ac blandus velut ab aqueo vapore. Sitis in hac febre non molesta est. Nausea ac cibi fastidium sæpè adsunt. Vomitus pituitæ quandoque ac-

1. *Ad Glaucon. l. i. cap. 7.*

2. *Quia propter voracitatem etiam cruditates multæ coacervari in pueris solent; ut & in senib. propter defectum caloris nativi.*

3. *Vel etiam 14. aut 20.*

cedit. Quæ per inferiora excernuntur humidiora, crudiora, ac liquidiora sunt. Universum corpus crudis humoribus plenum invenitur. Facies sæpè tumida ac pallida est; tum & reliquæ corporis partes. Destillationes ex capite quandoque comitantur. Urinæ sunt crudæ, albidæ, ac tenues; vel crassæ & turbulentæ; vel etiam rubicundæ testè Galeno. Obnoxij hujusmodi febribus maximè sunt pueri, præsertim natura humidiores: & senes quâdoque; tum & omnes ij qui crassi sunt ac pituitosi, inque otio & crapulis degunt; ac liberaliori potu utentes, præsertim crassioris cerevisiæ. Superveniunt Quotidianæ in regionibus humidis ac frigidis; & in anni tempore acaëris constitutione frigida & humida.

Diurnæ sunt febres, & accessiones habent longas ad duodecim; horas quandoque extensas.

Sanguinis missio quæ in alijs

alijs febribus utilis, in quotidiana minus convenit, propter humorum cruditatem. nam ubi humorū crudorum redundantia ad sanguinis missionē vires + non sufficiunt, ut in libro de curandi rat. per sang. mission. Gal. apertè docet.

Et quandoquidem in hac facile viscera obstruuntur utendū incidentib. & aperientibus. Commendatur oxymeli, & omnia diuretica, ut sunt rad. apij, petroselinī, & pimpinellæ saxifragæ. Ex herbis origanū, hyssopus, satureia, thymum, betonica, chamædrys, marrubium. Ex syr. de radicib. de Byzantijs cum aceto.

Quodsi expediens videatur corpus purgare, facienda purgatio cum agarico, vel in robustioribus cum turbith; vel cum hierapicra addito agarico; vel cum aliquo potentiore; vel cum el. diaphœnic. vel Indol.

Cibus sit facilis conco-

4. Vires enim augentur non quæ ingesta; sed quæ concocta, distributa, & partibus adposita sunt.

5. Acria enim & incidentia sunt, ut docet Gal. 5. de simplic. facultat. c. 13.

6. Ventriculū enim non perturbatur; unde & medicina familiæ dictæ fuit; & tamen ejus frequenti usu Quotidianam curari posse, testatur Avic.

7. In artis operibus sæpe vidimus, dictum quidem & ab antiquis, sed rard, nempe fieri sæpe quotidianā expituita putrescente vel in ventriculo, vel in intestinis; ejusce modiq; febrē cessare intra quartum, vel quintum diem, causa febris per clysteres solos vacuata. Steph. Athen. comm. 1. in l. ad Glauco.

ctionis, additis calidis herbis, ut petroselino, origano, hyssopo, thymo; vel calidis speciebus. Exhibere quandoque licet jus cicerum rubrorum additis. Vinū concedendum; album tamen; non rubens; nec valde dulce, aut crassum.

Providendum quoque est Ventriculo veluti ung. ex ol. nardino, vel ol. de mentha; additis ol. mastich. vel ol. ex nuce muscata, vel ol. ex garyophyllis, quod reliquis potentius est. Admo-
veri etiam potest ceratum stomachale, vel facculi ex herbis, & seminibus, & alijs odoratis calefacientibus, ut ex absinthio, origano, mentha, si odor non offendat; rosis, sæm. ammios, anisi, carui; addito cinnamomo, garyophyllis, mastiche.

1. Ἡπίαλ. Atticis
quibusdā dicitur Rigor
qui febrem præcedit.
Gal. 2. de febr. differ. c.
6. Sic apud Pollucē hæc
conjunguntur; Φεανή-

De Epiala febre.

C A P. 8.

EPialæ ex genere sunt
quotidianarum. In his
simul febricitant ac rigent
agro-

agrotantes ; & utrumque
percipiunt eodem tempo-
re in omni corporis parte.

Proveniunt ex humore
frigidissimo, ut ex acida pi-
tuita, vel etiā vitrea³, quum
ex dimidio computrescit,
vel quum aliæ ejus partes
putrescunt, aliæ verò non.
Gal. de inæquali intempe-
rie hujusmodi febrem fieri
adserere videtur quando
pituitosi frigidi succi, &
amara bilis simul abundāt,
& per sentientia corpora
moventur, ita ut calidum
& frigidū tenuissimis par-
ticulis sit aspersum.

ψυμδς, & εἶγ, ἡπλ-
λ. Et εἰς πύρετον vo-
ce Epialon denotarē
scribit Enstath. Hoc ta-
men loco speciem febris
significat qualē Gal. ex
Archig. d. l. descripsit.
2. Aristoteles quidem
scribit τῷ ἡπιαλῶσιν si-
mul cū Rigore sitim mo-
lestam esse. verū id fieri
quod non idē locus re-
frigeretur, & calefiat.
Problem. sect. 27. pro-
blem. 2. Quem forte se-
cutus Ioubertus negat
ab eodem utrumque per-
cipi & frigus, & calo-
rem ; sed ab agro frigus

duntaxat, ab alio tangente calorem. ac calorem quidē fieri
à pituita bili permixta in corde putrescente ; frigus à pi-
uita liquata desuper, ut ex capite per habitum desfluente.
Febres has Catarrhales vulgo dici &c. 2. Pract. cap. pe-
nultimo. Sed Archigeni, Gal. alijsq; viris in arte medicæ
exercitatissimis hac in re fidem temerè derogare non de-
bemus. neque enim vident omnes omnia omni tempore. Lo-
cus autē ex problemat. adductus de invasione paroxysmo-
rum accipiendus, uti & Gal. accepit libr. de inæquali In-
temperie. 3. Acrimoniam enim, ut & acetum, habent,
præsertim ubi putruerint: ut non minus quā bilis Rigorem
facere possint quando per totū habitum feruntur. propriè
tamen dictum Rigorem bilis facit Gal. 4. aph. 63. comm.

Curatio hujus similis cū curatione ipsius quotidiana, nisi quod potentiora & efficaciora referat esse medicamenta tantò, quanto materia morbi est frigidior.

De Continuis.

CAP. 9.

1. Quando pro specie accipitur hæc vox, quæ contra Synochū dividitur. nam & generis nomen est, quod Synochos, & Continuas ambitu suo complectitur. Gal. 2. de differ. febr. c. 2.

2. Quæ alternis dieb. exacerbabantur ac τριταίοφωϊς veteribus dicebantur.

3. Rarissimè videntur Quartanæ continuæ.

1. Epid. sect. 3. aph. 2.

4. Ac propterea ὁμογενεῖς dicuntur à Gal. 2. de Crisib. Causus, & ex-

acta Tertianæ. 5. Has duplices Tertianas & Quotidianas continuas quidam Hemitritæorum nomine indigitabant, quod Gal. tamen se facere negat. 2. de febr. differ. initio.

FEbris quæ Synechees, h. e. continua dicitur, à Synocho differt. Continua exacerbationes habet & remissiones, sed ad apyrexiam non pervenit. Synochos verò unicam habet accessionem ab initio ad finem per durabilem.

Continuarum autem febrium quædam ad Tertianas * accedunt; nonnullæ ad Quartanas; nonnullæ ad Quotidianas. Tertianæ continua Causos*, & febris ardens proprie dicitur; præsertim si duplex fuerit.

harum

harum verò ardentium februm quædam exquisitæ sunt, ac puræ; aliæ minus exquisitæ sive impuræ.

Comitatur ardentes febres exquisitas intensus calor; mordax quoque ac acris. sitis valdè urget. lingua sicca ac aspera est. Vomitus si succedat admodum biliosus. sudores copiosi erumpunt. Urinæ admodum rubent. magna in pulsu celeritas, & frequentia. Vigent hujuscemodi febres in summo æstatis fervore. frequentes sunt in calidis ac siccis regionibus. qui autem temperamento sunt calido ac sicco promptissime in has incidunt; præsertim si ex laboribus, aut exercitijs defatigati fuerint, aut inediam passi.

In minus exquisitis ardentibus, sive impuris calor mitior ac minus acris est, sitis non semper adeo magna. nec lingua usque adeo aspera, sed frequentius albis fordibus gravata.

Supervenient autem fe-

6. Hæcque duo simul juncta propriissimum Causæ signum, atque indicium sunt. 4. Acut. 1. & 4. comm. & 3. epidem. sect. 3. aph. 34.

7. Præsertim si destilent humores ex capite. 8. Ob pituitâ adustam. hinc istud apud nos sæpissime; linguae verd asperitas, qualis in puris Causis esse solet, non ita sæpe conspicitur.

C 3.

9. Quando sequitur remissionem prioris paroxysmi, ut sit initiū subsequēntis. Si autem in vigore paroxysmi accidat, lethale est. nam significat interiora urī, exteriora frigere. Ita conciliandi aph. in textu sup. citatus cū 46. ejusdem libri 4.

10. Major nempe morbus in minorem; quod minus malum est.

11. Ideoque nec de curatione harū, præter illa quæ de Intermittente supra scripta sunt, necessarium fuit dicere.

12. Quod pituitosus humor ægrè discutiatur.

brib. ardētibus rigor, bonus est. nā quæ febris continua fuit in intermittentem^o permutatur, aut æger à morbo liberatur. Aph. 58. sect. 4.

Aliæ Continuae ut Quotidianæ, & Quartanæ, non sunt Ardentē febres. contingit tamen, sic quandoq; nominari, sed improprie. Quotidiana continua similis est quod ad Accidentia attinet, intermittenti. sed exacerbatio cum frigore nō incipit, nec ad apyrexiam pervenit; sed priusquā una accessio desinat, altera supervenit.

Quartanæ cōtinuæ quarto quoque die exacerbantur; sed citra horrorem accessiones earum invadunt; nec integrè desinunt. Istæ si triplices fuerint difficulter ab impuris ardentibus agnoscuntur. habent tamē hoc proprium quod accessiones earum post meridiem aut circa noctem superveniunt; & quod citò in intermittentes mutantur.

De

De Synochis fe-
bribus.

CAP. IO.

Synochus febris quæ nul-
las habet exacerbatio-
nes, duplex est. vel enim à
sanguine fit citra putredi-
nem inflammato, vel à san-
guine in omnibus vasis
maximis æquabiliter pu-
trefcēte. Inflammatur au-
tem sanguis quia non even-
tatur, & vapor calidus non
transpirat; qui retentus ea
quæ contingit calefacit.
prohibetur autem transpi-
ratio propter cutis densita-
tē obstructis videlicet exi-
libus meatibus. obstruun-
tur autem & constipantur
corporis isti meatus vel
propter balnea adstringen-
tia ut sunt aluminosa, vel
propter externum frigus,
vel alia simili causa. Simi-
lis autem hæc febris Diarijs
habetur. quamdiu citra pu-
tredinē consistit. tunc enim
calor ejus mitis, ac blan-
dus sentitur; urinæ sano-
rum similes sunt, & in pulsu

1. *Differentia Epacma-
stica, Paracmastica,
Homotona, nihil ad cu-
rationē facit. nam cres-
cit remedijs non adhi-
bitis, decrescit adhibi-
tis, difficulter consistit:
quod si contingat Ho-
motona dicetur.*

2. *Aet. comparat vino
novo in vasis efferves-
centi. serm. 5. cap. 70.
calefactus eodem pacto
sanguis rare fit; atq; ita
loco contineri non po-
test.*

3. *Ut mora diutina sub
sole; (quod tamen ra-
rum est,) vel à sordibus.*

4. *Calor sequitur mate-
riam in qua est; in bile
acris existit; in sangui-
ne mitis est.*

5. *Serum enim sanguinis
sunt; ideoque illo non-
dum putrescente muta-
ri non solent.*

6. *Potest esse magnus, frequēs, celer. in æqualis esse non potest.*

nulla⁶ in æqualitas depræhenditur. Sed quando istæ febres diutius consistunt cito in Synochum cum putredine mutantur. sanguis enim quum calidus sit & humidus prohibita transpiratione citò putrescit. Contingit verò & synochū cum putredine fieri non præcedente altera. tunc videlicet ubi tanta est sanguinis copia ut gravet vires. quando enim vires copia sanguinis gravantur, bonitatem naturæ suæ sanguis amittit. quā amissā fieri nequit ut nō computrescat ut Gal. 9. Meth. ostendit. In synocho autem putrida Urinæ à naturali constitutione mutantur. in pulsibus inæqualitas apparet; & calor⁷ minus mitis aut blandus sentitur.

7. *Sanguinis enim tenuiores partes in bilem mutantur.*

Excitatur synochus in ijs qui ætate sunt vigente, ac natura calidi, & in carnosis bono habitu præditis. qui denso sunt corpore, sanguineq; multo abundāt. Tempus autem harum febrium maximè verum est, teste

Actio⁸.

Aetio³. Qui autem raro ac 8. Serm. 5. cap. 70.

soluto sunt habitu, corpore
graciles, ætate ac tempera-
mento frigidi, hujuscemodi
febris non corripiuntur.

Curatio autē Synocho-
rum in abundantis sangui-
nis evacuatione consistit, &
in caloris præter naturam
extinctione, & obstructa-
rum partium, si quæ restant,
Apertione.

1. Ad sanguinis autē de-
tractionem in utraque sy-
nocho festinandum; quem
ex dextri brachij vena me-
dia, vel interna duci expe-
dit pro virium ratione. nam
quibus sanguis tempestivè
detractus nō est in aliquod
gravius, malum incidunt;
nisi sanguis è naribus erū-
pens, vel aliunde profluens
ut per menses, aut hæmor-
rhoides; vel etiam copio-
sus sudor superveniens, ip-
sos à periculo eripiat.

2. Calor autem præter
naturalis victus ratione fri-
gida & humida adimetur;
ut aqua decoctionis ptisa-
næ, & ¹⁰ cremore ptisanæ, set.

9. Quia non superve-
niunt nisi in Plethora;
à qua quantum periculi
sit liquet ex Aph. Hip-
pocr. de habitu athle-
tarum. quidam ab hac
mutus factus sola phle-
botomia curatus fuit.
fiunt & Syncopæ, non
defectu, sed suffocatio-
ne spirituum. Angina
itidem, ac Catochæ. me-
tus itidem nevenæ rum-
pantur.

10. Id est substantia
hordei mundati, (quod
ptisana veterum est) ex
decoctione relicta. Re-
frigerat autem, & satis
nutrit ad sustinendum
vires donec morbus ces-
set.

qui solus pro cibo sufficere potest, donec febris cessarit; nam tenui victu in febre synocho utendum est. Sunt & alia refrigerantia nō inutilia, ut lactuca, lapathum, oxalis, & similes herbæ.

II. Apertos poros indicat sudor. illo itaque procedente sufficienter, de apertione non est laborandum.

3. Meatus obstructi sudoribus succedentibus¹¹ aperiuntur, quod si tanta fuerit constipatio ut sudores erūpere non queant balneum aquæ dulcis succurrere poterit. Aquæ frigida potio- nem in synochis, & febribus ardentibus utilem Græci tradunt medici; sed ut tutò exhiberi queat quædam requiruntur. 1. Ut venæ sectio, & Purgatio ubi convenit, præcesserint. 2. Ut in urinis manifesta appareant signa concoctionis. 3. Ut non propinetur nisi in Statu & morbi & paroxysmi; & tunc quidem tantum quantum¹² ægrotanti libet. 4. Ut æger sit assuetus frigida potioni; & validis viribus, nullo interno viscere debili, aut malè affecto. 5. Ut aqua sit pura, & vitio carens.

II. Non tamen ultra quam libet, bibere cogendus est.

carens. Abstinere autem ab aqua frigida potione convenit eos qui graciles corpore sunt, & modicum sanguinem habent, ut sunt qui Hectica febre laborant. citò enim aqua frigida solidas corporis partes¹³ carne nudatas offendit. Abstinere etiam debent naturâ frigidiores, atque in senectute constituti. Prohibenda quoque est aqua potio tempore hyberno, inq; locis frigidioribus. Ab aqua frigida & eos abstinere expedit qui febribus laborant non exquisitis ardentibus, & tertianis impuris, vel alijs ex crassis frigidisq; humoribus originē habentibus. Inutilis quoque & incommoda aqua frigida potio omnib. qui internum aliquod viscus debile¹⁴ habēt, vel obstructū, vel alioquin ab Erysipelate, inflammatione, vel tumore aliquo malè affectū habent. Aqua enim frigida intempestivè & ubi non convenit exhibita, crudos lentosque hu-

13. *Inter quos præcipue sunt nervosa. nervis autem frigidum inimicum. 5. Aph. 18.*

14. *Sive ex naturali intemperie, sive ex vitio adscititio.*

15. *Calculo, aut crudis humoribus qui alioquin descensuri erant, illic retentis.*

mores attenuari & concoqui non permittit, obstructions auget, & inflammationes, erysipelata, alioque tumores resolvi impedit. & licet fortassis dum sumitur, vel mox à sumptione conferre aliquid videatur; morbum tamen reddit difficiliorem, & in periculum ac vitæ discriminem agrotantem non raro adducit. nonnullis enim stomachus, aut ventriculus ipse, alijs pulmo, vel septum transversum, vel hepar, vel renes, aut vesica, aut alia pars adeo graviter offenditur, ut difficilis inde consequatur affectus, ut difficilis respiratio, cibi cruditas, colicæ, renū, aut vesicæ dolores, & convulsiones vel tremores.

De febre Ardente exquisita.

CAP. II.

IN febre ardente exquisita, ex bile videlicet in magnis vasis cum sanguine putrescente, tempestivè quoque,

que, si vires ferant, sanguis
detrahendus est.

Humores deinde præpa-
randi sunt refrigerantibus,
ut sunt in tybū, lactuca, vio-
laria, oxalis &c. quorū de-
coctum exhiberi potest vel
per se, vel cū syr. aliquo, ut
de violis, de succo intybi, de
succo oxalidis: syr. de succo
rimonum, vel ex acetositate
citri utiles quoque sunt. qui
& per se dari possunt. Loco
verò decocti exhiberi pos-
sunt aq. ex iisdem herbis
destillatæ cum quib. syr. di-
ui possunt. Purgatio insti-
tuenda ex ijs est quæ le-
uando & refrigerando Bi-
lem subducant; ut est syr.
ex frequenti infusione ro-
arum, præsertim cum in-
uso rhabarbari datus. in-
unditur autem rhabarba-
um in decocto herbarum
dictarum & sem. qua-
uor frig. major. additis
runis, & myxarijs ali-
quot. Quibus autem hujus-
modi levis & naturæ fa-
miliaris purgatio non suffi-
cit, dari potest diacatholic.

1. Ideoq; veteres quum
non nisi fortia cognos-
cerent in hac purgari
nolebant.

2. Syr. per se non satis
purgat. rhabarb. con-
trà calorem corrigit, &
tormina quæ facit; ne
fiant prohibet. Cassia
ventriculo molesta est;
& iudicium de facibus
pervertit. Manna nau-
seam movet.

vel el. de psyllio, vel diaprunum. quæ tamen non nisi valdè robustis exhibentur. In statu morbi aq. frig. liberalis potio admitti potest; observatis conditionibus antè dictis.

Victus ratio per universum morbi tempus tenuis esse debet, & simul humectans ac refrigerans. Ptisana utilissima est, cujus cremor commodè exhibetur. potest & ipsa cū pullo galinaceo decoqui, atque jus ejus propinari. Herbæ etiā utiles sunt, ut lactuca, oxalis, intybum, & similes quæ cum pullo decoqui possunt.

Potus sit decoctum ptisanæ⁺, vel similis refrigerans. conceditur etiā nonnihil aque puræ^s in qua macerati sint limones decorticati, in tenues laminas scissif, addito exiguo saccharo. Aer quoq; loci in quo æger cubat refrigerandus est. pavementū crebrò aqua frigida aspergendum. inferendum gramen virens, vel vitis, aut salicis folia, aut poly-

3. *Vel carne vitulina, si validiore alimento opus sit. Ipsa caro quod unctuosas; ideoque velut oleum in lampade sit, ut Razim experim. loquitur, negatur.*

4. *Vel serum lactis; vel lac unde butyrū extractum est; quod tamen propter caseosas quas habet partes minus quā serum probatur.*

5. *Tam in initio, atque augmento qnam declinatione; sed non illa copia qua aqua pura.*

polygoni, aut plantagi-
nis &c. falicis etiam rami
circumquaq; ponendi; fe-
nellæque quæ solem non
admittunt, pateant⁶. Provi-
dendum quoq; in hujusce-
modi febribus est cordi per
epithemata foris adhibita,
ut ex aq. rosarum, buglossi,
endiviæ, violarum, addito
exiguo aceto rosaceo⁷, in
quibus nodulus macerari
potest continens spec. dia-
rhodō, vel diamargariton:
quod Epithema per pan-
nos aliquos hoc imbutos⁸
egelidum⁹ admovendū est.
Locinori verò & simili mo-
do provideri potest. Si vi-
gilæ molestæ sint poterit
& Epithema capitis fronti
ad moveri ex aq. nymphææ,
actucæ, papaveris, rosa-
rū; addito lacte muliebri¹⁰,
Cremori ptisanæ addi po-
test sem. melonum munda-
tū, aut etiam nonnihil sem.
papaver. albi. deinde & alia

6. *Hyphasis*, qui in sa-
cris literis *Phasis* dici-
tur, præterquam quod
Caryophyllum seu flo-
rem, seu fructum defe-
rat, & aliam quod è Pa-
radyso nascatur, notam
habet. fertur enim febrī
laborantes ardenti si in
illud flumen mergantur,
morbo subito liberari.
Niceph. Callist. l. 9. cap.
19.

7. Hoc enim vim reli-
quorum cito in corpus
deducit. tenuibus nempe
suis partibus quæ quan-
tum valeant in illis ap-
paret quib. post aceti,
aut cum aceto præpara-
torū usu continuo circa
verticem, aut etiam ali-
bi, sudor prorumpit.

8. Granis *alkermes*, quæ
cordi conferre putan-
tur, tinctos; vel etiam
albos multum enim non
refert.

9. Eo calore qualis la-

tis recens emulsi. 10. Quod quum humidum sit, non
tantum frigidum, ut reliqua, quandoque magis quam illa
omnium provocat.

12. Hæc, quia veteribus incognita, aut saltem inusitata fuere, quidam temerè damnant. Admoveri possunt post usum Universalium cum alijs, aut quando alia adhiberi non possunt. & sæpè per illa deliria sedantur. Actū frigida si applicentur lædunt, re-percussio nimirum ad Cerebrū fervore, sic ex cretæ frigida ad positione delirium aliquando ortū fuisse, verum est. Admoveri debent quum fœtere inceperint.

13. Fermentum acre & parabile, & potens est. commodeq; applicatur, nec odore vel ægro, vel adfistentibus molestum.

adhiberi possunt, de quibus in cap. de Vigilijs. Quod si æger deliret somnus procurandus est. in quiete, & extra lucem ipse continendus. plantis pedū quædam subliganda sunt¹² ut sapo niger liquidior cum sale brassicæ folio impositus; vel columba viva fissa adhuc calens cū sanguine admovenda est, & adusque duodecim aut plures horas sub pedibus relinquenda. quæ cum aufertur in aquam frigidam abjicienda est, ne odor sit molestus. vel raphanidis cōtusa radix supponenda est, quæ tamen odore molesta est¹³. Quid autem contra sitim, asperitatem linguæ, aliaque symptomata agendum, suis locis dicendum est.

De Febre ardente non exquisita.

CAP. 12.

IN Ardente febre non exquisita sanguinē quoque mitti expediens est. Exhibenda

benda sunt non tantum refrigerantia, sed & quæ simul inscindere viscosos humores, vel obstructions aperire queant; ut sunt syr. de succo limonum, syr. de acetositate citri, syr. de succo cichorij &c. qui vel seorsim exhiberi queunt, vel cum decocto cichorij, dentis leonis, rad. asparagi, rusci &c.

Purgatio ex rhabarb. vel syr. ex rosis solut. utilis quoque est, præsertim addito agarico; tum & ex ijs quæ in curatione tertianæ non exquisitæ conveniunt.

Clysteres quoque in ardente febre exquisita tum etiam in non exquisita utiliter adhibentur, tales quales in tertianis.

Liberalis aquæ potio in hac febre admitti non debet. interim si sitis magna est, sedandæ illius causa admitti etiam potest aqua in qua macerati fuerint limones addito saccharo, & exiguo vino.

Victus ratio paulo libe-

1. *Nihil enim aliud quam tertiana impura continua est Ardens non exquisita.*

2. *Ratione frigidioris materiæ. Et nihilominus sensim, non affatim sumi debet.*

D

3. Ne phrenitis abusu vini subsequatur præcedentes cephalalgias, atque vigilias.

1. Paulus inter has febres non distinguit, sed omnes uno modo curat. tamen ratione partium differunt. nam Erysipelas ventriculi qui natura frigidus est, non tam vehemens existit, quam Iocinoris, aut pulmonum natura calidorum. itaque febris ex illius Erysipelate pronata Lipyria, quasi deficiens dicitur. In senibus, licet non post Erysipelas, sæpe supervenit; Significatque magnam debilitatem facultatis naturalis. Itaque non debet mitti sanguis; maxime in senibus; neque Purgationes; aut ullum aliud magnū remedium convenit.

ralior esse potest. Cibum coqui cum cichor. & lactucis nō abs re fuerit. Pro potu decoctum ptisanæ utilissimum est. à vino abstinendum; præsertim capite dolente & vigilijs molestis. Aerem quoque refrigerari non malum, præsertim si fuerit aeris status calidus & siccus. Contra vigilias admoveri, & exhiberi eadem possunt quæ in ardente exquisita. Quæ sub plantis pedum in exquisita ardente liganda sunt in hac quoque admoveri possunt; præsertim quando caput dolet.

De febrib. ex Erysipelatium affectu.

CAP. 13.

Erysipelatis affectus tres circa interna viscera Actius

Aetius refert. quorum unus circa ventriculum ac infernum ventrē consistit; unde febris dicta Lipyrias provenit. alter hepar occupat à quo Typhodes febris oritur. tertius in pulmone hæret cujus febris Crymodes propria est. In Lipyria febre interiora calent, exteriora frigida sunt. lingua sicca & aspera. sitis frequenter molesta. pulsus celer, frequens, inæqualis, sæpissimè parvus. Ex harum autē genere sunt quas recentiores lentas febres appellant, quæ senibus exitiales ac perniciosæ; alijs difficiles sunt.

Venæ sectio in istis febribus nihil confert. Purgationes quoque non sunt utiles. Si alvus dura est, lenienda est molli clystere, tali quali dictum est. Victus ratio refrigerans utilis est; & quæ vires conservet, ut ex pullis gallinæis, vel alia carne tenera decocta cum herbis refrigerantibus, vel cū ptisana. Aetius aquam, sed vi-

2. Manifestum quidem Rigorē inducit; at non equè manifestum Fervorem, quod & ipsum nomen indicat. λεῖπεται γὰρ πυρὸς, ἢ τοῖς θερμῶς, ut Actuar. scribit.

3. In nulla enim febre alvum adstrictam esse, utile est.

no, in pauca tamen quantitate, addito, exhibuit. Aqua in qua recētes limones macerati cū saccharo & pauco vino utilis quoque esse potest, si parum ejus pro vice sumatur.

4. Vox enim τὸ Φω, à qua τὸ Φώδης derivatur, idem etiam quod καίω, uro, à quo, καύσθαι, significat. An Venæ cavæ inflammationem subsequens morbus apud Aretæū l. 2. c. 4. descriptus, Typhodes febris sit, videndum. Gal. certè Causos à veteribus dictos frequentissimè ex hepatis aut ventriculi φλογώδεσι Ἀγέρεσι, & quidē vehementissimos; quiq; frequenter in Marasmo desinant, supervenire refert. 4. de Loc. affectis. c. 6. Ἀκρόμ, quod idem quod κρυός significat, hæc vox deducitur. Vide Hippocr. de Affect. & Gal. de loc aff. l. 4. cap. 6.

Typhodes febris + ad Ardentes referenda est. Curatio quoque harum uti illarum. Aquæ frigidæ potionem in febre quæ ab Erysipelatio affectu originem ducit in morbi statu Ægimeta consulit. sed Gal. omnino prohibet aquam frigidam illis dari, quibus vel phlegmone, vel erysipelas circa interna viscera consistit, ut ante dictum est.

Crymodes s febris ad erysipelas pulmonis refertur, de cujus curatione Hipp. non uno agit loco, & de quo in curatione Peripneumonix nobis agendum erit.

Supersunt & duo alij Erysipalati affectus, ut erysipelas Vteri & Cerebri, de quibus quoq; suis locis dicendum.

De

De Hectica febre.

CAP. 14.

HECTICA febris est calor præter naturam cor & solidas partes diutius occupans, in quibus sic comprehensus est ut in $\epsilon\zeta\text{iv}$ vel habitum seu consuetudinem venerit. nam ægro-
tare aut febricitare se æger non sentit, omnibus partibus ejus æque calefactis. Perpetuo autem sui similis hæc febris est, & nec invasionem, nec augmentum, nec vigorem, nec remissionem habet. faciei color vividus per hanc febrem perit. frontis cutis arida & sicca redditur. nares fiunt acutæ, & oculi concavi. tempora collabuntur. universum corpus macrum ac siccum apparet; quod & aridius ab eo qui ipsum tangit, sentitur; à quo & calor initio debilis, sed immorando ac diutius manum applicando tandem acris, ac mordax percipitur. Pulsus parvi sunt, frequentes &

1. Sic dicitur, vel quod ut $\epsilon\zeta\text{is}$, difficulter solvatur; vel quod in $\epsilon\zeta\text{es}$ (sic enim solidas ab humoribus destinguentes, appellat) consistat. 1. de differ. febr.

2. Non solum Humores, & Spiritus, sed etiam corpora quæ $\epsilon\zeta\text{iv}$ habent, ut Gal. l. de inæquali Intemp. h. e. τοῖς $\sigma\epsilon\epsilon\epsilon\alpha$, ut Paul. l. 2. c.

3. loquitur, occupans. neque enim fieri potest ut non & Spiritus, & Humores incaluerint.

3. Nisi putredo humorum ideoque putrida febris conjuncta sit; aut pars aliqua circa cor inflammatorio, aut erysipelatio affectu laboret. Gal. in fine l. de Marasmo. Implicata autem putrida difficiliorē Hecticæ cognitionem reddit.

4. Prout ægrorum corpora natura sua magis minusve sicca, ideoque & magis minusve dura sunt; pulsus itidem magis minusve duri sunt, febris licet æqualis gradus laboratium, sic Belgarum in Hæctica pulsus minus duri quam Hispanorum percipiuntur.

5. Rarissime tamen id fieri solet. Gal. 3. de præfag. ex pulsib. c. 7. Sunt pestilentes ab initio Hæctice: & mærorem, aut iram interdum sequuntur. aliter an ulla ab initio hæctica fiat nescio. Ib. c. 4. Ab inedia etiam in cal. & siccis corporibus ab initio fieri testatur 10. meth. c. 4.

celeres, & pro corporis conditione duriores. Hæc febris si diu constiterit, & non prius æger vel curetur, vel moriatur, in non curabilem Marasmm transit.

Duplici autem modo Hæctice oriuntur, vel diuturnis Ardentibus febribus succedunt, vel statim ab initio invadunt. Quæ ardentibus succedunt magnitudine differunt. quædam enim superveniunt nondum omni cordis, ac solidarum partium humiditate absumptâ; aliæ verò omni cordis humiditate consumpta generantur; quod fit quando febris ardens diutius prorogatur. tales non solum hæctice sunt, sed & marasmodies, ut inquit Gal. Quæ autem statim initio non præcedente aliqua febre ardente hominis corpus occupant initio Ephemeris febribus similes evadunt, sed diuturnitate temporis ab ipsis differunt.

Hæcticis febribus cæteris magis obnoxij existunt qui

qui calidi ac sicci, temperamento, & habitu corporis gracili sunt. tales enim si vel in ediam diutius sustinuerint, vel sub solis fervore diu versati fuerint, vel labore immodico aut vigilijs defatigati; vel ab animi motibus ut ira ac tristitia, aut mœrore vel gravius affecti, vel universis, vel pluribus convenientibus, in hecticam febrem facile incidunt, præsertim æstate, ac cæli statu calido, siccoque; nisi ardente febre corripiantur; à qua etiamsi evaserint ab Hæctica tamen tuti omnino nō sunt. ardentes enim febres in hecticam mutari quandoque contingit.

Curatio Hæcticarum in ijs quæ squalidum corpus refrigerant ac humectant, consistit. Duplex autē horum materia est. quædam enim intra corpus sumuntur; alia foris admoventur. Intra corpus conveniunt Alimenta refrigerantia & humectantia, ut ptisanæ cremor. ipsa verò ptisana & in

6. Propterea quod partes nervosæ carne nudatæ sint. ideoq; aquæ friguis integris adhuc viribus persentiscant; frigus autem nervis inimicum est. Caro verò nervorum σκέπη, & πρέβλημα χυμῶνων, ut loquuntur Timæus, Plato, & ex illis Alcinous.

7. Quod faciliè, in corporib. præsertim cal. & siccis, qualia Hæcticorum sunt, in bilem vertantur.

8. Quod tenue admodum est, & multum seri habet. Quū verò id apud nos vix haberi possit, vaccino fortè, præsertim aq. rosac. vel aliquin communis quarta parte permista, non incommodè ejus loco uteremur. nā & per se, propter pascuorum ubertatem, hic apud nos liquidius multo, quam in regionibus calidiorib. siccioribusque, existit.

9. Cyathus

continet cochlearia quatuor, seu 3 j. β.

omni cibo utilis est, sicut & far ex hordeo, aut avena. Veluti & refrigerantes herbae ut lactuca, portulaca, violaria, & fructus nonnulli, præsertim qui non facile corrumpuntur. Aquæ potio ijs qui hac assueferunt utilis quoque est. sed non multa simul danda, sed paulatim inferenda. Cujus loco & commodè, exhibetur aqua decoctionis ptisanæ. A melle verò, & aqua mulsa, omnino abstinendum, & omnibus calefacientibus ac resiccantibus ut sunt aromata, & quæ inde conficiuntur. Febre autem hac moram trahente, commodissimè exhibetur lac asinæ, quod lacti muliebri quam aliorum animalium similis est, & minus citò in ventriculo corrumpitur. quod mane exhibendum, initio quidem non amplius 2 cyathis, ut Gal. suadet, potestea verò etiam amplius, quando

quando videlicet comper-
 tum est in ventriculo non
 corrumpi. bibendū autem
 istud lac mox ut mulctum
 est. Extrinsecus convenit
 imprimis aerem contempe-
 rare, ut non calidus, sed fri-
 gidus sit, quemadmodum
 in curatione ardētis febris
 dictum est. Conveniunt &
 ejusmodi Epithemata. lau-
 datur autem à Gal. & ung.
 refrigerans, ex cera lota, &
 ol. rosato, ex ol. omphaci-
 no etiā loto composito, ad-
 dito pauxillo aceto. quod
 non toti pectori, aut toti
 ventri erit admovendū, sed
 præcipuè partibus in quibus
 calor residet, cordis videli-
 cet, aut jocinoris regioni.
 Balneum verò etiam com-
 mendatur aquæ dulcis &
 egelidæ, in qua si malva, aut
 bismalva decocta fuerit,
 tanto erit præstantius.

De Marasmo.

CAP. IJ.

Marasmus est corru-
 ptio corporis viven-

*I. Quum riventia tria
 sint, animalia, plantæ, ac
 semina & fructus. de his*

D 5

pro-

propriè ; metaphoricè
etiam de alijs quæ siccitate
corrumpuntur, hæc
vox usurpari solet. Gal.
de Marasmo. *Φθoγς*
vox hic latè accipienda,
etiam pro illa corruptione
quæ sine putredine
fit, quemadmodum arbor
carie corrumpitur.

tis ex siccitate. Duplex autem
Marasmus est. quidam enim
ætate contrahitur, qui est
ipsa mera senectus. alter
verò heclicis febribus succedit,
quum videlicet humidum
primigenium, & calidum
innatum heclicus febrilis
calor depopulatus fuerit.
tunc enim cor & corpus
non modo siccius, sed &
frigidius redditur. & talis
quidem Marasmus senectus
ex morbo appellatur.
quamdiu autem calor extraneus
sentitur, non Marasmus,
sed Hectica marasmodes
dicitur. nec enim prius
quam deficiente calore
Marasmus est. Est verò
hic quandoque, non perfectus
adhuc, videlicet ad
majorē corporis extenuationem
tendens. aliquando vero
planè absolutus. Non
dum autem perfectus
Marasmus est quū ea tantummodo
quorum substantia ex humore
concreto constat, sicut caro
& adeps, liquata sunt.
Major verò quū propria
humiditas unde partes

partes nutriuntur, omnino consumpta est. Absolutus verò Marasmus est, quum etiam solidarum partium substantia reddita est siccior. In hoc Marasmo non solum frons tensa & sicca, oculi supra modum profundi, tempora collapsa & cava, extremâ & immodicâ extenuatione & siccitatem ostendunt, sed adeo quoque contracta sunt præcordia ac ventris muscoli consumpti, ut nihil ex ijs præter fibras & cutem supersit. Et talis curationem non recipit.

Qui verò ad perfectionem nondum pervenit curari debet extrinsecus quidem Balneis humectantibus, ut ex aqua dulci, aut ol. dulci; ut est amygdalarum dulcium, quo nonnulli senes sicci ac squalidi vitam suam produxisse dicuntur. Intrinsecus verò optimo cibo ac potu ali ac refici corpus debet, veluti ijs quæ facile ac cito cōcoquuntur & alimenti plurimum con-

2. *Extenuatis ita musculis & interaneis pulsus Aortæ lumbis incumbentis ferè ad xiphoidem cartilaginem usque, nonnunquam percipi potest.*

3. *Aristotelem in pelvi calentis olei lavare solitum Diogen. Laert. refert. Vixit autem annos septuaginta. Duo sunt, inquit Plin. liquores corporibus humanis gratissimi, intus vini, foris olei, arborum è genere ambo præcipui; sed olei necessarius. l. 14. c.*

22. *Pollio Remulus quicentessimū excessit annū corporis animique rigorem servasse se dixit, oleum foris, vinum intus adhibendo. Tali etiam balneo Paulus 3. in Pontificem maximum anno ætatis 67. electus ad annum 82. vitam produxisse dicitur.*

4. Non unius, sed trimum aut quatuor mensium. talium enim jus validius nutrimentum habet.

5. Simplici modo parati. nam qui majori artificio fieri solent, nidoris multum, imò & putredinis aliquod veluti initium habent; quod ex gustu atq; odore subputido facillimè deprehendēt qui nares emunctas, palatumque tersius habent. Succus autem qui ex carnibus elixis, aut semiaffatis exprimitur ut plus nutrit, ita debiliores etiam magis gravare solet. Medium quid inter hæc duo quod Colatitium mulierculæ vocant, atque ex concisa

pullor. aut gallinarum pulpa, superfuso ejusdem jure, ac per setaceum, aut linteum trajecto, conficiunt. 6. Vbirefrigeratum fuerit. alioquin mixtura ingrata redderetur.

De

ferunt. lactis usus non est improbandus. sed præter hoc conveniunt quoq; ova recentia, mollia, & præsertim ipsoꝝ lutea. Vina dulcia & flava. jura carniū musculosarum, pulli gallinacei⁴, carnes vitulinæ, & quum vires imbecilles admodum sunt, decoctarum carniū succi, ut carnis vervecinæ, aut vitulinæ, aut caponum⁵. Ex fructibus utiles habentur nuclei nucum pinearum, ac nuclei pistaciorum, qui contundi ac juri carnis admisceri possunt, aut cum saccharo⁶ in morculos digeri. Ab acidis & austeris omnino abstinendum est, & ab aquæ potu. Sæpius autem aliquid exhibendum; & hoc ipsum in nō magna quantitate. corpus enim refectionem postulat; sed vires debiles copiosum alimentum non ferunt.

De febre Semiter-
tiana.

CAP. 16.

Semitertiana : ex tertia-
na & quotidiana ² mi-
tura componitur ; & ex
duob. constat humoribus
putrescentibus, Bile videli-
cet, ac pituita : qui si pares
ac æqui potētes fuerint ex-
quisitam faciunt Semiter-
tianam. quod si verò alter
exuperet tunc unius mino-
ra quam alterius sunt sym-
ptomata, veluti Bile supe-
rante accidentia Tertia-
nae majora sunt : si pituita,
quotidianæ continuæ affe-
ctus firmiores sunt.

Invadit Semitertiana cū
Horrore, qui medius est in-
ter Rigorem & Frigus. ab
invasione æger incalescit,
aque ratione Tertianæ; sed
propter Quotidianam ex-
pituita, caloris augmentum
interrompitur: sic ut quum
febris prope Statum acces-
sionis, vel in medio augmē-
to esse existimatur, horror
rursus accedat, & pulsus

1. Quod mediam ipsius
partem Tertiana, me-
diā Quotidiana consti-
tuat. 2. de differ. febr.
Alioquin si multitudinē
& malignitatem sym-
ptomatum spectes, non
hæc dimidium tertianæ;
sed tertiana dimidium
hujus dici deberet. 1.
Epid. sect. 3.

2. Continua 2. de dif-
fer. febr. c. 8. nam qui
ex utraq; intermitten-
te, ideoque intermitten-
tem fieri posse putant,
ut autor libri qui Me-
dicus inscribitur, c. de
humorib. contra men-
tē Hippocr. id faciunt.
1. Epid sect. 3. aph. 5.
Neque ex utraque con-
tinua componi potest,
quod cum horrore inva-
dat.

3. Quia tum sola invadit Quotidiana.

4. Quod tamen rarum est, æqualis enim mixtura una est; inæquales infinitæ.

5. Quum bilis exuperat
24. quum pituita 48.
quum æquales 36. horarum paroxysmi fiunt.

tardiores, ac minores fiant, ac calor ab extremis partibus recedat; circa ventrem verò, ac Thoracem hæreat. Singulis diebus accessiones invadunt, sed uno die febris magis invalescit reduplicato etiam horrore; altero verò mitior est. Et tales quidem sunt Semitertianæ quæ æquivalentes + fuerint humores, & tertiana quotidiana æqualis. Quum verò tertiana prævaluerit, horridior fit febris, & aliquid Rigoris associat, caloris plus habet, & magis festinat ad statum accessionis; & aliquid bilis per alvum aut per vomitum excernitur, & sudores fiunt copiosiores. Sed quum pituita potentior est frigus vehementius & diutius extremas partes occupat: horrores pauciores, tardius etiam accessio invalescit, & longiori tempore consistit, nec sitis, nec ardor excedit. Accessiones autem Semitertianarum, quandoque horarum sunt viginti quatuor, quandoque 36. longissimi.

giffimæ quadraginta octo
 horarum. ad apyrexiam in-
 tegrè tamen non perve-
 niunt. nam nullâ ex ijs quæ
 ad apyrexiam evadunt, Se-
 mitertianam Hippocrat. 6
 appellavit.

Generatur autem Semi-
 tertiana quandoq; ex Ter-
 tiana 7 producta; aliquando
 per se incipit. Morbus lon-
 gus est, & omnino 8 pericu-
 losus. Frequenter verò cor-
 ripit virilem 9 ætatem, &
 ætatem virili proximam: &
 tempore 10 quidem autum-
 nali. Hippocr. phthisicos 11
 & eos qui longis morbis
 detinentur, hac præcipuè
 refert ægrotare. 1. Epid. 11
 comm. 3. aph. 5. 12 Affli-
 gitur autem & læditur per
 hanc febrem ventriculus,
 & maximè 13 nervosæ ejus
 partes. offenditur verò &
 hepar 14 non exiguè. subin-
 le & lathargici 15 conse-
 quitur. Gal. d. l. comm. 25. & de morb. temporib. circa
 nem. 13. Hinc non solum nausea & vomitus, sed &
 ingultus oboriuntur. 14. Quod ex tumore pedum con-
 are potest. 15. Si pituita feratur ad caput.

6. Vide 1. Epid. sect. 3.
 aph. 5.

7. Si pituita sub illa col-
 ligatur ex cruditatibus.

Imo Agathinus omnes
 tertianas longas semi-
 tertianas vocabat; quod
 Gal. non probat.

8. Quod complicatus
 affectus remediorum oc-
 casiones auferat.

9. In qua bilis ratione
 ætatis; pituita ex prava
 dicta colligi potest.

10. Quod Aer tum gra-
 vis, & varius esse solet.

11. Quia magnus in cor-
 de illorū calor est, pro-
 pter impeditā respira-
 tionem. Multa verò pi-
 tuita propter ætatem
 in illis coacervatur.

12. Semitertiana ex-
 quisita Romam inco-
 lentibus sæpissimè ob-

13. Hinc non solum nausea & vomitus, sed &
 ingultus oboriuntur.

14. Quod ex tumore pedum con-

16. *Si bilis caput impetat.*

quantur affectus; vel Vigiliæ¹⁶ molestæ sunt. lingua quoque subinde arida ac sicca. Difficilis autem hujus febris agnitio est, & vix non nisi post aliquot dies cognosci potest. atque idcirco & curatio ejus difficilior.

17. *Propter vires jam prædebilitatus.*

Semitertiana si prorogata & diuturnæ tertianæ successerit, vel alijs longis morbis supervenerit, veluti phthisi, sanguinis detractionem¹⁷ non admittit. Si verò per se inceperit, non minus quàm aliæ putridæ, sanguinis missionem requirit. qui tempestivè viribus adhuc constantibus, detrahendus est.

Medicamenta talia esse debent ut utriusque humoris putrescentis, flavæ videlicet Bilis ac Pituitæ consideratio habeatur. quomobrem nec multum calida, nec valdè calida hæc esse oportet; sed incidētia, aperientia, & abstergentia, & talia qualia in tertiana spuria conveniunt, sic tamen ut
ejus

ejus humoris qui amplius
 redundare videbitur major
 ratio habeatur. Ad præpa-
 rationem igitur humorum
 conveniunt rad. fœniculi,
 rusci, apij, petrosel. aspara-
 gi. & ex herbis cassuta, eu-
 patorium vulgare, cicho-
 rium, dens leonis. ex qui-
 bus decocta parari possunt,
 in quibus commode dilue-
 tur syr. acetosus simplex,
 vel etiam de succo limo-
 num, addito etiam syr. de
 cichor si bilis amplius re-
 dundet; vel syr. de Byzan-
 tijs cū aceto, vel simili ali-
 quo, copiosiore existente
 pituita. Laudatur ab Avic.
 absinthiū Ponticum¹⁸, non
 statim, nec in initio morbi,
 sed apparentib. in Urina
 concoctionis signis. quod
 & à Gal. Aetio, & Ægineta
 in curatione Tertianæ non
 exquisitæ commemoratur.
 absterget verò bilem, &
 robur ventriculo conciliat.

18. *Latifolium, seu
 vulgare. illud enim Pon-
 ticum veterum est, & il-
 lo quod vulgo Romanum
 dicitur, & pro Pontico
 habetur, magis roborat,
 & melius ad illos affe-
 ctus qui non aperiens,
 detergensque, sed simul
 roborans auxilium re-
 quirunt.*

Humores verò peccan-
 tes expurgari convenit per
 ea quæ utrunque educunt,
 qualia in curatione tertianæ

E

non exquisitæ ostensa sunt. Avic. suadet etiam quandoque Vomitorium exhiberi ex aq. raphanidis cum syr. acetoso.

Victus ratio non debet esse nimium refrigerans, sed temperata. cum cibis coqui possunt hyssopū, origanum, petroselinum, vel similes herbæ & radices quæ incidendi & aperiendi vim habeāt. laudatur & ptisanæ usus cum pipere. A vino abstinere convenit, aut eo parcè ac modicè utendum ne caput feriat.

Providendum quoque est ventriculo unctionibus ex ol. mastichino, nardino, & cytoniorum. Iocinoris cura quoque non negligenda, cui, si vehementius calet, Epithematis succurri poterit, ut in febre ardēte. Avic. pil. quoque præscribit & laudat ex aloë, mastiche, myrobalanis cytrinis, rhabarb. succo hepatorij, succo absinthij, & rosis rubris, singulorum æqualibus portionibus. quæ exhiberi possunt.

19. Quia sæpe lethargus, aut vigilie superveniunt. in utroque autem casu vinum malum est. quod humorum ad cerebrum metastasin augeat, illiusque vires expultrices debilitet.

20. Quod Melinum Gal. vocat.

21. Proprie quando materia phlegmatica est magis vincens. Addit autem Avic. dimidiam croci partem. Crocum autem forsā satius fuerit omittere quod caput feriat.

sunt cum decocto, vel aq.
vel syr. alicujus refrigeran-
tis, velut cichorij, vel endi-
viæ²²; ut contemperetur
calor pil. quæ calidæ sunt,
sed alioqui jocinori & ven-
triculo utiles. Et talis est cu-
ratio Semitertianarum per
se incipientium.

Quæ verò alijs morbis
superveniunt curari debent
pro ratione morborū qui-
bus succedunt.

De morbis publice grassantibus.

CAP. 17.

Publicè grassantes sunt
ex genere eorum qui
Græcis Pandemij, seu com-
munes dicuntur. Duplices
autē hi sunt; quidam enim
sunt Endemij; aliij Epide-
mij. Endemij dicuntur qui
in aliqua regione frequen-
tes & consueti sunt; & om-
nes ferè ex æquo corri-
piunt, causamque habent
communem. Epidemij ve-
ro virati, insuper & mulieres correptæ fuere. Pausan. in
Corinth. aliquando omnes prægnantes abortisse refert.

²². Aut acetoso, inquit
Avic. qui pil. has ad. 3
ij. exhibebat, non in hac
tantum febre, sed & in
alijs, inq; omnibus mor-
bis chronicis in quibus
viscera læduntur.

1. Qui semper in aliqua
Regione sunt, ut Scor-
butus in Hollandia, Fri-
sia; Dracunculus in Gui-
nea.

2. Epidemiam suo tem-
pore fuisse podagram
narrat Pithermus apud
Athenæū. 2. dipnosoph.
quum viginti annis mo-
ra ad maturitatem per-
venire non potuissent,
qua non solum viri, sed
& pueri, puellæque, atq;

E 2

3. Talis fuit & Sudor Anglicus. qui anno 1529. Amsterdamum primum attigit. infecti verò fuere à die Iovis ad Dominicum, duo hominum millia; consistentis plurimum ætatis. minores, ac valdè senes vix attigit. Pauci moriebantur. postquam scilicet remedia à vicinis civitatibus communicata fuissent. prius enim ut violenter sudorem exprimerent, multitudine stragulorum, vel charissimos sibi, veluti suffocabant.

4. Nimietatem frigoris, aut caloris, vel humoris, vel siccitatis pestilentias gignere Philosophi, & illustres Medici tradiderunt. Ammian., l. 19.

rò sunt quidem multis simul obvenientes, sed non familiares ac frequentes, sed præter consuetudinem supervenientes. Differunt autem ab his duobus qui Sporades vocantur. genere hi diversi sunt, nec omnes simul invadunt, sed modo unum hic, alias alterum alius morbus corripit. Epidemij autem sive populares morbi duplices sunt. quandoque enim non pestilentes, sed mitiores existunt ut sunt febres acutæ, dysenteria, peripneumonia, & alij similes, quos contingit nonnunquam populariter grassari. aliquando verò Epidemij Pestilentes, ac exitiales sunt, ut qui cum bubonibus, carbunculis, aut nigris maculis invadunt.

Causa autem Epidemiorum communis quoque aliqua est, veluti Aer + quem omnes, qui se in aliqua qualitatibus modum excesserit,

præ-

præsertim in calore ac siccitate morbos parit, non tamen pestilentes. quod si verò idem corruptus & inquinamentis quibusdam infectus fuerit humanæ naturæ repugnantibus, pestilentiales ac exitiales inducit. Corruptitur autem Aer vel à causis Superioribus, vel ab Inferioribus. A superioribus inficitur, si aliqua aeris intemperies perniciofa, diutinè constiterit; qualis est calida & humida ac austrina cæli constitutio. nam sub hujusmodi constituramus, sive intemperatus, sive non sit. 7. Quia sæpè inficitur aer ut pestis ad quædam tantum animalia perveniat; & quū homines percunt sæpè animalia non afficiuntur. sic peste per Apollinem Græcorum exercitui ad Trojam immissa Muli primum & canes, deinde etiam homines moriebantur. 1. Iliad. Miasmata aeris instar veneni, imò venenum sunt. hoc verò aliud alijs animalium generi. At quæ causa quod in veneta quadam peste, & tempore Iacobi. de partib. virgines nobiles potissimū morerentur in illa quæ anno 1348. grassata est, vulgus; in alia anni 1360. quamplurimi nobiles? Vide Plin. l. 7. cap. 50. 8. Quidam recensent & stellarum dispositionem. & medicus ad causam proximam respicit. astrorum dispositionem mutare non potest; aeris &c. potest.

9. Vti in obsidione Amidenæ, quod cadaverum multitudo humanitum officia superaret. Ammian. l. 19.

10. Inundationem Tyberis subsecuta est pestis Inquinaria, quæ Pelagium papam, tantamque multitudinem percudit ut ex inestimabili numero vix pauci superessent. Paul. Diac.

11. Vt post magnos terrarum motus, emittente terra aerem pigritia, æternorum ignium, terrarum, aquarum vitio corruptum. Senec. 6. nat. quæst. c. 27.

12. Agens enim non agit nisi in passum prædispositum. Socratem in

nobili illa Atheniensium peste temperamenti probitas ac spirituum vigor à contagio servavit. Ælian. var. hist. l. 13.

Anno qui nostram pestem secutus est, 1603. paucissimi aegrotabant. an quod ob intemperiem, humorumque vitia morbis aptissimi, peste sublati essent? 13. Sic à corrupti

frumenti usu Scorbutus anno 1555. primum vagari cœpit. In obsidione Mittelburgensi quod lini semine famem sustentassent, inflati distentique plurimi moriebantur. Hinc illud Hesiodi. *Ἀμὲν ὅμῃς ἔχουσιν*.

tutione vapores putridi non solum continentur, sed generantur, ac augentur.

A causis verò Inferioribus vitiatur aer vel quod con-

clusus sit & non diffletur; vel ex re quapiam fætida, ut

à cadaveribus mortuorum insepultis, à cloacis, à pa-

ludibus, vel terræ hiatusibus corruptum aerem expiranti-

bus. Inficiuntur autem ab aere pestilenti maximè qui

apti ac dispositi sunt ut inficiantur, ut calidi ac humi-

di superfluis humoribus redundantes. Contingit verò

& quandoque ingruere popularē morbum vel à cibo

corrupto, aut potu aliquo vitiato, ut tempore famis

evenire potest.

Aeris

Aeris verò pestiferi conditio multorum lignorum incendio, præsertim ab ea parte qua venti flant, corrigenda est. veterū enim medicorum experientia compertum, pestilentem aerem igne repurgari. Hippocr. quum ex Africæ locis pestifer [aer] Athenis inveheretur¹⁴, ignes construi fecit, atque ita civitatem à lue pestifera vindicavit. quod & olim Acron philosophus Agrigenti consuluit. Corrigitur verò Aer & odore ac vapore aceti, sed intra parietes citius quam alibi. sic & vestes, stragula, aliaque similia aceti rore conspersa, vel vapore imbuta, à pestis seminarijs repurgantur.

14. Ex lignis quercinis, aut juniperinis qui sunt ignes alijs utiliores sunt. Frequēs explosio æneorum tormentorum Tormentensem aerem à seminarijs pestiferis aliquādo expurgavit. Lemn. l. 2. c. 10. Sunt qui incenso pulv. pyrio aerem ædibus inclusum ab inquinamento liberent. [Calore aucto, ut quan-

do sol leonis signum ingreditur, in Syria, Palestina, atque Ægypto, pestis mitigari solet, uti apud nos Hyeme. Ratzevil. in itinere Hierosolym. Prosper Alpin. de med. Ægypt.] Contra etiam imbres vel exigui dissecto concreto spiritu & crassato, sospitatem aliquādo restituunt corporib. firmam, ut refert Ammian. l. 19. Quod etiam anno 1602. in peste qua apud nos 11000. hominum quinque mensium spatio, Iunio, Julio, Aug. Sept. Octobrique, interiire, contigisse vidimus.

De Peste.

CAP. 18.

1. Quod pessum det, h.

e. funditus evertat. Est autem malum hoc non tantum κακὸς θῆς, καὶ ὀλεθρὸν, sed etiam πολυμορφὸν & quod diversa, imo contraria etiam symptomata invenebat. neque enim certi morbi nomē est, sed quicunque Communis & lethalis, Pestis dicitur. Gal. 3. epid. s. 3. aph. 20.

2. Spiritum ac sanguinem in ventriculis illius contentum.

3. Aliquando nec qualitatib. intemperatus, nec substantia corruptus, tamen propter im-

mista Seminaria, non secus ac vinum bonū veneno, mixtum, perimit.

4. Contagium qui negant communi sensu carent, qui ad causam superiorem non respicientes officium deserunt, impietatis atque inhumanitatis, culpam incurrunte. Est autem id quod contagium infert idem cum priorē causa, in porositatib. illarum rerum latens quæ aquam, ideoque magis aerem admittere possunt. seorsim tamen de eo fit sermo in recensendis causis, quod priorē causa cessante, nihilominus agat.

Pestis: est morbus contagiosus & exitialis cor & ejus contenta vehementer inficiens, vitalemq; facultatem labefactans.

Origo autem Pestis vel ab aere est: putrido ac corrupto, vel per contagionem contrahitur. Aeris autem corruptela vel Universalis est, ut quando populariter sævit: alias Particularis, quādo videlicet in uno aliquo loco, veluti in aliqua domo, corruptus est, & unam aliquā familiam tantummodo invadit. Contagium autem contrahitur ex conversatione cū infectis,

vel

hel ex tractatione eorum
quæ penes laborantem, &
præcipuè morientem fue-
runt, ut sunt vestes laneæ,
aut pelliceæ; stragula, lin-
eamina sudore aut excre-
mentis infecta.

Quædam autem Pestis
plurimos è vita tollit, quæ
omnino exitialis, ac maxi-
ma est. altera verò multos
spernit, quæ maligna dici-
tur.

Differt verò pestis à fe-
bribus putridis primò per
efficientē & agentem cau-
sam. putridæ enim febres
gignuntur ex humoribus in-
qualitate, aut quantitate
peccantibus, & putrescen-
tibus.

pestis verò non ex
interijſſe ſcribit Euseb. Idem sub Commodò factum. quan-
do Camillus hac mortuus est, 10000. uno die moriebant-
tur. anno 1348. per totum quasi mundum vix quartam
hominum partem dimisit. Cayri aliquando ad decem dies,
24. horarum spatio. 20000. à peste sublata narrat Rad-
zevil. in itinere Hierosol. 7. Vt illa qua apud nos anno
1602. ad summum centum uno die periere. 8. Gal.
putredinis solummodo excellentia differre putavit. 1. de
diff. febr. c. 5. & 6. Epid. sect. 1. comm. 28. Sed ubi de re
convenit logomachijſ indulgendum non est.

E 5

5. Tum enim corruptio
in summo gradu est; &
causæ magnitudinem
ostendit mors. Alioquin
etiam qui vivunt, & quæ
ab illis inquinata sunt,
inficiunt. nec instar cor-
poris alicujus morientes
denum deferens in ca-
rum aliquem locum mi-
grat, aut lacte aquave
excipi potest, ut vulgus
sibi persuadet.

6. Hinc Deber apud
Hebr. quibusdam dicta
creditur, quod vasti-
tatem faciat, & loca
veluti deserta reddat,
Imperatore Vespasiano,
duo millia quotidie

vitio humorum, sed per venenosa quædam seminaria cordi ac ejus contentis communicata provenit.

2. Quod in putridis transmittantur ad cor vapores vitiosi qui cor & contenta ejus supra modum calefacientes, tantū accendunt: In Peste verò si invaluerit & cordis contenta, & ipsius substantia putrescit. neque parva est hæc putrefactio, aut qualis in febribus putridis, sed vehemēs, maligna, & penitissimè ad cordis contenta & substantiā ejus pertingens. Communicantur autem pestis seminaria cordi 1. modo [per Transpirationem] per poros scilicet, & exiles venas, & arterias, à quibus ad majores penetrant, & ab his ad cor. alio modo per attractionē quæ fit per inspirationem. tunc enim simul cum aere pestis seminaria ingrediuntur, quæ introducta non eadem facilitate regrediuntur per expirationem ac per inspirationem ingressa sunt.

unt. Citissimè autem quandoque Pestis seminaria ad or perveniunt⁹. quando videlicet acutissima & tenuissima sunt. aliquando nõ aded festinant ubi minùs acuta, aut acuta existunt.

Pesti autem gravissima quæque superveniunt initio quidem¹⁰ somnolentia, & mentis quidam stupor. post paucos dies capitis dolores, vigiliæ; & ubi morbus invaluerit, etiam deliria & linguæ asperitas. accedunt febris lenta cum extremarum partium frigiditate; inquietudo, crebræ¹¹ vomitiones, & respirandi difficultas. quod si verò una cū his in collo, sub axillis, aut in inguinibus tumores sentiantur, aut aliqua corporis parte¹² Carbunculus excitetur, vel maculæ nigræ appereant pestem esse morbum dubitari non potest. Urinæ in peste non constant, quandoque sanorum

profundè satis scarificabantur; vix minima phlegmone, tumoreve in locis vicinis conspicuo.

9. *Cicuta in vino pota irremediabilis existimatur. Plin. l. 25. c. 13. tenuitate namq; vini ad cor virib. irre fractis rapitur. Idem de semicarijs tenuib. & maximè activis evenit.*

10. *Quod venenum cor obsidens Animalium spirituum alacritatem infringat. Isti anno 1602. omnes quasi moriebantur.*

11. *Talium qualia in corporib. reperiuntur. neque enim semper biliosa vomitu rejici, compertum est.*

12. *Carbunculus incipit à vesicula quasi à combustione, quæ post concidens crustam nigram, velut à cauterio, relinquit. unde & nomen habet. In peste anno 1602. carbunculos ex cinereo albicantes frequenter vidimus, qui sine sensu*

similes, aliquando albidæ, vel perturbatæ veluti jumentorum. Ex Pulsu etiam nihil certi habetur. Alvi excrementa crebrò fœtida sunt, subinde liquida.

Præservatio.

Præservatio fit, aere corrupto in meliore commutato, ut dictum est. Id si fieri nequeat, optimum est consilium, aerem¹³ & locum citò¹⁴ mutare, & ad salubriorem secedere. Corporis verò etiā cura¹⁵ habenda est, quod ab omnibus excrementis & superfluis humoribus, & viscerū obstructionibus vacuum ac liberum esse expedit. Sanguinis detractio consueta; si prætermissa fuerit, reperi-

13. Commodus Imperator suasu medicorum Lauretum, quod frigida illa regio, & lauri nemoribus, obsita, secessit. Sic Bacchus quum in Indos duceret exercitum peste correptū ex campestribus, ad montes migrare voluit, atque illic frigidorum ventorum statu, purissimorumque fontium

usu, vicinaque recreatum, convalescere. Diodor. Sicul. l. 2. refert. 14. Hinc illud; Mox, Longe, Tardè; vel ut alij; Cito. procul, tardè, cede, recede, redi. Recedere, & non finita peste, rediisse periculosius, quam mansisse vidimus. Barbarie incolæ si quando Pestis ingruat regionem illam deserunt. Ioh. Leo. 15. Nam utut ex vitiosis humoribus pestem fieri non putemus; tamen aliunde gravatum cor, se-

tatur.

tatur. Humores si qui fuerint vel redundantes, vel vitiosi, levibus medicamentis ¹⁶, quæ resiccandi vim habent, expurgentur; ut est rhabarb. vel aloë lota in succo rosarum; vel medicamentū Ruffi quod constat ex aloë, myrrha, & ammoniaco. ex quo pil. confectæ, & scrupul. duorum pondere plus minus sumptæ, excrementa alvi expurgant. Veteres in exigua quantitate ¹⁹ dandum hoc medicamentum consulerunt, verum non expurgandi, sed præservandi tantummodo gratia.

Victus autem ratio moderata, & absque omni excessu [sit] ex optimis cibis ²⁰, ac probo potu corruptioni non obnoxiijs. aceti in om-

¹⁶. Iis qui in pestilentia integri sunt, movenda non est alvus, atq; etiam si per se mota est, comprimenda est, abstinendū potius si plenius corpus est. Cels. l. i. c. ult. Sed ille de validioribus, qualia veterib. solummodo nota erant, loquitur.

¹⁷. Quo calor aloës temperatur. Haud dubie singulare remedium est, quo Dodon. se frequenter uti solere, narrabat.

¹⁸. Loco ammoniaci Officinæ male substituunt crocum. hujus experientiam se habere dicebat Dodon. quod nihil proficeret. in eo quod ammoniacum recipit pluscu-

lum spei se ponere. roborare enim partem; quod syr. rosatus solut. nequaquam, & minus adhuc manna, aut cassia faciant. robore verò principalium viscerum hic omnino opus esse. ¹⁹. Fabæ Ægyptiacæ magnitudine. h. e. g. v. sex semiobuli. ²⁰. Horapollo columbis vefcentes Peste nequaquam corripit dicit. ideoque Regi tali tempore nullum aliud quasi cibum apponi solere. In Hieroglyph.

21. Per nimium enim somnum seminaria magis introducuntur.

22. Quæ apud Aetium mysterium appellatur. & Tetrapharmacum ex Philagrio, serm. 12. c.

47. Si addatur ebur Diapente appellabatur à mulomedicis. Veget.

1. Veterinaria. c. 10. Ejus experimentis indubitata vires; & sine hac mulomedicus mutilus est. c. 16. Pro bubus loco eboris indebant betonicam. l. 3. c. 2. Venetijs aliquando Diateffar. Bolū Arm. veram, dyctamnū album, scordium, carlinam, & zedoar. addunt. Bolū vix qui mangonio caret, reperias. Dyctamno albo, cur verum Creticum non præferamus haud video.

ni cibo utilis usus est, & aliorum quæ refrigerant ac resiccant, ut sunt aciditatem habentia, veluti citria mala, aut aurantia mala acida, limones, vinum omphacites, quod Omphaciū appellant.

Exercitiū corporis non est negligendum. In Somnō mediocritas servanda. Metus omnino propulsandus. per hunc enim, quum cor angitur, à seminarijs pestis inficitur facillimè.

Laudantur verò ad præservationem à peste utilia quædam remedia. Gal. bolū Armenam commendat, & theriacam Andromachi, quā Antoninū usum refert. antidotus Mithridatica utilis quoque est. tum & diateffaron, facile parabile medicamentum. Elect. liberans à recentiorib. cōmendatur. Nos & aliam composuit. invenimus magis diaphoreticam, quæ circa cor hærentia foras, & ad exteriora pellit, atque ea de causa non modo ad præservatio-

vationem, verum etiam ad
 curationem, si tempestivè
 exhibeatur, plurimum fa-
 cit, Accipit hæc rad. tor-
 mentillæ, rad. carlinæ, rad.
 angelicæ, zedoariæ, ana-
 3 β. 3 scordij. 3 iij. baccar. 23. *Quidam crudas car-*
 lauri, baccarum juniper. *nes scordio contextas*
 ana 3 ij. β. cinnamomi, ma- *corrumpi negant.*
 cis, croci, sem. acetosæ,
 ana 3 j. ex quib. fit pulvis,
 cui per minimas guttas in-
 stillandum aliquid aceti, at-
 que sic ad usum conservan-
 dus. Ex hoc pulv. tabellæ ex
 sacch. formari possunt cum
 aq. tormentillæ, aut cardui
 benedicti, quarum in sani-
 tate ad præservationem sit
 usus. pulvis ad curationem
 adhibendus ut dicetur. Ad
 præservationem convenit
 & odor optimi aceti²⁴; quo
 spongia imbui potest. quod
 si illud acrius fuerit, poterit
 lilui aq. rosaceâ. Feruntur
 & prodesse gestati nonnulli
 lapides pretiosi, ut sunt ru-
 binus, saphyrus, & hyacin-
 thus²⁵.
 Puerorum verò & magna
 ratio tempore pestilenti ha-

24. *Pilæ ex ambra simi-
 libusque quæ aromatica
 & suavia sunt, spiritus
 evocant. unde facilius
 inficiuntur.*

25. *Expertum se de
 hyacintho testabatur
 Dod.*

26. Non usti (nā quamvis siccet, vim tamen quam à tota substantia habet, amisit) sed solummodo lima rasi.

27. Ut simul expellantur. nam alioquin in visceribus putrescerēt. Possum & fol. sene ejus loco in pauperib. dari, sed rhabarb. melius est.

28. Quo celerius ejusmodi tempestates corripunt, eo maturius, auxilia etiam cum quādā temeritate rapienda sunt. Cels. l. 3. c. 7. Occasio enim præcept. Itaque hic locum habet illud; Μηδὲν ἀνὰ βῆμα δόμῳ. cunctari, est egrum quasi occidere.

benda est. nam quum calidi ac humidi sint, ac non raro vermes in corpore habeant facilius reliquis peste corripuntur. Expedit itaq; illis exhiberi quædam quæ vermes expellere queant, ut semen sementinæ cui addi convenit aliquot cornu cervi²⁶ ramenta, & nonnihil²⁷ rhabarbari, & quandoque quæ caliditatem seminis contemperent, ut est semen acetosæ. ex quibus pulvis exhibendus est cum aq. portulacæ, aut cardui benedicti. potest verò & ipsis nonnihil theriaces exhiberi; tum verò & alia contra vermes utilia, quæ suo loco ostenduntur.

Curatio Pestis.

Curatio pestis in tribus potissimum consistit. 1. In expellēdis seminarijs à corde ad ambitum corporis. 2. In Localibus remedijs. 3. In Accidentium curatione²⁸.

Expelluntur autem pestis semi-

eminaria per medicamen-
ta diaphoretica, sudorem
moventia²⁹, veluti quæ fiunt
cū aq. tormentillæ, vel car-
du benedicti, additâ the-
riaca, vel aliquo alio sudo-
rem movente, ut est Com-
positio nostra; cui adjicitur
& aceti³⁰ aliquid, vel syr.
acetosus, vel de limonibus.
Sumpta hujuscemodi po-
tione æger collocandus est
ante ignem; vel si mavult
decumbere, diligēter con-
tegendus est, ut sudet³¹, cu-
stodia adhibita ne dor-
miamat, aut potionem evo-
mat. si evomuerit, repeten-
da³² est. Post sudorem, si
tumores sese remiserint, si-
milis potio, sed³³ dilutior

29. Ignea medicamen-
ta requirit Cardan. non
tamen noxia, ut est hy-
drarg. sublimatum, quo
nonnullos curatos, plu-
res tamen enecatos scri-
bit 2. de subtil. Eu-
phorb. multis usitatum,
ejusdem generis esse pu-
to. Sunt qui salempetræ
purificatum; aut etiam
puly. pyrium exhibeant.
At Theriaca innoxius
veluti purgatorius qui-
dam ignis est. In libr. ad
Pison. hanc plus omnib.
alijs medicamentis anno
1602. præstitisse com-
perimus. nā aut curavit,
aut sympt. saltem miti-
gabat.

30. Flor. calendulæ, aut vetonicæ seu tunicis. hydroticum
est. 31. Quib. vires adhuc integræ sunt, præsertim pau-
perioribus, aliquando præcipitur, ut obambulent. sed dili-
genter cavendum ne sudor, quum venenatus sit, repercutia-
tur. 32. Aut alia similium virium propinanda, tum na-
eadem antidotus, ut crambe, nauseam magis moveat; tum
ne uni fidamus remedio, sed omnem veluti lapidem movea-
mus. 33. Syr. superscripti tum copiosius admisceri po-
tioni debent. ut temperatior existens calorē minus incen-
dat; cujus furēte adhuc veneno ratio haberi minus potuit.

E

exhibenda est, bis tervè per diem; donec tumores, vel maculæ evanuerint; sed citra sudorem.

Sanguinis missio, appa-
rente Bubone, & maculis,
non potest esse utilis. cor
enim primariò afficitur, &
non à vaporibus putrescen-
tium humorum, sed à vene-
natis pestis seminarijs op-
primitur, à quibus venæ se-
ctione liberari non potest.
interim detracto sanguine
cor etiam debilius reddi-
tur, quod nullo expedit mo-
do. Iam & sanguinis de-
tractio tumores ab ambitu
corporis ad interiora re-
vocat, quod minimè con-
veniens est. laudat verò &
Gal. libr. de Euchym. &
Cacoch. medicos, qui tem-
pore pestis à venæ sectione
abstinuissent³⁴. Carbunculo
autem apparente³⁵, quan-
doq; sanguinis missio non
omnino reprobanda si sta-
tim fiat, & ex vena Caribun-
culo proxima. Purgantia
medicamenta valdè noxia
sunt, & in quacunque pestis
specie

34. Nec nos cuiquam
anno 1602. profuisse pi-
dimus; sed sanguine ad-
huc fluente in quibus-
dam vomitus prorupisse;
mortemque subsecutam;
utut adhibitis omnibus
cautionib. ab ijs præ-
scriptis qui illam com-
mendant sectio facta
fuisse.

35. Carbunculi non
fiunt in emunctorijs. hu-
mores consentiunt; &
longior est morbus. quā
ubi Bubo. nec metuen-
dum ne intro ducantur
seminaria. nam proxi-
mam secamus. atque has
ob causas quandoque
minuimus sanguinem.
Purgandum tamen nul-
lo modo.

specie citissimè mortem³⁶ afferunt.

Bubonibus autem admo-
veri ea debent, quæ humo-
res eo decumbentes attra-
hant³⁷ & educant. laudatur
cape, vel liliorum alborum
radix cocta, & adplicata.
sed certissimum remedium
est, cauterium potentiale, &
si quæ similia sint caustica
& urentia.

Carbunculum³⁸ scarifi-
care utile est, deinde cucur-
bitulam admove; postea
adponere quæ mordicent
³⁹ ut ung. Ægyptiacū. Cau-
teria verò potentialia non
incommodè quoq; admo-
ventur⁴⁰.

Alvus si fuerit liquida, ut
frequenter contingit, pro
potu exhiberi potest deco-
ctum santalorū rubrorum,
aut decoctum cons. veteris
rosarum rubrarū. vel ipsa-
rum rosarum, quod exiguo
cinnamomo condit. pote-
rit. Si verò durior fuerit,
molli leniq; Enemate mol-
lienda.

36. In illa quàm anno
1602. vidimus noxia
fuisse & nos testamur.

37. Tum quod humores
eo repant, tum quod lo-
ca illa convenientia sint.
Si ruri sint ægri ranun-
culus, aut ranunculus
qui flammula dicitur,
contusus imponitur.

38. Quum crusta non
amplius serpit certum
est venenum non amplius
augeri.

39. Et vulnus seu ulcus
apertum servent.

40. Maculis vix localia
admoventi possunt, quod
per totum corporis ha-
bitum ac superficiem di-
spersi soleant. Quod si à
Diaphoreticorum usu
non evanescant, malè se-
dit ægro.

De febre Puncti-
culari.

CAP. 19.

1. Rubent ob putredinem humorum. non perspicuae sunt ob seminaria pestis.

2. Atque ideo non Pestis est, sed febris Synochus pesti implicata, seu pestilens.

3. Vel à morfu cimicū-relictis maculis. aliquādo latiores sunt, ut totum brachium, vel faciem instar Erysipelatis occupent. aliquando instar granorū milij prominent, instar variolarum seu morbillorum puerilium. Colore etiam variant, nam quamvis ut plurimum rubrae sint inveniuntur tamē & citrinae, purpureae, violaceae, lividae & nigrae. anno 1605. & dein Amsterdami frequentissimē conspeximus tales maculas faciem totam vel dimidiam cum tumore palpebrarum, & dolore faucium; vel alias etiam

PVncticularis febris à recentiorib. dicta, Synochis initio similis est. citra frigus, horrorem, aut rigorem invadit; & calor blandus, ac mitis est. Urinae sanorum similes, sed mox rubicundae¹, perturbatae, non perspicuae, vino granatorum persimiles redduntur. nulla aliqua parte tumor², aut carbunculus apparet. nullus vomitus. sentitur corporis lassitudo, & capitis gravitas. maculae non mox primis dieb. sed quarto, aut septimo die, vel serius primum apparere incipiunt in brachijs, dorso, & pectore, colore rubentes³, ijs similes. quae à pulicum morfu ac puncturis relinquuntur, quo tempore & calor intenditur, & febris major fit; accedente quoque vel vigilijs, vel mentis stupore, aut alienatione:

Causa hujus febris seminaria

naria quædam abaëre corrupto, sed non admodum acria, aut valdè tenuia sunt; & simul cum his sanguis computrescēs. idcirco nec celeriter contrahitur hæc febris, & diuturnior est; nec cōtagiosa, nisi per multam ægri tractationē. Corripuntur hujuscemodi febri præcipue pueri, & juvenes, & qui molliter, ac in otio vivunt; & per cœli quidem constitutionem calidam ac humidam.

Venæ sectio ex communi dextri brachij venâ primo, aut secundo die utiliter fit. apparentibus verò maculis nullo modo convenit. Cucurbitulas interim cū scarificatione tunc brachij aut dorso admoveere non abs re fuerit, vel hæmorrhoidas provocare.

Purgans⁶ aliquod medicamentum non etiam nisi primis diebus, & priusquā maculæ appareant exhibendum; idq; mite admodum, veluti ex syr. rosato solutivo cum infuso rhabarbari, aut

partes maculis planis⁷ aut etiam prominentib. invadentes, cum febris satis valida & gravi; ex qua tamē paucissimi, & non nisi 50. annum egressi moriebantur. Vbi-
cunq; maculæ apparuerant Epidermis separabatur. leviorib. purgationibus, Phlebotomia, Hydroticisq; alexipharmacis; ubi maculæ nondum apparerent; solis Sudoriferis & venenum depellentib. ubi illæ jam prorupissent, & quidem brevi curabantur. Contagiosam advertimus, ut Dod. dicit.

4. Propter similitudinem calidi & humidi temperamenti.

5. In peste contra.

6. Propter putredinem humorum opus est purgatione; miti tamē propter pestis seminaria.

7. *In ijs qui cutem duram & poros adstrictos habent sunt qui decoctum gnajaci cum aceto exhibeant. Iidem ung. quod hydrarg. habet illinunt, sed hæc unguendi ratio ut temeraria meo judicio repudianda est.*

8. *Ptisane cremor est nimis refrigerans. utendum familiari aliquo juscule pulli, aut simili.*

9. *Tenuiores posca uti possent.*

agarici, pro ratione materiæ peccantis. A fortioribus medicamentis abstinendū, ne ingens alvi succedat profluvium. quod periculosum admodū fuerit. Conveniunt etiam lenia & mollia enemata. Apparentibus maculis sudor invitandus est, per ea quæ clementer ipsum provocant, ad quod theriaca utilis est, præsertim si exhibeantur cum decocto scordij, cardui benedicti, aut tormētillæ; addito syr. acetoso, vel de limonibus. Propinantur verò ab initio utiliter potiones ex syr. acetoso, vel de succo citriorum, aut limonū, cum aq. cardui benedicti, cichorij, tormentillæ; vel ipsarum decoctis quibus additum sit nonnihil theriaces.

Victus ratio sit non omnino refrigerans *. Potus poterit esse decoctum ptisanæ, vel tenuis cerevisia, in quibus incoqui possunt aliquot ficus, deinde addi succus limonum, vel citriorum, vel aceti nonnihil.

Aer

Aer sit temperatus. non nimium refrigeretur¹⁰, si graveolentior per odores & suffitus emendetur. ^{10.} Ne percussio fiat illius quod natura ad superficiem expellit.

De Variolis & Morbillis.

CAP. 20.

AD naturam pestis, veterum nonnullorum, & præsertim Arabum: sententia, accedunt quæ dicuntur Exanthemata & Ecthymata; vulgò Variolæ & Morbilli. frequenter enim populariter grassantur; & sæpè eodem, quo pestis, tempore.

Corripiuntur autem citius pueri: quam alij, quibus etiam facilius solvuntur, quam grandioribus. magna verò ex parte salubres sunt morbi. Fiunt autem ab infectione quadam sanguinis ex menstruo: in utero ma-

stentes, quod anno 1608. in abortu foetus immaturi, matre morbillis correpta, contigisse, compertum est. 3. Ex cuius portione crassiore Variolæ, ex tenuiore morbilli oriuntur. Quando autem populariter grassantur, aeris corruptio magis minusve contagiosa accedit.

1. Inter quos Raz. libro de Peste. Veteribus Variolas & Morbillos ignotos fuisse qui fieri potest, quum causas illorum statuamus quæ in veteribus etiam fuerunt. Quod autem distincte de illis non egerint fortassis eadem de causa accidit, propter quam & herbas maximè notas, brevissimè, vel nominibus tantum suis, descripserunt.

2. Propter analogiã ut facilius corripiuntur, ita & facilius curantur. Imò quidam in utero materno adhuc exi-

4. Interdum etiam bis, aut ter. sed rarò. quia morbi ex aere contagioso contracti idem corpus rarò bis occupant.

5. Ut neq; cerevisia, neque vinum defecatur sine ebullitione. Febris autè secundum omnium opinionem, Synocha est.

6. Atque ideo neq; pruriunt. quod latè omnes ex pituita sint, quæ acrimoniam non habet. nisi per putredinem illam acquirat. hinc ubi in pus mutari cœpit pruritus magnus percipi solet. Variolas nostrates, de Kinderpocxkens; Morbillos, de Maselen appellant. Fuckf. Iunius, aliq; nominum horum significationem invertunt.

7. Quia humores sunt in renis; atq; in ipsa eava.

terno contracta, quæ quum natura secernit, & quasi per crisin quandam expellit Exanthemata ac Ecchymata proveniunt. & hac de causa omnibus in vita accidunt, & quidem + semel tantum; aut apta sunt ut accidant nisi præcox mors hominem prius è vita tollat. Non fit autem huiuscemodi secretio & expulsio citra sanguinis fervorem ac ebullitionem. atque idcirco cum febre erumpunt.

Exanthemata seu Variolæ pustulæ sunt latæ, albidæ, quæ suppurantur, & crustas relinquunt. Ex crassiore sanguinis, & pituitosiore portione hæ proveniunt. Ecchymata verò, sive Morbilli tumores sunt, non tamen alti, qui non suppurantur. Horum generatio ex tenuiore sanguinis portione, & magis biliosa provenit.

Præcedit Exanthemata Febris lenta citra rigorem, gravitas in somno, capitis & dorfi dolor, & quandoque

doque * raucedo quædam. Præcedunt eadē & Ecchymata, & cum his quandoq; sanguinis * è naribus fluor. Apparentibus hujuscemodi signis non temere suspicari licet vel Exanthemata, vel Ecchymata citò apparitura; præsertim si patiens his ante non laboraverit, & cum infectis versatus sit, & multi laborent.

Sanguinis missio apparentibus Exanthematis aut Ecchymatis nulla ratione¹⁰ admitti debet: sed prius facta prodest. nam detracta impuri sanguinis portione quod reliquū facilius à natura superatur, atq; expellitur. Simile est in Medicam. purgantibus. Contineri autem laborantes loco calido debent, & diligenter contegi¹¹. nulla frigida interiorius, aut exterius applicari possunt. Decoctum ficum aridarum, uvarū passarum, & sem. anisi, aut fœniculi utiliter bibitur. Et in sorbitionib. ficus aridæ incoquantur¹². Quando verò

8. Ab humoribus, versus pulmones destillantibus.

9. Exanthemata præcedere hæmorrhagiam rarissimū. crassiores enim humores sursum vix feruntur. Aliquando autē tā profusa est, ut copia sua terreat; quod potissimū in Sanguineis fieri solet, quæadmodū & mihi in puerita contigit.

10. Nam quæ natura ad superficiem expellit ad centrum, h. e. ab ignobiliorib. partibus ad nobiliores, viscera s. revocanda non sunt. sed quo illa vergit eo ducere oportet.

11. Opinio est rubra stragula similitudine coloris ad evocationem prodesse, quam sequitur Fracastor. At color obiectum visivi tantum spiritus existens, alios spiritus, humoresq; qui poterit movere?

12. Potest ad evocationē dari Theriaca in aq. carduibened. soluta.

13. *Prout adstrictione, ad nascendas, veluti in initio, solâ, vel etiam de-
tersione, ad jam natas,
ut morbo procedente,
opus erit.*

14. *Aut folijs succisæ,
hordeo integro, & gly-
cyrriza. in quorum de-
cocto dissolvendum mel
rosaceû, & diamorum.
Atque hoc gargarisma-
te frequenter os colluen-
dum.*

Variolæ erumpunt Oculo-
rum, Oris, & Gutturis cu-
ra habenda est. Præservan-
tur Oculi aq. rosac. aut la-
cte muliebri in quibus dis-
solutus crocus. quo oculi &
palpebræ illiniri debent.
Ori providebitur si quan-
doq; nonnihil diamori so-
lum¹³, vel cum melle rosa-
ceo in ore contineatur.
Quod si verò in Guttore
Variolæ jam eruperint Gar-
garismos adhibere conve-
nit partim adstringentes,
partim abstergentes, ut ex
folijs, aut summitatibus ru-
bi, folijs ligustri, aut corti-
cibus granatorum¹⁴.

De Febrib. cum animi deliquio ingruen- tibus.

CAP. 21.

SYMPTOMATA.

1. *Febriū. De hac ut &
de omnib. febrib. dili-
gentiss. scripsit Michaël
Savonarola.*

A Nimi deliquia vel cū
febre, vel absque fe-
bre fiunt. quæ cum febre¹,
quando cū oris ventriculi
insigni debilitate ac offen-
sa, pravi in corpore redūdāt
humores, proveniunt, qui
aliquando crassi, crudi ac
fri-

frigidi sunt, quandoque ve-
 rò tenues & biliosi. Recen-
 tiores ex frigidis humorib.
 natam febrem nuncupant
 syncopalem humoralē; al-
 teram verò syncopalem mi-
 nutam. Crudorū humorum
 copiam ostendunt præcor-
 dia tumida ac inflata, cum
 & ipsius corporis tumor &
 color albidus vel pallidus,
 veluti eorū qui aqua inter-
 cute laborant. Tenuium
 verò ac biliosorum redun-
 dantiam testantur corpo-
 ris habitus squalidus ac ex-
 tenuatus, rosiones circa os
 ventriculi, & oris amaritu-
 do, & quandoque vomitus
 biliosi. Animi autem deli-
 quium in accessionum ini-
 tijs maximè supervenit, &
 quodcumque ægerali quo-
 movetur modo. periculo-
 sus idcirco morbus cujus
 curatio perquam difficilis.

2. *Leucophlegmatia.*

3. *Tunc enim pulsus de-
 bilissimus vitalem facul-
 tatem gravari testatur.*

4. *Axioma Gal. quod in
 omnib. febrib. ex putri-
 dis humorib. sanguis
 mittendus hic locū non
 habet. vires collapsæ
 obstant.*

*Curatio ejus quod à
frigidis.*

Consistit autē hujus morbi curatio, partim in victus ratione, partim in alijs remedijs. Victus ratio requiritur facilis, aperiens, & attenuās; talis qualis in quotidianis, ex quarum Genere hæc quoque est. Dandus est cibus in exigua quantitate, propter humorum copiam; & frequenter, propter virium debilitatem. laudatur pro potu primis diebus aqua mulsa in qua decocta sit hyssopus aut thymus. Concedendum, verò & vinum est, album, clarū, non astringens aut austerum. In quiete continendus est æger. Tempore accessionis nullo modo somnus admitti debet. alio tempore permittendus. Laudantur verò & à recentiorib. frictiones matutino tempore & mox à somno factæ. humores verò præparandi ac concoquendi veluti in quotidiana. Purgantia med.
Gal.

5. *Ut possint citius concoqui humores & percutim evacuentur. qua ratione austerum arcendum est.*

Gal. dare veretur. recentiores tū leviorib. med. utuntur. Exhibenda autem talia sunt quæ ventriculum non offendant & humores pau- catim & per vices expur- gent ut sunt hiera picra & billulæ, Alephanginæ di- ctæ, quib. agarici correcti aliquid addi potest. Si pur- gantia med. dari nequeant & alvus nō respondeat ene- mata injicienda erunt, aut glandes supponendæ. Hu- morib. magna ex parte ex- purgatis ventriculi ostio providendum est, per un- ctiones aut empl. ut in quo- tidiana.

Ingruente autem animi reliquo aromatum odore peger reficiendus est. Gal. manem exhibet vino dilu- to intinctum. Recentiores vero etiam in vino aroma- te madefactum, vel ipsum vinum in exigua quantitate propinant, & levibus fri- ctionibus utuntur.

Deliquium ex tenuib. hu- moribus.

Quando vero ex tenuib.

6. In utraque tum debile est stomachi os, nam & in alijs crassi vel tenues humores abundant nū non sequitur syncope.

7. Quæ fere ad ardentē vel exquisitæ tertianæ naturam accedit.

8. Neque enim magna febris aut accessionis ratio habetur.

9. Nā cibus quamvis nutriat non tam corroborat ventriculum ut hæc.

10. Non quod refrigeret, utile enim, sed quod non satis nutriat.

11. Non quod alant valde quum non sint dulces, sed quod roborant ostiolū ventriculi.

humorib. una cum febrili deliquium accidit tunc citò ac frequēter nutrire necesse est, etiam in ipsis accessionibus, ut recentiores scribunt. Aer sit frigidior in quo ager decumbit. stragulis paucis contegatur à frictionib. & sudore abstinendū. cibus sit facilis concoctionis & qui succū crassiorē ingeneret, autore Gal. cui frigida & austera quædam admisceri convenit. Aqua mulsa improbat. ptisanæ cremorē Gal. etiam non probat. sed panem & sorbitionem ex chondro ac fructus austeros qui non facile corrumpantur & quandoque ovorum vitellos. Recentiores juscula carniū & succum quoque earum commendant cum succo granatorum vel cydoniorum, vel uvæ immaturæ, aut simili astringente aliquo. Si verò carnes fuerint musculosæ succū præbebunt crassiorem & amplius nutrientem. pro potu Savonarola laudat decoctum.

Potus.

factum ex pauco hordeo¹² & multo saccaro. Gal. verò etiam vini usum inter initia admisit; modo tenue, aquosum, & non austerum, quod à cibo ait sumendum. In quiete verò æger continendus est. Somnus permittendus est excepto tum accessione temporis. si tempus omni tempus vigiliarum excefferit, bonum. si autem opponte somnus non successerit invitandus erit. In huiusmodi animi deliquio frigidam exhibendam positionem Gal. est sententia.

Vinum tamē & omnib. quibus animi deliquium accidit commendat natura calidum, colore¹³ flavum. substantia tenue, & ætate recentiores in huiusmodi deliquio aqua rosea vel aceto frontē & faciem aspergunt & madefaciunt.

Reliquæ autem occasiones quib. citra febrem animi deliquia succedunt sunt color vehemens, vigilia nocturna, immodica ventris

12. Quoniam frigidum est; saccharum verò nutrit.

13. Traducit enim crudos humores si ante sumatur, si post, concoctum jam deducit. Disputantibus quibusdā num post cucumes peponesve vinum calidum Hispaniense bibendum obtinuit non esse bonum, sed piper addi prodesse.

14. Non aquā sed quod exhibetur sive vinum, sive aliud, vult frigidum dari. nam mox vinum commendat.

15. Qui actu syncopen patiuntur ejus loco sumunt hippocraticum dictum. continuè si vino utatur, sit tenue, aquosum, austerum.

tris inanitio, nimius corporis motus, & principiorum intemperies. Quomodo autē istis occasionibus fit occurrendum deinceps ostendetur.

De Dolore.

CAP. 22.

1. Quæ tamen ad priores, tensionem nempe rumpentē, aliumve modum solutæ unitatis, non incommode reducitur.

Affectus qui dolorem excitant 2. auctore Gal. sunt; vel enim unitatis solutio, vel intemperies, siue alteratio, quib. accedere potest magna obstructio. Continui autem divisio 3. modis (vulneratione excepta) aut enim ruptione, vel contusione, vel erosione. Ruptio fit ex distentione, Contusio à re quapiam gravante, Erosio autem mordente qualitate. Distentio autem fit vel à multitudine humorum, vel à spiritu cui non patet exitus, vel ab immodica siccitate. Contusio à re quapiam gravi aut dura. Erosio ab eo cui morsus natura inest. Alteratio verò dolorem inferens per ea fit quæ

quæ violenter calfaciunt
aut refrigerant. Magna ob-
structio ex duris meatum
aliquem occupantibus fit.
veluti quum arenulæ urete-
ras obstruunt.

Quum igitur dolor vehe-
mens urget perquirendū &
cognoscendum est an hunc
excitet humor plurimus, an
spiritus cui non sit exitus, an
verò gravis moles, an acris
humor, an siccus affectus;
vel aliud sit quod vehemen-
ter calfaciat aut refrigeret.
Ex hisce causis variæ gignuntur
dolorū species quibus & sua sunt nomina quæ
a Paulo referuntur.

Si itaque humores pluri-
mi dolorem excitarint san-
guinis detractione, vel pur-
gatione, vel utrisq; vacuan-
dum. Si spiritus cui non est
exitus, discutientibus atque
attenuantib. remedijs uten-
dum: aut quod potius, lo-
co dolenti cucurbita cum
flamma copiosa subinde
affigenda. Si moles aliqua
gravando dolorem efficit
moles adimenda erit. Hi

2. Nam quandoque dis-
cutientia dum pituito-
sum humorem calfa-
ciunt flatu augent.

G

acris humor dolorē affert
cujusmodi est biliosus &
potissimū æruginosus in ore
ventriculi collocatus vomitu
expellendus est. aut per
sedem enema injiciendum
quod eum eluere queat.
Quod si verò à siccitate
dolor contractus fuerit humectare
oportet, quod sæpenumero
perdifficile aut impossibile
præsertim si occasione febris,
vel inaniitionis sit siccitas. Si autem à
vehementi caliditate aut
frigidityte dolor superveniat
contrarijs occurrendū est.
Quod si verò idoneis remedijs
quæ affectum sanare queunt
dolores non sedentur. & vires
dejiciantur ægerque ad mortis
discrimē tendat ad ea confugiendum
med. quæ ex opio & hyoscyamo
ac ejusmodi narcoticis componuntur.
etiamsi corporis habitus nonnihil
sit lædendus. læsio enim potius
quam mors optanda ut Gal. ait.
læsio enim si non fuerit magna,
temporis spatio emendari poterit.

poterit. quod si verò etiam major, tamē præferenda est morti. In exhibendis autem narcoticis sequendum sapientis cōsiliū. Ne quid nimis. Nam nimius narcoticorum usus quandoque etiam mortem adfert. Narcoticorum sive opiatorum multæ quidē veterum compositiones, sed omnib. Philonis antidotum Gal. præfert. quod ad dolores sedandos nulli est inferius, cuius usus post annum à compositione tutus est, & si duorum 3. aut 4. annorum fuerit multo erit melius.

3. *Requies, qua nonnulli frequēter utuntur, quod paucissima habeat calida, æquē tutum medicamentum non est.*

De Vigilijs.

CAP. 23.

INter occasiones ad quas animi deliquium succedit secundo loco à Gal. Vigiliæ recensentur. hæ non mox & statim, sed diuturnitate temporis deliquium animi inferunt, corpore videlicet extenuato & squalido facto. Comitantur vigiliæ febres & præcipuè

G A

ardentes. sunt verò & aliorum affectuum symptomata: ut Phrenitidis, mania, melancholiæ & magnorum dolorum.

Tolluntur autem vigiliæ partim molli frictione, partim balneo, partim leni corporis agitatione, ut Gal. ait lib. 3. de sanit. tuenda. mollem autem frictionem Gal. cum oleo suadet faciendam. sed nostra ætate absq; oleo subinde placidè ac leniter brachia & crura deorsum fricando, somnis accersitur.

Paulus loco frictionis brachia & crura vincere præcipit, ac deinde solvi, quod nec modo fieri consuevit. Balneo verò nō raro feliciter uti contingit ex decocto malvæ, violariæ, lactucæ & quandoque foliorū papaveris in quo pedes abluendi sunt & manus. Agitatio levis corporis ad somnū quoq; conducit veluti lectica aut exigua cymba vehi. Non perficientibus autem istis aut quando fieri com-

commodum non est, ad
 epithemata, & inunctiones
 temporum, & frontis
 veniendum erit, ex aquis
 rosarum, violarū, & quan-
 doq; papaveris. addito fre-
 quenter lacte muliebri; aut
 earundem herbarū deco-
 ctis quæ admovenda ubi
 accessio remiserit. Offe-
 runtur verò & narib. quæ
 somnum odore provocant;
 ut papaveris vel hyoscyami
 flores & folia, mandrago-
 ræ poma, & pilæ quædam
 aut noduli ex corticibus
 capitum papaveris, cortici-
 bus rad. mandragoræ, flo-
 rib. nymphææ, violariæ, se-
 mine lactucæ & hyoscyami
 cum opio; modico croci &
 seminis anethi additis. Sor-
 bitionibus verò veluti cre-
 mori ptisanæ cōvenit sem.
 melonum à cortice repur-
 gatum addi, aut papaveris
 codia ipsis incoqui. Exhi-
 beri verò & somni tempo-
 re diacodiū potest vel ejus
 loco syr. de papavere, qui
 somnū provocat cochlearis
 mensura sumptus. aut aliud

4. Quæ grati odoris esse,
 etiam Sacræ literæ, te-
 stantur.

medicamentum exhibendum opium habens qualia exhiberi quandoq; ut Gal. ait cōvenit. ut sunt ex hyoscyamo catapotia vel ex styrace quæ à Paulo describuntur, lib. 3. c. 28. in quorum loco recentiores substituerunt pillulas de cynoglossa dictas, Græcorum tum compositionibus multo inferiores.

De Syntexi.

CAP. 24.

INter occasiones animi deliquium afferentes 3. loco à Gal. refertur ventris inanitio. hujus autem multæ sunt species ut diarrhæa, lienteria, dysenteria, cholera quarum curationes seorsim scriptæ sunt. Accedit his & alia quæ syntexis sive colliquatio dicitur. dejicit hæc vires vehementer & perseverans mortem adducit. præter has verò & alia est ventris inanitio à med. purgante facta quæ subitaneum animi deliquium sæpe

sæpe affert. Occurri huic
 potest iisdē remedijs quib.
 diarrhæa sanatur. sed his
 omnib. longe præstat the-
 riace Andromachi quæ ʒj.
 aut ʒß. pondere cum vino
 exhibita mox & valde ce-
 leriter fluxum à medica-
 mento excitatum sistit.

Syntexis autem fluxus est
 ventris per quē corpus om-
 nino colliquescit & extenua-
 tur, alvi excrementa non
 cibi aut potus speciem præ-
 ferunt, sed flava ac biliosa
 apparent & supra modum
 graveolētia sunt. consisten-
 tia verò non omnino liqui-
 da, sed crassiora veluti len-
 torem quendam habentia,
 quib. & subinde pinguedo
 quædā innatat. qualis & in
 urinæ superficie tunc quo-
 que observatur. Syntexis
 autem accidens est febrium
 acutarum ac continuarum,
 præsertim longarum. Cu-
 ratio ejus per refrigerantia
 & astringentia instituenda
 est. fructus réfrigerantes &
 austeri utiles sunt ut mala
 punica acida, fructus cor-

1. Gal. hanc ejus pro-
 bam dicit ac nos exper-
 ti sumus, statim stitisse
 fluxum. idque ratione
 resistendi venena nam
 med. venenata sunt. Ad-
 dit Paulus lib. 7. cap. 7.
 aliam causam. Nam, di-
 cit, a d cutem deducit,
 humorumque ad ventri-
 culum impetum revellit.

2. *Astringunt etiam quæ vulgo veenbesyen, & quæ Brabanti craakebesyen, Germani beeydelbeeren appellant.*

3. *Multi putant non retinere alvum ob oleum quod habet. verum tam exiguum est ut se non exerat. at substantia astringunt.*

4. *Resolvi in poculo uno 2. 3 possunt.*

ni, uvæ immaturæ, aciniribesi rubentis & oxyacanthæ acini vulgo berberis. ex quib. syr. vel quæ Arabes Rob. nominant confecta conveniunt & quæcunque his similia. Ab omni jure carniū abstinendum est. sorbitionib. veluti ptisanæ cremori, æqualis portio amygdalarū dulcium addenda est. ipse vero chylus amygdalarū dulcium vulgò lac nominant, etiā convenit, præsertim refrigerante aliquo addito. Ptisanæ decocto incoqui poterit aliquid conservæ rosarum veteris, vel fructus aliqui astringentes. Paulus in ardente febre cum syntexi frigida potionem ait utilem ex frigido fonte petitem. dari autem hæc non debet nisi observatis conditionibus prius in curatione synochi & ardentis febris, enumeratis.

Ventriculum verò & inferiorem ventrem oleo cydoneorum & rosaceo vel utrisque inungi expediens quo-

quoque est.

Ex occasione. autē quæ animi deliquium afferunt, reliquæ sunt nimius corporis motus & principiorum intemperies. Motus autem corporis veluti eorum qui insaniunt somni provocatione sedandus. qui quomodo provocandus sit ante dictū est. Intemperies vero principiorum quomodo corrigenda suis locis occurret dicendum.

De Cataphora.

CAP. 25.

Gravem somnum qui febrib. supervenit κατὰ φθῶν græci vocant, vel alijs placet magnā dormiendi cupiditatem. A frigidiore ac humidiorē cerebrū imbuente materia accidit. Oxycrato tepido, id est aceto cum aqua mixto, montē abstergendam Paulus ait, & naribus quæ incitari vim habent admodum. tale autē est acerrimum acetū, faciendæ etiam

1. Coma duplex vigilans quod alias catochus dicitur. somniferum est κατὰ φθῶν, quæ somnum quod pejus est, vel ejus desiderium quod non ita malum infert, neque enim tam multa fuerit materia eadem tamen curatio.

2. Adeo ut si non admodum magna fuerit copia opij sumpta, eos qui id sumpserunt excitare possit.

G 5

3. Non scapulis ut Paulus, quod aliquā possint materiā sursum trahere. ideo femorib. applicantur.

4. Quod accessionis symptomata ea non sublata tolli nequeant. eam tolli impossibile est, tum afflicto accessione danda non est afflictio. & in statu quiescendum: ait Hipp. quod & de particulari statu intelligendum.

sunt diversiones ut crurum duræ fortesq; frictiones ac validæ ligationes. Cucurbitulæ quoq; affigendæ sunt partib. femorum interioribus ut Rondeletius scribit & quidē non prius quam in remissione febris + ut Paulus ait. Hisce remedijs si vigil æger reddi nequeat sternutamenta offerenda. deinde ubi febris accessio cessaverit ad generalia remedia vel sanguinis missiōnem vel purgationem veniendum.

De capitis dolore in febribus.

C A P. 26.

Capitis dolor qui in febribus ardentibus aut synochis supervenit ex vaporibus aut fumis ut plurimum qui sensim sursum effeferuntur & cerebrum petunt provenit. adeo magnus hic quandoque est ut delirium afferat. Curatur autem partim repellentib. partim revellentib. Inter repellentia laudatur autē veterib.

erib. oxyrhodinon ex oleo
 rosaceo & aceto compo-
 situm, quod quomodo capiti
 adhibendum Paulus osten-
 dit. nostra ætas in arden-
 tibus. ac synochis febribus
 aqua & aceto rosaceis oxy-
 rhodini loco utitur, addito
 subinde lacte muliebri &
 vi albo. verū hujuscemo-
 di capiti adhiberi nequa-
 quam convenit si in die cri-
 tico sanguis & narib. fluere
 incipiat, vel fluxurus spere-
 tur. Revellunt autem duræ
 vehementesque crurum fri-
 cationes, ligaturæ, cucurbi-
 tæ & jam recentiorib. pra-
 sticis usitata quæ sub plan-
 tis pedum ligantur ut sapo-
 rum sale brassicæ folio vel
 alteri rei impositus qui in
 mediocri dolore confert.
 vel raphanidis radices cum
 sale quæ tum odore cito
 molesta. veluti & tincarum
 discium quæ & fissæ sub pe-
 dibus ligantur. Ex his autē
 quæ maximè revellunt sunt
 columbæ vivæ fissæ & cum
 sanguine suo calentes ad-
 notæ plantis pedum, quæ

1. *Densari tum humo-
 res, indeque destilla-
 tiones novæ fieri possent
 unde nonnulli magis re-
 vellere student.*

2. *Quidam ranuculum supponunt pedib. unde etiam febris quandoque tollitur periculosa tamē ulcera excitant. sic ros solis carpis applicatus quartanam tollit.*

partim singulari eximiaque proprietate partim similitudine moderati caloris non modo à capitis doloribus, sed & à delirio frequenter ægrotos liberant. Quæ verò pedib. applicantur tum demum applicanda quando pedes sponte incalescunt. finendæ autem sunt columbæ sub pedib. ad minimum per horas 12. tum in lebetem aquæ frigidæ abjiciendæ, ne odore sint molestæ.

De Sudoribus.

CAP. 27.

1. *Tum cutis obstruitur unus enim humor alium evocat.*

Svdores qui in febrium statu & præsertim in critico die erumpunt nullatenus reprimendi sunt, sed quiete & mediocri calore adjuvandi. nisi fortasse adeo large erumpant ut vires dejiciant, quod si acciderit auferendo tegumenta & sudorem abstergendo recreandus æger erit, ac ei permittendum, ut aerē paulo magis perflatum admit-

tae

stat & dormiat 2. Sudores autē qui posteaquā febres cessaverint adhuc perseverant & vires dejiciunt reprimendi ac prohibendi sunt. Paulus pleraq; astringentia enumerat corpori vel inspergenda, vel admo-
venda quorum nostra ætate non est usus alijs remedijs repertis. Ad sudores autem prohibēdes conducit 3 sac-
carum, sive conserva rosa-
rum rubrarum vesperi ad
ingressum lecti 3. aut 4. 3
pondere sumptum, cui, si
sola non satis reprimat su-
dorem, addi potest Rob de
ribes vel syr. de granatis
acidis & aliquid specierum
diatrion santalon vel diar-
rhodon Abbatis. Quod si
verò sudor ad huc perseve-
ret lintheamina aut indusia,
aceto rosaceo aspergenda
deinde resiccanda erunt in
quibus æger decumbit aut
induitur à laboribus & ve-
hementibus exercitijs ab-
stinendum, in aere frigi-
diore versandum, cibus sit
ex ijs quæ facile nutriunt &

2. Tum enim ad inte-
riora revocantur humo-
res.

3. Sic Itali vocant con-
servam rosarum, officinæ
saccarum in aqua rosa-
cea dissolutum ejus lo-
co dant quod eam vinum
non habet. non subito.
hoc efficit (neque enim
expedit) sed paulatim.
prodest & phthisicis.
optimum quod non ul-
tra annum fuit confe-
ctus.

lentoris nonnihil habent. ut sunt carnes musculosæ & animalium extremæ partes quæ & cum alijs cibis coqui possunt. Largior non sit potus neq; substantia ejus nimis tenuis. vinum rubrum & astringens laudatur.

De Tussi.

CAP. 28.

TVssis quæ non primario affecto pulmone aut respirationis instrumentis in febribus accidit circa initium & in ipso initio accessionis molestiam facit. & ut plurimum sicca est. Fit autem hæc quandoque ex acrimonia caloris febrilis, quandoq; ex viscerum obstructionibus. Et siquidem ex acrimonia fiat linctus vel syrupi exhibendi erunt refrigerantes, ac acrimoniam obtundentes: ut sunt syr. de violis, syr. de ziziphis, vulgò jujubis dictis, vel similis. Si verò simul adfuerit destillatio quod tenues cū tussi humores prodeuntes

I. Omnium humores acres obtundentiū præstantissimus est hic.

ostendunt syr. de papavere
 reliquis erit admiscendus. 2. *Vsus sum aliquando
 felicitè syr. de tussi-
 lagine, verum ea para-
 ta nos habemus in offi-
 cinis.*

Conveniunt autē & diatra-
 gacanth. frig. succus gly-
 cyrrhizæ, glycyrrhiza ipsa
 & quæcunque dulcia sunt
 & non calent. Si verò tussis
 accidat ex obstructione jo-
 cinoris aut lienis quæ & sic-
 ca tussis est ac in diuturnis
 febribus non rarò contin-
 git, providendum erit vis-
 ceribus quemadmodū suo
 dicetur loco.

3. *Ex acrimonia autem
 in tertianis & ardenti-
 bus. est autē & hæc sic-
 ca. metuendum ne hy-
 drops fiat.*

De Sternutamento.

CAP. 29.

STernutationes quæ dieb.
 superveniunt criticis &
 quando speratur aliqua fan-
 guinis per nares vacuatio
 nullo modo sunt prohiben-
 dæ, sed, ijs quæ alio tempo-
 re molestæ sunt, occurren-
 dum. Paulus narium, fron-
 tis, & oculorum perfrictio-
 nes aliaque similia, tum &
 calentis olei infusionem in
 aurem, consulit, veluti di-
 vertentia. potest verò &
 cervix in eundem finem

1. *Nam sternutamenta calfacta cerebri anteriore parte fiunt.*

deorsum perfricari. Inter remedia autē quæ cito stertationem cohibent recentioribus comperta sunt laminæ frigida ex ære, argento, aut stanno, vel alia actu frigida: sæpius fronti admota. Abstinentiū verò ab omnium acrium odore ut sinapeos, piperis & similia, & à pulvere & fumo.

De Siti.

C A P. 30.

1. *Nam calorem reprimat & humores in corpore retinentur, unde longior febris.*

Sitis quandoque propter siccitatem & humiditatis fit inopiam; quandoque propter caliditatis abundantiam præsertim in partibus per quas humor in ventriculū defertur: quandoque verò ex utraq; causa, veluti in febribus. Sitim autem optimè & citissimè potus sedat, sed hunc in febre quovis tempore exhibere aut permittere minime confert: neque enim prius quam febris accessio minui inceperit concedendus est potus. Interea si sitis urgeat

urgeat lenimenta quædam offerenda sunt quæ sitim mitigare aliquo modo queant, ut sunt confectiones quædam dulces & præsertim refrigerantes ut syr. de granatis acidis, rob de ribes, vel de agresta. cerasa condita, cucurbitæ condita, lactuca condita & similia, ex quibus quandoque aliquid in ore sumendum. Mitigant verò & sitim quæcunque linguæ asperitatem leniunt, item & glycyrrhiza & saccarum appellatū candi. Posteaquam autem calor febrilis sese remiserit ptisanæ decoctum, vel alius tenuis potus exhibendus est. & quandoq; etiam admonendus æger ut bibat.

Si verò citra febrim sitis fiat veluti à salforum usu, vel à vini fortis ac meraci potu, & quidem sub noctem illis ut Hipp. ait obdormiscere bonū est, modo non

2. Succis horum quum haberi possunt, uti possumus.

3. Crassus enim obstructionem in viscerib. præbet. monendus autem ut bibat ut sudor materiam habeat. sudare enim in fine particularis paroxysmi utile est.

4. Commentator Thucydidis 4. lib. ubi Thucyd. lacedæmonijs in Sphacteria insula obsessis per urinatores semen papaveris melle illitum & lini semen molitum fuisse allatum hoc quidem ad tempus delinire sitim ideoq; febricitantib. à sui temporis Medicis exhibitum. illud vescum esse, corpus nempe: licet lachryma lethalis opium dicta.

5. Somnus concoquit. hæc descendunt sitimque non efficiunt. multus autem potus turbaret ventriculi concoctionem.

¶

magna sitis, addit Gal. nam levioris sitis somnus remedium est.

Sed si magna fuerit sitis & præsertim ex defectu humidi, aut à forti ac meraciore vino, omnino dandus est potus. nam defectui, ut Gal. ait, succurrere convenit, & caliditatem factam à vino restinguere utile est.

6. *Metuendum enim ne humorib. accensis febris fiat.*

7. *Vt fieri solet in feminis ex partu difficili, aut abortu nimium purgatis.*

8. *Ad miraculum usque sitim sedare sepe expertus sum.*

Quod si autem post multam vacuationem sitis supervenerit, citò nutriri ac refici corpus debet. Copiosa autem vacuatione si febris aliqua accesserit alimentum ex hibendū quod non solum citò nutriat, sed & calorem contemperet. veluti est capo cum ptisana ex multa aqua decoctus. hujus etenim jus præter quod nutriat citissimè etiā sitim sedat.

De Nausea.

CAP. 31.

Nausea quandoque in febrium fit accessionibus veluti in augmento: quan-

quandoque etiam post accessionem & quum febris desijt molesta est ac perseverat¹.

Si itaq; in accessione acciderit, ventriculo conante & nequeunte quod molestum est expellere exhibendum erit aliquid quod vomitionem adjuvet², veluti

ptisanæ decoctum tepidum cum oxymelite, vel oxymeli solum, quo sæpenumero vomitione vitiosi humores expurgantur.

Post accessionem cessante febre si nausea perseveret, & æger cibum fastidiat, & purgationes præcesserint, roborandus erit ventriculus: foris quidem inunctionibus, fotibus, aut emplastris astringentibus ac roborantib. intrinsecus verò nonnullis compositionibus ipsum confortantibus ac bona victus ratione Corpore verò non purgato purgans aliquod med. exhibendum, sed ventriculum non offendens, ut est hiera picra (si non obstet febris)

1. *Vel propter debilitatem relictam, vel propter reliquias humorum.*

2. *Incisione ac leni detersione qui ob crassitiam & lentorem lateribus ventriculi veluti adglutinati difficulter ejiciuntur humores separando, & in cavum veluti proturbando.*

quæ vitiosos humores in ventriculi tunicis contentos fœliciter expurgat.

3. *Tonum enim adstringentibus suis partibus viscerib. indit.*

Quod si autē febris major sit & biliosi humores vētriculo molesti sint: Rhabbarum utiliter exhibetur.

Si verò æger purgari nō sustineat & pituitosi humores ventriculum graventur, sequendum erit Pauli consilium, ac in quiete, inedia ac somno quoq; si fieri potuerit, continendus. Quorum inedia efficacissima est, quæ vel sola non modo nauseam tollere, sed & recidivas febres superare potest.

Abstinentum autē à cibo toto eo die quo febrilis accessio in expectatione est, neque prius, quam illius tempus præterierit, cibum offerendus est, atque is facilis, veluti sorbitio aliqua.

Unctiones autem, foci & emplastra quæ foris ventriculo admoveri utile est, in curatione febris quotidianæ descripta sunt.

Exhi.

4 Exhiberi verò ad vētriciuli roborationem potest Aromaticum rosatum, vel diarrhodon Abbatis, aut syr. de mentha, vel si bilis aliqua in ventriculo restet syrupus ex absinthio, qui bilem absterget, & simul ventriculum roborat.

Victus sit ex optimis & concocta facilib. quæ aromatis (zinzibere caryophyllis & similibus) condiri utile erit. Vinum concedendum (nisi febris obstet) generosum.

4. *Odorata totum quod à vertice ad Umbilicum est, & turbere, & mitigare plurimum possunt, ut inquit Plato in Timeo. Quod mare conscendētes nauseant, non tantum jactationi fluctuum, sed viroso odori maris non male tribuitur.*

De Vomitu.

CAP. 32.

Vomitum spontaneum qui confert & leviter fertur non esse reprimendum ab Hipp. docemur. Sic nec illum reprimi oportet qui postquam signa coctionis apparuerint in die critico supervenit, nam & talis confert. Sed alio tempore superveniens & qui non leviter, sed molestè fertur ac vires dejicit omni cona-

Y. Nobile emplastr. cuius vim sæpe sum expertus. monendi tamē ægri sentiri angustiam quandam, dum inhaeret.

tu est sistendus. neque refert si vel flava bilis, vel atra sit quæ rejicitur nisi quod atræ bilis vomitio magis sit periculosa. Habet Paulus cataplasma ventriculo imponendum ex palmulis sive dactylis, & alijs astringentibus. hujus loco uti possumus empl. ex crusta panis vocato, quod in Cordo reperitur. Nō proficiente autē hujusmodi cataplasmate, vel ægro non sustinente, cucurbitula admoveri poterit media inter umbilicum & ostij ventriculi regione. Sedato vomitu cibus paulatim dandus, cui & astringentia quædā admiscenda, ut succus malorum granat. succus omphacij, ribesij aut similis. Dandum verò & generosum vinum, vel etiam aromatites ad vires reparandas quandiu febris non obstat.

De Singultu.

CAP. 33.

Singultus est affectus oris ventriculi & veluti quæ-

quædam ejus partis : con- 1. *Fit hic pugna reten-*
vulsio quæ fit vel ex reple- *triciſ & expultriciſ.*
tione, vel ex inanitione, aut
ab acrimonia eorum quæ
in ventriculo continentur,
vel ex nimia refrigeratio-
ne.

Singultus .g. qui in feбри-
bus accidit corpore non-
dum purgato à vitioſis hu-
moribus ventriculi oſtio
moleſtis excitatur. quibus
vel vomitione redditis, vel
per inferiorem ventrem
expurgatis ceſſat. Si itaque
à vitioſis humoribus ſin-
gultus moleſtiam faciat ex-
hibendum aliquid erit quod
vomitionem adjuvet, vel
quod per inferna expurget
veluti quando nauſea mo-
leſta eſt. Deinde roboran-
tia admovenda.

A frigida cauſa veluti à
frigidiffimo potu, ſingultus
ſuperveniens calfacientib.
ſedatur etiã foris admotis.
Singultus autem qui in fine
febris viribus jam debilita-
tis infeſtat, præſertim poſt
magnam vacuationem, ex
inanitione & debilitate oris

2. *Alioqui nimis foret frigidum.*

3. *Involutum folijs brassicæ aut betæ, aut linteis.*

4. *Vbi contusum fuerit insperguntur.*

5. *In levi singultu quandoq; solum prodest. mediocrē ejus vim comperi.*

ventriculi accidit. In hoc casu laborandum est ut retentrix vis ventriculi roboretur quod fit per astringentia ut sunt oleum ex mastice, oleum ex cydoneis, addito oleo ex mēta², item empl. ex crusta panis, vel ejus loco pomū cotoneum excavatum & oleo masticino repletum ac deinde coctum³ & ori ventriculi instar cataplasmatibus admotum, addito & gariophyllorum, vel mentæ, vel utriusq; pulvere. Prodest etiam fomentum ex absinthio, mentha, rosis rubris, & anethi semine in sacculo confutis. & in vino decoctis. Profuit etiam multis præsertim debilibus spongia imbuta forti & austero vino quale est Hispanicum calens ventriculi ostio sæpius admota. Profunt verò & adversus hujusmodi singultum ea quæ à totius substantiæ proprietate ipsi resistunt ut est semen⁴ anethi præsertim in vino decoctum & sæpius olfactum. Liberat verò & à singultu

singultu sternutatio super-
veniens ut Hipp. refert. sed
ab ea, ut Gal. scribit, quæ à
repletionem fit. possunt id-
circo in tali casu quædam
naribus admoveri quæ ster-
nutationem provocant, quæ
tamen etiam si ex inanitione
fiat non sunt inutilia. Vio-
lentiore enim eo motu ali-
quo modo ventriculo co-
moto tandem expultrix ejus
facultas quiescit.

6. *Humores enim mo-
lesti ad fundum descen-
dunt.*

De Sanguinis fluore in febribus.

CAP. 34.

Sanguinis fluor, qui in
febribus contingit si ac-
ciderit die critico, nullo
modo sistendus est, nisi
diutius fluens vires dejiciat,
quo casu ut sistatur labo-
randum est. Diversiones fa-
ciendæ per brachiorum &
crurum frictiones duras, &
fortes ligationes. fronti ad-
moveri frigidam poscā sæ-
pius convenit: aut si hæc
non sufficit cataplasma ex
bolo cum ovi albo, quod

H s

1. At verò quæ extrinsecus particulae profluētum adstringentia, tum citra astrictiōem frigida admoventur, hæc ipse (velut plerique medicorum) non ubique nec semper probo, sed mihi contra omnino quam fieri res postulat, ipsum sanguinem intro compellere ac venas quæ in alto sunt implere videtur. vidimus enim quosdam eorum qui ex pulmonibus sanguinem

rejecerent ex thorace refrigerando manifestò læsos: æquè ut qui sanguinem vomuerunt nonnullos quod venter foris esset refrigeratus. Eodem modo & eorum quib. ex naribus sanguis profluxit aliqui ex capitis refrigeratione deterius habuerunt. illis itaque utendum quum ad alia prius averteris, ut .v.g. in naso ubi sanguinis missione, artuum frictione, deligatione, aut cucurbitulis hypochondrijs affixis usus fueris. Quin ne sic quidem ad frontem & caput ilico refrigerandū, sed prius est ad contraria revelendum, utiq; affixa in summa cervice cucurbitula. duplex enim in hæmorrhagia aversio est. quæ est ad totius corporis inferna, & quæ ad capitis posteriora: nares enim cum superiore & anteriore parte sitæ sunt. adversetur autem ei quod supra, id quod infra: & ei quod post habetur, id quod ante. Gal. 5. Meth.

actu frigidum frequenter admovendum. Istis adhibitis, si non cesset fluxus, cucurbitula adhiberi poterit hypochondrio è directo naribus ex quo sanguis profluit. Continere æger se dicit erectū & caput haud quam antrorsum reclinare neq; nares ullo modo irritare aut expurgare priusquam omnino sanguis fluere desierit. quod si verò nec sic sanguis fluere desinat imponenda erit naso unde sanguis profluit tu-

runda

runda : oblonga illita ovi 2. *Alliganda fasciæ ne
albo cui pulveres admixti excidat priusquam ora
sint astringentes ut dicetur venarum fuerint agglu-
lib. 3. tinata.*

De ulcere circa os sacrum.

CAP. 35.

EX diuturno decubitu ul-
cera circa : os sacrum 1. *Signum plerumq; le-
ac in inferiore lumborum thale, tamen quidam
parte fieri frequenter con- reficiuntur.*
tingit præsertim viribus &
naturali facultate deficien-
tibus. adhibenda sunt quæ
ulcera resiccent ac consoli-
dent, qualia Paulus enume-
rat quibus tamē præstantius
est empl. quod componitur
ex cerusæ partib. duab. mi-
nij factitij : parte j. & olei 6.
partib. ad nigredinem usq;
decoctis. ex quo emplastra
conficiuntur quæ fortiter
adhærescunt & ulcera con-
solident si modo aliquid
naturalis roboris superfit.

2. *Nam minerali aliud
est minium, è cuius vena
sæpe argentum vivum
effluit, huius non est
usus.*

De Epicarpijs.

CAP. 36.

IStorum : usus est in ter- 1. *In ardentib. non est
tianis febribus intermit- usus.*

2. *Hoc restitui puellam
nobilem quæ in tertianæ
singulis accessionib. con-
vulsione commitialique
morbo tentabatur. post
usum tamē rhabarbari.*

tentibus post adhibita ge-
neralia remedia. admoventur
verò & pueris qui alia
remedia non admittunt.
materia horū ut plurimum
herbæ sunt quædam ut bur-
sa pastoris, urtica, folia vi-
tis, cornu cervi herba, & si-
miles parum succi habentes.
nobis etiam mentastri-
usus bene cessit quibus sal
& acetum adjunctum, in
quibus præcipua vis reme-
dij est. hæc enim putredini-
bus adversantur & horum
facultate per arterias cordi
cōmunicata putredini hu-
morum cor fortius resistit.
sic ut & humores minus
computrescant. ita tandem
febrilium accessiones remit-
tuntur ac desinunt.

FINIS,

Anno 1583. Iulij 16.

De

De Affectibus qui singulis corporis partibus obveniunt.

LIB. II.

De Alopecia & Ophiasis.

CAP. I.

Lea. I.
Sept. I.

Alopecia autem & Ophiasis non valde dissimiles sunt affectus. Commune utrique est quod veluti emortua summa cute pili extenuentur ac excidant, & ex ipsa cute puncta aut leviter læsa liquor quidam exeat corruptus & mali odoris, sanguinis colorem non habens nisi admodum diluti aut corrupti. Occupat utrumque vitium non totum caput, sed partes quasdam, & loca tantum quædam cutis. Alopecia quidem nunc hanc³, nunc aliam partem, aliquando verò etiam mentum. Ophiasis verò incipit ab occipite⁴, deinde ad utrasque aures du-

1. Sic dicta, quod vulpib. perpetuo eveniat. Paulus. Est autem pilorum in album mutatio, quæ si perseveret excidunt. ob carnis exterioris corruptelam. 10. Problem. 29.

2. Propter inopiam humorum pilos nutrientium calvities: propter vitiatos humores Alopecia & Ophiasis. unum quidem ambæ secundum morbosam affectionem malum, nomina autem juxta figuras habentes diversa. Gal. 1. τὸ π.

3. Sub qualibet figura. Cels.

4. Ac duorum digitorum latitudinem non excedis

dit. Anno 1614. hos affectus quasi Epidemios vidimus, cum levi quasi Pityriasi puerulos invadentes. Curabamus discutientib. & detergentib. localibus tantum, ut vino Gallico in quo sapo communis dissolutus.

5. Subpinguis & ex toto glabra. Cels.

6. Si cutis albidior, peccabit pituita: si nigrior, melancholia: si pallidior, flava bilis. Gal. 1. $\pi\epsilon\pi$.

bus capitibus serpit, & sæpe eousq; ut in fronte committantur. Ophiasin Cor. Celsus infantibus aliquando ait accidere, & sæpe per se finiri, sed Alopecian ætati cuius supervenire & absque curatione non desinere. Relinquitur ab alipecia & ophiasis cutis lævis & glabra, quandoque densior & mali coloris, atque tunc vitium curatu difficilius existit. Differunt autem ab his defluvium capillorū & calvities. Defluvium capillorum non relinquit loca nuda aut areas nudas, sed æquabiliter ab omni parte accidit. Calvitium verò à sincipite, & capitis corona incipit, paulatim progreditur & cum ætate augefcit. cutis à naturali constitutione non permutatur & sive pungatur sive vulneretur non alium quā sanguineum humorem fundit.

Causa autem alopecie, & ophasie sunt pravi ac vitiosi humores qui ex mala victus ratione subinde nascun-

nascentur⁷. Curatio consistit in expurgatione horum humorum vitiosorum, primum quidem per ea quæ universum corpus expurgant: secundo per apophlegmatismos. deinde⁸ ad movenda sunt localia, medicamenta sufficit autem quandoque sola humorum purgatio & bona diæta præsertim ubi morbus recens est, sed inveteratum malum etiam topica requirit med. qualia apud Paulum repiuntur. Habet exemplum Gal. curati ab alopecia juvenis, qui per solam cum hiera ex colocyntide¹⁰ purgationem & bona victus revocatione fuit restitutus, prius tamē datis aliquot pillulis¹¹ ex aloë. in qua curatione observandum quod Gal. ante purgationem cum hiera diacolocyntidos non exhibuerit aliqua vel meatus aperientia vel humores præparantia, sed tantum pillulas ex aloë.

nis, sed præparationis viarum gratia exhibuit.

7. Si cutis linteo neque levi nimis, neque aspero fricata rubescit, quanto citius id fit, tantò minor affectus. sic si adhibitis med. citius quam ante, vel magis rubesciat, spem curationis facit majorem. Gal. 1. κατὰ τὸ π.

8. Digerentia tenuium partium, calidum intra scopi fines ne cutem talem reddat qualem in calvis videmus. tale ol. laurinum &c. finis ut mali humores exspirent, bonus autem sanguis attrahatur. Gal. 1. κατὰ τὸ π.

9. Æstate in sola, hyeme in balneo. Ibidem.

10. Bis purgavit in 5. diebus, priori vice 4. post 5. 3. dedit.

11. Ciceris magnitudine 11. dedit sunt tam magna ut ex 3. possint

20. fieri non enim cicer nostrum intelligendum sed orobæcum quod minus. has non purgatio-

Defluvium
capillorum.

12. In muliere rarum.
in spadonib. non visum,
nec in ullo ante veneris
usum; nec infra cere-
brum, aut infra verti-
cem, aut circa tempora,
atque aures. Plin. l. 11.
c. 17. Albescunt autem
qui defectu alimenti ex-
cidunt; ut aquilis præ-
inedia pennæ, quando
pullos educat. Plin. l.
10. c. 3. Tale amantis
pallidi, atque emaciati
fuit defluvium apud
Theocryt. Idyll. 2.

13. Adeo ut Medicus
hinc audacter pronun-
tiare queat illum in quo
tale deflurium animad-
vertit ficus vel alia circa
podicem vitia pati.

Lect. 2.

Sept. 3.

πτυρία-

σις.

1. Quæ solā Cuticulam
quam Epidermida vo-

cant, afficit; cujus veluti cariem facit. nascitur ex sordi-
bus & incuria capilli impexi. Comm. in Horat.

Quod autem ad deflu-
vium ¹² capillorum attinet
illud dupliciter contingit.
quandoque enim sensim &
paulatim capilli excidunt &
attenuantur, quandoque
multi subito excidunt, &
subinde omnes capitis pili
tum & menti ac etiam su-
perciliorum. Prius deflu-
vium ad raritatem cutis, &
inopiam materiæ pilos ge-
nerantis consequitur, neq;
alijs remedijs quā localibus
opus habet. ijs videlicet
quæ mediocrē densitatē cu-
ti inducunt qualia à Paulo
describuntur. Alterum de-
fluvium ex humorum vitio
ac corruptela accidit. & est
symptoma luis venereæ,
quod comitatur ulcera &
alia circa ¹³ anum vitia, &
talem curationem requirit
qualis luis venereæ existit.

Inter capitis cutis affe-
ctiones est etiam Paulo pi-
tyriasis appellata quæ Cor.
Celso porrigo dicitur, alijs

furfu-

furfures. est autem hæc veluti scabiei siccæ species squamulas ac furfures proferens, sed citra cutis inferioris exulcerationem & pilorum casum. Contingit vero & caput scabie laborare cujus squamis detrahitur cutis exulcerata relinquitur, atq; hæc duplex est. quædam enim fit absque jactura pilorum quæ mitior ac facilius curatur. altera verò cum perditione & defluvio capillorum veluti in Alopecia. facit hæc magnas & albas crustas quæ aliquando totum caput, aliquando partem ejus occupant. & hæc non modo fera est, sed etiam si inveteraverit difficulter curabilis. Nonnulli ex ijs qui Arabum doctrinam sequuntur hanc Alopeciam nominant & lepræ speciem faciunt. & referri quidem potest ad lepram Græcorum, sed non tamen idcirco ad elephantiasin, quam Arabes lepram nominant.

Inter capitis vero externa

Scabies
capitis.

2. Quod ab humore minus acri, nec radices pilorum lædente, fiat.

3. Quæ & ipsa Scabiei species est.

4. Ferè fiunt Pityriasi, ac propemodum Psoriasis præcedente. Crito apud Gal. 1. de med. secundum loca.

Κηελον.
5. Cerium circa pectus aut dorsum tumorem inflammatum, eum describit Iul. Pollux. Sed forte Meliceridi id nomen tribuit. l. 4. c. 25. σικωσις.

6. Meliceris est tumor non altus in quo continetur humor melli similis. tria sunt abscessuum sine dolore genera quæ plurimum in capite gignuntur. steatoma, atheroma, meliceris. exulceratur in melicer. non cutis externa, sed membrana interior. unde sectione tamen curatur.

Achores. vitia quæ sub capillis oriuntur sunt & achores Græcis dicti, Latinis manantia capitis ulcera, quæ tubercula quædam sunt hiantia, exulcerata, & foraminibus patentia, ex quibus assidue humor fluit viscidus, lentus, ac foetidus.

Accedit ad hoc malum, quod σικωσις sive favus dicitur, cujus tubercula majora & ampliora sunt & magis patentia è quibus humor fluit melleus & veluti is qui in favis continetur, odore foetidus, quos & tumores ipsi & colore & figura non raro referunt, præsertim quando malum in latitudinem sese extendit. Differens autem istud vitium est à Meliceride.

Annumerantur verò & capitis vitij Græcis dicta σικω Latinis fici quæ sunt eruptiones ulcerosæ, duræ, rotundæ & subrubentes cū dolore, in quo ab alijs vitij

differt.

differt. alia enim dolorem non inferunt.

Origo horum omnium vitiorum ex malis est & corruptis humorib. à prava victus vivendique ratione generatis. Oportet autem ut Gal. ait ad præscriptas affectiones cōvenienti diæta uti & corporis ac capitis purgationem adhibere per pillulas ex aloë, colocynthide & scāmonio cum brassicę succo coāctis. deinde localibus remedijs utendum. Loco autem pillularum istarum utuntur recentiores pill. cochij⁷, vel etiam de fumo terræ dictis. sicuti & loco hieræ diacolocynthidos accipitur cōfectio Hamech. quæ gratior est & non minus tamē purgat quam hiera illa diacolocynth. Meminit verò & Paulus * psydraciorum & exanthematum. ψυδρακία autem parva sunt pustularū tubercula. Exanthemata verò generali nomine leves per cutem humorum eruptiones dicuntur, sub

7. Quas quidam quasi ῥήγνια seu granula dicta putant quod tali forma exhiberi soleant. Habent autem præter hieram, quæ aloë quasi correctæ est, colocynt. & scam. nil aliud quam turbith, & stæchad.

8. Psydracia sunt ignea exanthemata, sponte pronata, exulcerata, in superficie. Iul. Pollux. l.

4. c. 25.

ψυδρακία.

ἐξανθήματα.

9. Vide Hippocrat. qui humorum colorem veluti florum esse asserit.

quibus Phlyctænæ, psydracia, epinyctides & similia tumorum genera comprehenduntur. Gal. & istis eandem quam alijs curationem necessariã esse scribit. Paulus localia tantum adhibenda esse præcipere videtur.

Cephalalgia.

Leet. 3. Sept. 4.

Differentiæ.

1. Partem eam intellige quæ pilis tegitur præcipue synciput. aurium, oculor. &c. non dicuntur capitis dolores.

2. Circa aures; circa tempora aut alibi. Avicenna clavum vocat.

3. Maximè laborant interiores, sin exteriores laborent ad tactum etiã sentitur dolor. difficile tamen hæc discernuntur.

De Capitis Dolo- lore.

CAP. 2.

Capitis : dolores magnitudine inter se differunt; sunt quidam leviores ut Cephalalgia dicta; alij graviores & molestiores ut est Cephalæa. Occupat dolor quandoque anteriorem & maximam capitis partem, subinde dimidiam ejus ut hemicrania quandoque vero partē unam aliquam. 3. Patiuntur dolorem aliquando partes interiores : ut cerebri membranæ, arteriæ, aut venæ: quandoque exteriores tantum: subinde ambæ. Laborat verò etiam caput quandoque primario affectu

affectu & per se, quandoq;
verò per cōsensum & sym-
patheiam. Dolor verò vel
gravans est, vel tensivus, vel
pungens, vel cum pulsatione.
Causæ dolorem infe-
rentes quandoq; sunt pro-
catarticae, sive externæ,
alias antecedentes, sive in-
ternæ. Externæ sunt ardor
solis⁴, frigus, odor gravis
& molestus. ebrietas, vel
ictus sive percussio. Causæ
antecedentes sunt intem-
peries, & frequentissimè
quidem, cum humorum af-
fluxu rarò absque his. Pec-
cant autem humores quan-
doq; qualitate, quandoque
quantitate⁵, quandoque⁶
utrisque horum.

Signum autem per con-
sensum caput laborare est
dolor non permanens. vel

Causæ.

4. Talis fuit cephalal-
gia filij Sunamitidis.
2. Reg. c. 4. v. 19. & Io-
næ quum Euro silente sol
illius caput percuteret.
v. 8. c. 4. Herbae male
olentes gravant caput.
ut ocymū ex cuius odo-
re quandoque scorpius
in capite enatus fuit.
Cephalæa vehementius
fœminas tenet ob dili-
gentiam capillorū. Cæl.
Aurel. c. 1. chronic. dum
enim comuntur frigido

Signa 1.
Num pro
consen-
sum.

deri, ardo-
rive solis,
aut ignis ca-
put expo-

nunt; illudq; mades faciunt. Atqui cerebro perniciem etiam
cujuslibet synceri humoris assiduitas reservat, tū solis ani-
mādo simul & siccādo capillos exoptabilis ardor. Tertull.
de cultu fœminar. Nimietas lachrymarum Apuleio causa
doloris acris capitis. l. 3. asini aurei. Ad lunā dormire, aut
diutius in illa morari. 3. De Crisib. 5. Ut sanguinei hu-
mores. 6. Quando multi biliosi ac acres humores.

non semper sui similis, uno tempore intensior, alio remissior, pro partis videlicet conditione cui caput consentit.

2. Item & ille dolor qui alijs præcedentib. affectionibus supervenit licet permanens sit, aut parum remittatur etiam per consensum fieri dicitur. Non per consensum verò, sed primario & primigenia affectione caput laborat quando dolor perseverans ac perpetuus est, & qui alijs præcedentibus malis non supervenit.

7. *Vt quum mali cibi aut humores in ventriculo sunt: vel quum alioqui per se est infirmus.*

Per consensum autē caput dolore afficitur malè se habēte ventriculo, & præfertim ostio ejus, non rarò verò & ab utero mulierib. quandoque vero & propter jecinoris, lienis, mesenterij, renum, aut aliarum partium dolores sive morbos, ut Avicenna ait.

Morbi autem sive affectiones quibus capitis dolores superveniunt & propter quos per consensum etiam

etiam dolet sunt morbi febriles, lues venereæ, & quandoque plethora ac nimia repletio. Capitis autem dolores qui per consensum fiunt quandoq; ex solo consensu sive συμπαθεία accidunt, nullis transmissis ad caput humoribus aut vaporibus: aliquando verò fursum transmissis vel humoribus vel vaporibus.

Dolorē verò capitis per consensum ventriculi factū ipse male affectus ventriculus ostendit præsertim quando dispositio ejus mala præcessit. vel hac desinente dolor capitis conquiescit. veluti quādo acris & biliosus humor in ipso ventriculo, vel circa ipsius ostiolum congregatus est, qui in ventriculum aut ab aliqua parte sponte in eum influit: aut attrahitur ut propter famem diutius toleratam¹⁰; vel in ipso generatur, veluti bilis prasina quæ in ipso ex pravis cibis non raro gignitur. sic & quandoq; ex vaporibus ex

8. *Est enim mirabilis horum sympathia. sic vulnerato cerebro vomitus sequitur.*

Lea. 4 Sept. 7.

Per consensum
Ventriculi.

9. *Ut ijs quibus alterramus à folliculo bilis in fundum ventriculi infertur.*

10. *Tolerare enim famem (ut ait Avicenna) ventriculum humoribus putridis implet.*

11. Sic vinum potens etiam mediocriter haustum. allium, cape &c. Spiritus naturaliter superna petens ex inferiorib. trahit corpora per arteriam atque stomachum quæ sunt corporis velut majora fumaria. Themison apud Cæl. Aurel. c. de Cephalæa.

A jecinore
splene etc.

12. Quæ fit ratione inflammationis circa mesenterium, diaphragma, jecur aut pulmones, consistētis, vel collecto sanguine in māmillis. aph. 40. sect. 5.

Ab utero.

13. Ab utero fiunt dolores capitis qui post partum superveniunt. 1. De Euporist. Gal. Fiunt autem in syncipite potissimum.

ventriculo ascendentib. caput dolet, quod fit vel à cibo vel potu vaporosis¹¹, & præsertim in vetriculo nondum concoctis. non raro verò etiā ab oris ventriculi debilitate capitis oriuntur dolores.

A jecinore autē vel splene aut alijs interiorib. corporis partibus capitis morbi facti concomitantia magna ex parte alia habent symptomata, quibus à capitis doloribus differunt. idcirco & particularia alia nomina obtinuerunt: ut¹² paraphrenitis, & melancholia hypochondriaca &c. de quib. suo loco. Ab utero verò dolores capitis fiunt, vel mensibus suppressis, vel ex alijs uteri morbis¹³, & quando ex hoc capitis dolor provenit sæpenumero sentire se mulieres affirmant, vapores & spiritus quosdam calidos ad caput ascendere. Quibus autem hoc contingit sanguine ferre abundant & calidioris sunt temperamenti. Capitis autem

autem dolores qui febricitantibus aut lue venerea laborantibus superveniunt nō primarias esse affectiones, sed per consensum fieri & symptomata illorū morborum esse, satis notum est.

Curatio doloris capitis qui per consensum.

Lect. 5 Sept. 8.

Ventriculi.

Quum itaque caput propter ventriculi affectū per consensum dolet atq; ipsius ventriculi ostium quod stomachus dicitur ē mordacibus ac vitiosis humoribus infestatur optimū est hunc citissimē evacuare & quidem ut Gal. ait vomitione quæ ijs qui ad hanc¹⁴ proclives sunt, aquæ potione, tepidæ β. facile succedit. Si verò non successerit vel digitorum, vel pennularum immissione ventriculus ad vomitū irritandus est. Sed ijs qui ad vomitionem faciles non sunt exhiberi convenit quæ infestantem bilem deorsum ad fundum ventriculi descendere faciunt, ut sunt quæ simul & refrigerant & astringunt

14. In his regionib. non sunt ita proclives ad vomitum ideo præstat reprimere molestum præterea est, ac multa sequuntur incommod. estq. magis naturæ aptum ad intestina, humores peccantes deducere.

15. *Curavi adolescentem, qui geminum meatū, habebat assiduo usu singulis aut alternis diebus unius pilulæ ex hiera. R. Dod.*

ut panis intinctus agrestæ sive vino omphaciti, aut succo granatorum acidorum, aut succo fructuum ribesij. tum & quæcunque ex his conficiuntur. quandoque verò etiam aquæ frigida potio, & pira, aut poma eruda. Quod si vero humor magis in fundo hæreat optimum fuerit eum illic continere quod per superius enumerata fieri potest. nam in fundo hærens facile ad intestina delabitur.

Vbi verò humores conqueverint & nō multi fuerint, absinthij usus commodus est donec ventriculus restitutus fuerit. bilē enim absterget & ventriculū roborat. datur autem vel vinum, vel etiam cerevisia in qua maceratur, ante cibum vel mox initio: vel etiam ex eo compositum serapiū ante cibum, quod præter absinthium etiam succum admittit cydoneorum. quæ de causa & debilem ventriculū magis roborat.

Si 12

Si vero humores vitiosi fuerint copiosi & frequenter molesti, sic ut in ventriculi tunicis imbibiti videri queant, utile fuerit exhibere hieram picram, quæ, auctore Gal. pharmacū optimum est ad ventriculi purgationes, nec minus bonum ad capitis ex ventriculo dolores. post purgationem ex hiera ad absinthij usum etiam pervenire licebit. Quod si ex fame diutius tolerata capitis dolor fiat cibus oblatus remedio erit, vel aliquod eorū prius dictorum quæ biliosos ac mordaces humores ad ostium ventriculi ferri prohibeant. Si autem propter vapores ac fumos à cibo pravo ¹⁶ aut potu veluti meracioris vini, caput dolet aquæ frigida potio subinde conducit. tum & ea quæ supra enumerata sunt. jã & somnus superveniens dolorem tollit. Quod si verò nec dolor reprimi queat nec somnus superveniat vomitus erit excitandus, aut

2.

3.

16. Si venenati cibi, statim vomitu rejiciendi. commune hoc veteribus ut non dent alexipharmaca nisi veneno vomitu rejecto. Hinc quū Commodus veneno exhibito multum vomuisset, veriti qui exhibuerant, ne restitueretur, strangulandum curarunt. Herodian. l. i.

17. *In calidis corporib. ut Italarum potus frigida convenit. nos libentius actu & potentia utimur quod forte humor debilitati adsit.*

enemate adjuvandus venter ut citius assumpta ex ventriculo descendant. 17 A debilitate ventriculi & potissimum oris ejus si vapores caput petant, (cujus signum est quod post sumptum cibum caput dolore gravetur) tunc expedit post assumptum cibum aliqua exhibere quæ ostium ventriculi roborent ac contrahant, ut sunt semen coriandri præparatum, conserva ex rosis rubris, carnes cydoniorum & similia. vel tragemata quædam ex semine coriandri rosis rubris ficcis, pane tosto, quibus additur quandoque nonnihil feminis anisi, & si ventriculus frigidior galanga, garyophylli vel menta sicca. deinde saccari quantum est omnium pondus. ex quo aliquid sumitur mox ab assumpto cibo potione nulla subsequente.

Vteri.

Ex utero capitis dolores adhibitis utero idoneis remedijs, cessant. prodest suppressis mensibus venæ sectio,

sectio, & juniorib. quidem
ex vena circa talos¹⁸, se-
nioribus verò quæ 50. an-
num exceſſerunt circa pe-
dis majorem digitum. pro-
ſunt verò & his balnea pe-
dum & crurum deorſum
frictiones, præſertim dum
in balneo pedes ſunt. bal-
neum fieri poteſt ex deco-
cto betonicæ, arthemifiæ,
florum chamomæli, addito
ſale. ſubinde & cum cine-
ribus lignorum, aut lixivio
decoquantur herbæ.

18. Quam venam matri-
cis vocant.

*Curatio doloris capitis à
cauſis procatar-
ticis.*

Leſt. 6. Sept. 12.

Si à diuturna ſub ſole mo-
ra caput nimium excalfa-
ctum doleat conveniunt ea
quæ refrigerant & hume-
ctant¹⁹ ut eſt frigidaſper-
ſio, vel applicatio aquæ la-
ctucæ, vel etiam roſarum
cum oleo roſacea, viola-
ceo, aut nenupharino. Gal.
ol. roſaceo frigido caput
perfundere jubet. Paulus
poſcam admovet cum oleo
roſaceo. Poſſunt verò &

I. Calor.

19. Cavenda tamen, ut
Gal. ſuadet, narcotica.
atque etiam astringen-
tia, niſi in pauca quanti-
tate. 2. $\chi\zeta$ τόπος.

20. Qui nulla ratione
permittit occiput per-
frigerari. neq; etiam fa-
cile à calore dolet.

21. Posset & anethum
admoventi nisi calidius
esset.

II. Frigus.

22. Ut à vehementi fla-
u ventorum.

23. Vel deficiente milio
ex semine phalaridis
quod vulgo canari-saet.

capiti applicari lactucæ, vel
violariæ, vel portulacæ, vel
sempervivi folia, per se vel,
cū oleo aliquo ex superio-
ribus, contusa. Avincenua
cataplasma ex hordei fari-
na cum semine psyllij lau-
dat. Admovenda autē hæc
sunt syncipiti sive anteriori
capitis parti, non autem oc-
cipiti, ut 20 Gal. suadet. &
quidem initio ipsius dolo-
ris. Vbi dolor inveterave-
rit adjicienda sunt superio-
ribus quæ aliquantum frigi-
ditatem aliorum reprimant
& simul vim quandam ha-
beant doloris sedativam:
ut est chamæmelum & ex
floribus ejus compositum
oleum.

Si autem à nimio frigore
caput doleat calfacienti-
bus ol. caput ungendum
est: ut rutaceo, laurino, vel
si fortiore opus est etiam
ex euphorbio composito.
Aut utendum est cal. & sic-
cis fomentis. ut ex milio,
panico, vel etiam malto,
frixis & sacco impositis
& capiti calidè admotis. vel
floribus

floribus chamomæli cum
sale²⁴ frixis & similiter ad-
motis. Gal. usum vini &
corporis motum commen-
dat.

24. In vase mundo nullis
odorib. infecto. rarum
hoc genus doloris tamen
quum incidit magnum
in fomentis his usum re-
peri.

111. Odor.

1.

A malis odoribus si caput
doleat refert cognoscere
qualis fuerit odor offendēs.
an videlicet fuerit foetidus
veluti à cadaveribus corru-
ptis vel à calidis caput im-
plentibus; vel à frigidis tor-
porem inferentib. Si igitur
odor à quo caput dolet fue-
rit foetidus veluti à cadave-
ribus mortuorum vel alijs
similibus theriaces aliqui
exhibendum est²⁵, vel alte-
rius alicujus alexipharma-
ci. aërem verò etiam alte-
rare conducit ut accensis
juniperi lignis, aut baccis
ejus super carbones positis;
vel aromatum suffitu. ace-
tum verò & sæpius naribus
admoveere utile est. Si au-
tem ab odore calidorū ca-
put doluerit ut moschi, am-
bræ, croci, castorei, ocymi
& similium offerenda sunt
naribus frigida odorata ut
violæ, rosæ, flores nenupha-

25. Nam si contingeret
hunc foetorem ad cor-
ferri in pestem incide-
rent. Qui aerem à cada-
verib. ad Neoportum
Anno 1600. Julij 2. cæ-
sorum infectum haufe-
rat, in icterum letbalem
incidit.

2.

- ris, camphora, fantali latei,
 3. & aqua rosarum. Frigida
 verò si odore nocuerint ut
 sunt hyoscyamus, papaver,
 opium offerenda erunt ca-
 lida ut crocus, semen nigel-
 læ, caryophylli & similia
 aromata, addito si libuerit
 aceto.

IV. Ebrietas.

26. *Liberum eundem
 apud Ægyptios Osirin
 Harpocraton industria
 hederatum argumenta-
 tur, quod hederæ natura
 sit cerebrum ab heluco
 defensare. Tertull. de
 corona milit. Eidem mi-
 tra vinciri caput, pro-
 pter dolores qui fuman-
 te vino caput aggre-
 diuntur. Euseb. 2. præ-
 par. Evangel. c. 2. re-
 fert. Arcta sanè per fas-
 ciâ capitis dolentis con-
 strictio, levamen affert.*

V. Ictus,

Ab ebrietate dolor ca-
 pitis natus si somno quiete
 & abstinencia non fuerit
 curatus, neque vomitione
 consulendum est ventricu-
 lo. admittit Gal. vinum te-
 nue & aquosum, sed dilu-
 tum. nos verò etiam non
 dilutum tale permittimus.
 prodest verò & serapium
 ex absinthio. Quod si verò
 nec sic dolor capitis con-
 quiescat ad quietem corpo-
 re composito capiti quædã
 applicari possunt ut brassi-
 cæ folia in aquam calidam
 ut Paulus ait, immersa. item
 & oleum rosaceum cū suc-
 co hederæ²⁶ vel brassicæ &
 aceto permistū vel aliquid
 eorum quæ capiti ad inso-
 latum adhiberi solent.

Ab ictu aut percussione
 capitis

capitis dolor inunctione
olei rosati cum exiguo ace-
ti calefacti curatur, si ictus
magnus non fuerit. nam
major diligentiorē curam
requirit. de qua non est hoc
loco dicendum.

*Dolor ex causa ante-
cedente.*

Lect. 7. Sept. 13.

Dolor capitis à causa or-
tus antecedente diligentio-
rem curam quam cæteri re-
quirit. 17. Cognoscere autem
causam inprimis refert &
anne sola sit intemperies vel
cum humore, rarissimū au-
tem est solam intemperiem
causam præbere dolorum,
ut plurimum humores con-
iuncti sunt, qui sunt vel san-
guinei, vel biliosi, vel pitui-
tosi, vel melancholici.

17. Sic hipp. lib. de arte
inquit Medicū cum suf-
ficere ad curandum, qui
sufficit ad cognoscendam
causam.

Sanguineorū humorum
redundantiam ostendit ha-
bitus corporis plenus ac
temperamentū calidum &
humidū. sensus doloris cum
tensione & quandoq. cum
quadam pulsatione, faciei
cum rubore tumor, pulsus
magni, urinæ vel rubentes,
aut perturbatæ. Superve-

Sanguis.

K

28. *Vinum si foris applicetur est cal. & siccum. intus actuali suo humore humectat.*

29. *Ab hac autem causa dolor valde magnus atque excedens in cerebri inflammationem quandoque transit.*

Bilis.

niunt autē ex sanguine dolores frequentius veris tempore & cum cæli constitutio calida est & humida : ut flante austro. Promptissimi autem ad hujusmodi capitis dolores sunt qui liberalius vivunt & multo cibo ac potu præsertim²⁸ vini utuntur.

Biliosi humoris redundantiam ostendit dolor capitis cum²⁹ puncturis & corporis habitus extenuatus ac biliosus, ad iracundiam promptitudo, facies pallida ac flavescens, somnus rarus aut exiguis & quandoque cum insomnijs de pugnis, contentionibus, sanguinis profusione, vel incendijs. adest sæpe oris amaritudo, linguæ quandoque siccitas vel asperitas, & fitis. Ex bile autem capitis dolores fieri magis æstate contingit & quum aer cal. ac siccus est quam alio tempore præsertim post multum laborem ac corporis exercitium & calidorū frequentem usum.

Transit autem hujusmodi

modi dolor quandoque in
maniam, phrenitidem, vel
cerebri erysipelas.

A frigido ac pituitoso
humore ^{3o} si caput laborat
dolor gravans est & non
intensus apparet, sed veluti
alicujus pōderis sensum af-
fert. præsertim si materia
fuerit copiosa. adsunt non
raro humorum per nares
distillationes, & quandoq;
ad palatum quæ linguam &
os humectant. adest & som-
nolentia vel somnus pro-
fundior, facies tumet & ex
albido colore pallet. urinæ
cruditatem ostendunt. pul-
sus tardi sunt. Promptissi-
mi autem ad hujuscemodi
dolores sunt frigido ac hu-
mido temperamento præ-
diti. anni verò tēpus maxi-
mè idoneum quod frigidū
est ac humidum. hujusce-
modi autem capitis dolori
quandoque lethargus suc-
cedit, aut carus, aut etiam
catochus.

Pituita.

3o. *Non infert dolorem
nisi sua copia.*

Ab humore autem me-
lancholico crasso frigido
& sicco dolores nulli fiunt,

Melancholia.

K 2

31. *Quod vel ex solo
potest colligi schirro.*

³¹ nisi flatus sint permixti qui
tensivum aut gravantē do-
lorem inferant. talis dolor
cum vigilijs, aut gravib. &
molestis insomnijs accidit,
& facile in melancholiam,
aut epilepsiam, aut in lycan-
thropiam mutatur.

Ex sola intemperie.

32. *Quia dolor semper
attrahit ad se.*

Dolores ex sola intem-
perie, si fieri contingat, non
³² diu durant, accidunt enim
illis qui temperata habent
corpora, & neque plenitu-
dine neque cacochymia la-
borant.

Dignoscitur autem cau-
sa ex ipsius intemperaturæ
sensu. calida intemp. caput
reddit calidius: frigida fri-
gidius. siccitas & humidi-
tas dolorem non adferunt.
sed siccitatem comitantur
quandoq. vigiliæ & subinde
falsæ imaginationes quod
melancholicum est. humi-
ditas oblivionem quandoq.
parit & memoriam offen-
dit, veluti non raro & ipsa
frigidity.

Lea. 8. Sept. 15.

Sanguis.

*Curatio capitis doloris ex
sanguine.*

Capitis dolor qui ex san-
guine

guine vel solo vel alijs humoribus permixto factus est quandoq. remissior est, quandoque verò vehementior. mitiorē cephalalgiam: vehementiorē cephalæam appellat. Cephalæa autem adeo gravis ac vehemens dolor est ut neque ullum strepitū, vel nimium splendore³³ æger perferre queat, cui superveniens febris continua meningum sive membranarum cerebri inflammationem adesse ostendit quam Paulus cerebri³⁴ inflammationē appellat. Dolores quidem continui in cephalæa sunt, sed tamen frequenter per intervalla exacerbationes suas habet, adeo ut ipse æger caput sibi malleo tundi vel frangi vel distendi existimet. ad oculos quoq; ipsos quandoque dolor extenditur.

In utroque dolore³⁵ sanguis mittendus est ex vena brachij media aut exteriorē quā cephalicam aut humerariam vocant, habitatione & virium ægrotan-

33. Non enim solum pericranium sed & meninges afficiuntur.

34. Quin & esse nihil prohibet. cerebrū enim non minus quam Meninges, sua vasa habet, venas inquam, atque arterias, per quas alimentum accipit. omne autem quod alitur etiam inflammari potest, etiam ossa ipsa. rarè tamen id fit, ob frigidam & horum, & illius intemperiem.

35. Non enim fit nisi in corpore repleto sanguine.

36. Nam sæpe dextra vena secta dextram tantum partem leuat. nam dextræ rami demittuntur per dextrā tantum partem, sunt intersepti sepimento à sinistris. Sic cuidam laboranti inflammatione tonsillarum secta dextra vena dextra tonsilla subsedit. altera non prius subsedit quam & à sinistro brachio detractus esset sanguis. R.D.

37. Alvus adstricta semper exacerbat Capitis symptomata. 2. Pro-rhet. comm. 55.

tis & vehementiæ ipsius doloris. si enim dolor vehemens fuerit & ægroti validæ vires iterata sanguinis detractio ex ³⁶ altero brachio utilis fuerit. Alvo etiā providendum est, & magnopere curandum ne illa dura sit. convenit itaque illam aliquo enemate etiam sæpius eluere ³⁷ quod feces educet & humores etiam aliquatenus evacuet. quod si verò æger enema admittere recuset exhibendum erit aliquod medicamentū clementer alvum dejiciens ut est infusum rhabarbari cum manna vel cum serapio ex infusione rosarū &c. faciunt verò ad diversionem etiam frictiones & ligaturæ crurum, balnea pedum tum & ea quæ sub pedibus ligantur de quib. ubi de dolore capitis in febribus, dictum est.

Iam & sanguis derivandus est per cucurbitulas circa cervicem vel in dorso positas cum scarificatione si copiosus fuerit. Venas etiam

etiam in naribus secandas
est qui consulat, vel in fron-
te. Paulus verò etiam venas
sub lingua secare ³⁸ jubet.
spontè autem è narib. san-
guinem profluere bonum
est, nec reprimendus ullo
est modo nisi superfluat.
Continendi autè sunt ægri
in tenebris & in quiete se-
moti ab omni strepitu. Vi-
ctus ratio humida ³⁹ esse &
frigida debet, & in maxi-
mis doloribus tenuis in mi-
tioribus verò dolorib. ple-
nior. *A carnibus & ovis in
maximis doloribus est ab-
stinendum. in mitiorib. ve-
rò non usque adeo. Vinum
in neutro admittendū do-
lore. fugienda quoque om-
nia sunt quæ caput imple-
re possunt ut sunt nonnulli
odores, & cerevisiæ. ⁴⁰ Lac
etiam caput dolentibus au-
tore Hipp. malum. Potus
sit aqua hordei, vel aqua
simplex ijs qui illa uti con-
sueverunt, vel tenuissima
omnino cerevisia. Cibus
ptisanæ cremor, vel lactu-
ca, oxalis. intybum aut simi-

38. *Præclicis quidem
ob capitis dolorem re-
nam sub lingua secare
usitatum non est. Ana-
tome tamen id omnino
suadet, aliarum vena-
rum sectione præmissa.*

39. *Quamvis sanguis sit
humidus tamen ratione
caloris excitati à san-
guine humidus sit victus
siccitas enim lima calo-
ris est.*

2. *Sanguinè enim gene-
rant qui dolorem majo-
rem reddit.*

40. *Vel illa ratione quod
augeat sanguinè. in alijs
doloribus prohibetur
quod butyrosæ partes
facile in bilem vertan-
tur. 5. Aph. 64.*

les herbæ decoctæ sicut in curatione ardentes febris dictum est.

Topica remedia fronti ac sincipiti admovenda sunt humectantia ac refrigerantia, talia qualia in dolore capitis ab insolatu. Periculosissimus autem morbus Cephalæa est si superveniat febris. ostendit enim hæc cerebri membranarum inflammationem adesse ut dictum est.

Le&.9. Sept.19.

*Curatio capitis doloris
ex bile.*

Bilis.

A bilioso humore capitis dolor mox ab initio vacationem & humorum contemperacionem requirit. Venæ sectioni parcendum est, nisi simul cum bile sanguinis redundantis adsint signa & æger venæ sectioni assuetus, annique tempus propitiū. quo casu sanguis ex vena humeraria detrahi poterit & præsertim dextri⁴¹ brachij. Inter purgantia admodum familiare est rhabarbarum⁴² quod cum decocto herbarum refrigerantium, vel stillatitio liquore exhi-

41. Quia sedes bilis in dextro potissimum latere.

42. Quia siccum est valde per se hic non exhibetur.

exhiberi potest. addito vel
 serap. ex infus. rosarum,
 vel manna. ⁴³ potentius est
 scammonium cū quo com-
 posita diaprunis & elect. ex
 osyllio, robustis corporibus
 conveniunt. potest verò &
 exhiberi decoctum folio-
 rum ⁴⁴ senæ additis herbis
 refrigerantibus & aliquo
 supra dictorū purgantium.
⁴⁵ Prodesse verò & enema-
 ta possunt qualia in dolore
 cap. ex sanguine. Herbæ
 contemperantes sunt lactu-
 ca, intybum, malva, cicho-
 rium, borago, violaria, atq;
 ipsæ violariæ, & nymphææ
 flores albidī. Serap. con-
 temperantia ex violis, ex
 intybo, ex floribus nym-
 phææ, ex infusione rosa-
 rum, ex cichorio & similia.
 Victus ratio frigida & hu-
 mida esse debet, ut in do-
 lore à sanguine. Aerē verò
 & ipsum refrigerari conve-
 nit per arborū ⁴⁶, & præci-
 puè salicū, viventes ramos,
 gramen recens decerptū &
 aquæ frigidæ frequentem
 asperisionem, ut in curatio-

*43. Inter purgantia quæ
 solum habent scammo-
 nium est & el. de succo
 rosar. verum illa ob san-
 talos minium resiccat in
 hoc casu.*

*44. Possunt tanquam
 commune med. ad om-
 nes purgationes adhibe-
 ri, ut Gal. de hiera picra
 dicit adhibitis ijs quæ
 casus requirit. ne autem
 tormina excitent syr.
 addendus.*

*45. Quia in nullo dolo-
 re cap. prodest feces re-
 tineri.*

*46. Quercuum rami non
 sunt inutiles, non tamen
 graveolentes sunt adhi-
 bendi.*

47. Cucurbitilis magis sanguis quam bilis trahitur, frictiones siccant ideo his non utimur hoc casu.

48. Ad retundendam acrimoniam.

49. Nam & hoc dolorem capitis lenit.

50. Ut diutius maneant humida, & retineantur.

51. Quia humectat & lenit.

52. Æstate.

53. Hyeme.

ne feb. ardent. dictū. 47 Nari-
ribus infundi vel per ipfas
attrahi succus betæ potest
aqua tamen hordei admix-
ta⁴⁸, in qua vel violæ vel
malva, vel illarum herba-
rum similes incoctæ sint.
Profunt verò & lotiones
pedum ex herbis refriger. &
humectantibus supra dictis
in aqua decoctis. atque hu-
juscemodi decoctio & 49
manus lavari & caput riga-
ri utile est. capiti siquidem
& quæ refrigerant, ac hu-
mectant admovenda etiam
sunt. ut prædictarum her-
barum decocta vel aquæ
destillatæ. possunt verò ex
ijsdē fieri cataplasmata ad-
dito oleo ex violis vel flori-
rib. nymphææ, vel unguen-
to ex populo nigra. quæ etiā
fronti & temporibus appli-
cari possunt. præsertim ad-
dito⁵⁰ ovi albo vel lacte⁵¹
muliebri.

Quod si verò vigiliæ mo-
lestæ sint, neque somnus his
remedijs succedat, supra-
dictis herbis addi poterunt
folia⁵² aut⁵³ capita papave-
ris,

is, aut oleis addi aliquot
 rana opij, & tantundem
 ere croci, ⁵⁴ vel in cremo-
 e ptisanæ unum aut alte-
 um capitulum incoquen-
 dum est. vel omnino somni
 tempore ꝑ β. aut ad sum-
 num ꝑ j. serapij de papave-
 e ⁵⁵ sive diacodij exhiben-
 dum veluti latius dictum est
 ubi de vigilijs in febribus.
 omnū enim omnino pro-
 vocare refert. illo siquidem
 non succedente superveni-
 re huic dolori maniam ⁵⁶
 valde malum est.

*De ⁵⁷ gravitate cap. ex
 pituita.*

Quando autem pituito-
 sus frigidus humor caput
 aggravat exhibenda sunt
 quæ hunc expurgent & per
 alvum deducant ut sunt ex
 compositis diaphœnicon,
 diaturbith, elect. Iudum,
 pil. aureæ, cochia, & ex
 aloë Gal. omnium * fortif-
 simæ. & siquidem gravitas
 diuturna fuerit sæpius exhi-
 benda hæc sunt sed tamen
 in minori quantitate. ad
 quod plurimum conducunt

54. Si nimirum capiti
 quid apponi ager non
 ferat. vel ex cerevisia
 cui sit capitulum papa-
 veris incoctum sorbiti-
 uncula cum farina hor-
 dei, tritici aut secalis
 componi potest.

55. Non est aliud discri-
 men quam quod diaco-
 dion fiat cum melle. se-
 rap. cum saccaro cujus
 usum eximium reperit
 Dodon. quanvis alij à
 diacodio recedere no-
 lint.

56. Cui si febris acces-
 serit jam phrenitis est.
 nihilq: est aliud discri-
 minis mania & phreni-
 tidis.

lect. 10. Sept. 20.

57. Est enim magis gra-
 vitas quam dolor. non
 est mittendus sanguis
 quia crudi humores ag-
 gravant caput.

* Fortiores pill. illæ de
 quibus in alopecia.

58. Quia cum diutius teneantur in ventriculo ideo trahant è longinquo.

59. Alia med. in minori quantitate data conficiuntur à natura ne quicquam agunt. pil. ob substantiam duram non possunt.

60. Non tantum potentia, sed & actu.

61. Non quotidie. ratione opij quod tuto quotidie exhiberi non potest.

62. Ex ligno cedrino, juniperino & similibus si haberi possunt.

63. Nam succos crudeos generant.

pillulæ quæ licet infra dosin exhibitæ alvum tamen movent, quam singulis diebus officio suo fungi maxime refert. Possunt verò & mitiores pillulæ dari ut ex hiera picra vel alephangi-næ dictæ. Intermedijs diebus exhibere convenit quæ calefaciant & resiccent, ut est serap. ex stœchade, conserva florū rosmarini, conserva majoranæ, vel florum betonicæ, rad. enulæ campanæ conditæ. item elect. pleris archonticon. item diambra, diamuscum pro ditioribus. Convenit verò & quandoque nonnihil mithridatij, vel theriacis Andromachi, manè jejuno ventriculo sumere. Aerem verò quo æger utetur ad cal. & sic cum mutari conducit, ut hyeme accenso luculento foco. Ab oleribus & fructibus fugacibus abstinentum est. Cibos condiri refert aromatis; vel hyssopo, salvia, thymo, origano & hujuscemodi calidis herbis.

bis. In cibo verò ⁶⁴ & par-
cum esse convenit, præfer-
tim cœnæ ⁶⁵ tempore. Vi-
num ⁶⁶ non admittendū nisi
tenuē admodum. sic nec
cervisia alia quam tenuis.
Aqua decoctionis cinna-
momi vel seminis anisi cō-
ducit. Naribus offerenda
sunt odorata & præsertim
melanthij ⁶⁷ sem. tostum &
in nodulo colligatum. Ster-
nutationes quandoque pro-
vocari utile est pulvere pi-
peris vel. veratri albi. man-
dere quoque cubebas ⁶⁸ vel
masticem subinde condu-
cit vel rad. pyretri, aut pim-
pinellæ saxifragæ.

Frons verò illinenda &
aurium nariumque meatus
oleo rutaceo vel chamæ-
melino, vel nardino vel
consimili calido. Gal. etiam
sedem ⁶⁹ sive anum & pe-
dum vestigia oleo rutaceo
quosdam inungere refert.
lib. 2. $\tau\omega\pi\alpha\varsigma$. Caput quoq;
⁷⁰ mediocriter contegen-
dimento straminum, pars in dolore constituta. Cœl. Au-
rel. l. 1. chron. c. 1.

⁶⁴. Nam carnes habent
humidas fames debet
tur Hipp. 7. Aphor. 59.

⁶⁵. Quoniam cœna po-
tissimum gravatur ca-
put.

⁶⁶. Nam humorib. cru-
dis caput implent.

Localia.

⁶⁷. Resiccat potenter.
unde in destillationibus
utile.

⁶⁸. Extrahunt humores
è capite & relinquunt
qualitatē qua cerebrum
siccant.

⁶⁹. Est Archigenis quem
scivisse sympathiam esse
inter anum & caput est
neceffe. de qua dictum
in defluvio capill. ex luc
venerea.

⁷⁰. Nā nimia contectio
attrahit humores. Eri-
locandus æger si totum
caput doluerit, supinus:
si autem ex parte, ea
parte quæ patitur. miti-
gatur enim quodā blan-

71. Non nimium odorati. nam omne odoratum gravat caput. 3. Probl. Aristot. 13.

72. Paroptesis etiā adhibenda, inquit Cael. Aurelianus, ex carbonibus equali vapore medentibus. l. 1. Tædar. c. 1. Sed vehemens nimis auxilium nisi prudenter administretur.

73. Tunc enim resiccat: alias humoribus distribuendis magis humectat.

74. In sanitate non est prohibendus assuetis nisi ledat. ut qui parci potus sunt. qui autem multum pro more bibunt ad potum illum digerendum, egent aliquo tempore. aliam causam cur alijs noceret, alijs minimè reperire non potui.

dum est ne à frigore lædatur. conducunt ad hoc faculi cucuphas vulgò nominant, in quibus simul cum gossypio pulveres⁷¹ insuti sunt, nonnullorum calefacientium. ut betonica, majorana, florum stœchados, florum rorismarini, seminis anisi, sem. amyos, cardamomi & similium, & si lubet species etiam pleris archontici.⁷² Somno autem non nimis indulgendum. excitandus sæpius est æger & ad labores, exercitia, deambulationes ducendus est. præsertim corpore⁷³ jejuno.⁷⁴ Meridianus somnus etiā omnino fugiendus nisi admodum consuetus sit, cui tamen detrahendum quantum possibile. Gravitas autem ista capitis cum somnolentia si in lethargum transeat lethalis est.

De dolore cap. ex melanch. hic nil dicemus nam nisi ratione flatuum dolorem non excitat.

tunc autem melancholia est de qua post.

De

De Hemicrania.

IN hemicrania una capitis pars tantummodo dolet dextra videlicet vel sinistra. dolor verò quandoque mitior est. aliquando vehementior, nec cephalæa minor. sic ut nec lucem nec strepitum ager perferre queat. mitiores dolores à causis externis, vel etiam per consensum nō rarò fieri contingit. possunt tamen & ab antecedentibus causis etiam provenire.

Lea. II. Sept. 22.

Curatio autem huiusmodi doloris est pro causarum efficientium diversitate veluti Cephalææ. Vehementiores dolores ex causis nascuntur antecedentibus. videlicet ab humorū influxu, qui vel sponte sua ad caput ascenderunt, vel per causam aliquam externam attracti sunt. Curatio huius à sanguinis quoque missione auspicianda. secunda autē est humeralis brachij illius quod è directo est partibus dolentis. reliqua deinde

1. Quod frequentius fit. nam si sponte influant in utranq; ut plurimū partem incumbunt. Sic quidam remedijs Cephalææ debitis (eadem enim ferre remed. hemicr. & cephalææ sunt) qui surditatem qua laborabat ab alijs persuasus fumo seu vapore quarundam herbarum per inversum infundibulum in aurē recepto, qui hoc recepto omnes propemodū corporis humoris in caput attraxerat. unde gravissima hemicrania tentabatur.

facienda quæ in curatione
Cephalææ dicta sunt.

*De dolore capitis circa mus-
culum temporalem.*

1. Pauci hunc attingunt
aut potius nulli. Avicen-
na autem hunc nomina-
re videtur sodam tem-
poralem. jubet lanam
succidam & mazam ap-
plicari. per quam intel-
ligo cataplasma ex fa-
rina.

2. Sola tum topica ad-
bibere convenit.

Contingit verò & in al-
tera capitis parte dolorem
fieri non tamen per totam
dimidiam partem sed cir-
ca musculum temporalem
& supra aurem. talis dolor
sæpe initio non magnus est,
sed cum tempore intendi-
tur. pars verò affecta citra
doloris intensiorem con-
tingi nequit, & calor cir-
ca locum affectū sentitur.
adeſt quandoque febris, sed
exigua admodum. & urinæ
aliquando nonnihil rubent.
talis autem affectus est in-
flammatiō musculi tempo-
ralis quæ ferè semper ad
suppurationē convertitur,
pus autē per aurem erum-
pit. In principio hujusce-
modi inflammationis san-
guinem detrahare ex vena
humeraria partis dolentis
utile est. sed suppuratione
facta & pure per aurem ef-
fluente parum prodest.

Pur-

Purgantia etiā med. exhibenda & præsertim pilulæ quales supra dictæ quas etiam per vices sumi expedit non tam purgationis, quam diversionis causa.

Locus dolens mox initio unguendus oleo rosaceo vel cataplasma ei admovendū partim reprimens 3 partim resolvens ut ex farina hordei vel vulgarium fabarum & rosæ rubris, floribus chamæmeli, & floribus meliloti in aqua decoctis addito oleo rosaceo & chamæmelino. Quod si dolor hujusmodi cataplasmate non minuatur vel jã diuturnior factus fuerit, applicandum erit cataplas. quod suppurationem adjuvet: ut ex farina hordei, sem. lini & fcenugræci, additis rad. althææ decoctis & cum ipsarum decocto cataplasmate formato, addita axungia porcina vel oleo amygd. dulcium & ung. dialthæas.

3. Quum non possit sanguis per os repelli.

4. Ne cito resiccetur & nihil efficiat.

5. Omelysis græcis sine epitheto dicitur. omelysis triticea cū farina tritici adhibetur. fit autem nullum cataplasma sine farina. substantia enim ex hac queritur; quam pulti similem habere debet. nullæ autem herbe eam sine farina habere possent.

6. Nondum neglecto cataplasmate cum adhuc possit aliquid circa locum hære quod in pus converti debeat.

L

cataplasmati quæ resiccare, roborare, astringere & nonnihil resolvere queant. ut sunt absinthium, rosæ rubræ, flores chamæmeli, ol. chamæmelinum, unguent. dialthæas.

Posteaquam autem dolor omnino conquieverit & pus per aurem fluere desierit, à cataplasmatibus cessandum, locus tamen à frigore defendendus. Auri aliquando quid infundi potest mellis rosati diluti cum vino. deinde imponi gossypium aut lana succida, imbuta ol. amygd. dulcium. ne in auribus sordes concrecant quæ auditum impediant.

Victus ratio moderata esse debet, veluti in leviori cap. dolore ex causa calida.

Dolor capitis unam aliquam partem occupans.

Sunt verò & alij capitis dolores qui unam aliquam vel plures partes occupant, sed tamen exiguas sic ut locus dolens pollicis aut digiti

*7. Prohibet concreescere
oleum sordes in auribus.*

Lea. 12. Sept. 23.

giti extrema parte contegi
 queat. tales contactu de-
 prahenduntur & sæpe cir-
 ca verticem capitis, quan-
 doque etiam circa frontem
 cōsistunt. Causa est humor
 aliquis vitiosus collectus in-
 ter membranam os conte-
 gentem & ipsum capitis os.
 Si materia non fuerit acris
 & mordax valdè, excitatur
 etiam successu temporis tu-
 mores, os verò diuturnitate
 quod subest exeditur & ca-
 riosum efficitur. Vbi verò
 materia valdè acris os etiā
 citò ad tumorem corrup-
 pitur.

1. *Et cutis mollior osse
 non exeditur ob naturā
 humorū. si exedatur os
 sine tumore conferri po-
 test cum meliceride. ta-
 men illa non exedebat
 os.*

Crebò autē hujuscemodi
 cum ossis corruptione do-
 lores accidentia sunt luis
 venereæ, possunt tamen &
 ex alia causa fieri.

Initio autem generalibus
 præmissis utile est empl. ali-
 qua admoventi loco dolenti
 quæ humorem resolvant ac
 discutiant: ut est empl. ex
 meliloto quod vel solū vel
 addito empl. oxycroceo
 applicari potest.

Et si quidem humor non

2. 13. 14. aut 15. die-
bus continuis.

1. In aph. prodest. dici-
tur quasi tum ex multis
singularibus animadver-
sis regulam constituerit.
quū ante in paucis tan-
tū hoc observasset. Ego
aph. corruptum puto. ut
& alij. sunt enim mea
sententia aph. ex scriptis
Hipp. collect. ab alijs;
non ab Hippocrate quod
& apparet in aph. Au-
tumnus tabidis malus.
cui alibi additur apud
Hipp. & ver quum folia
fici cornicum pedibus si-
milia sunt.

discutiatur nec dolores hoc
remedio cessent, ad alia
transeundum est remedia.
& siquidem os nondum vi-
tium esse videatur utile
erit sudorifica aliquot die-
bus exhibere ut est deco-
ctum zarzæ perillæ, vel ligni
guajaci.

Vbi verò diuturnitate os
craniij vitium fuerit ad
manus opus veniendū erit
& tumor vel locus dolens
aperiendus sectione in cute
facta, & humor vitiosus ex-
purgandus, ossisq; pars ca-
riosa eximenda. Tumore
verò existente magno sta-
tim ad sectionem venien-
dum. Victus ratio modera-
ta esse debet ex cibis boni
succī etiam quo tempore
zarzæ aut ligni decoctum
bibitur.

*Dolor partis posterioris
capitis.*

De dolore posterioris
partis capitis scribit Hipp.
lib. 6. epid. & in aph. sed
non alibi. ait autem sectio-
nem rectæ venæ in fronte
profuisse. Rarum autē est
dolo-

dolorem in occipite fieri & quum fit citius à causa externa quàm ab antecedente originem habet, veluti à casu aut percussione. Vbi autem contigerit vel ab hac causa vel ab alia cui sanguis conjunctus est, dolorē fieri, sanguinis missio ex vena frontis per modum revulsionis prodesse poterit. si modo corpus laborantis plethoricū non fuerit. nam repleto corpore prius sanguis è brachio erit detrahendus quam ad hanc localem venæ sectionem veniendum erit. Detrahendus autem erit sanguis ex recta frontis vena, hoc est illa quæ à fronte rectè deorsum descendit versus nasum. quæ confluens ex ijs est quæ utrinque naso adjacent, ut ex anatomicis cognoscere licet. Non sola autem ista venæ sectio prodesse poterit sed & alia facienda quæ doloris postulat conditio. veluti si abiectum aut percussione adhibenda quoq; quæ ad ictum & per-

cussionem remedia requiruntur.

De Phrenitide.

CAP. 3.

Lea. 13. Sept. 26.

1. Ita sæpe Hipp. appellat. interpretes sæpe desipientiam vertunt, quū possit delirium propriè dici.

2. Meminit Hipp. 12. aph. 1. 7. A peripneumonia phrenitis malum.

3. Aph. 7. 18. Propter vigiliam convulsio aut desipientia malum.

4. 7. Aph. 24. Ab ossis vulnere desipientia, si in vacuum penetraverit. i. ut Gal. ait, si cranio aperto detegantur membranae.

PHrenitis sive delirium duplex est. quædā enim per consensum fit. altera vero cerebro primaria affectione laborante. Per consensum facta paraphrenitis, sive ¹ παρὰ φρεσίν dicitur. & talis ardentibus febribus. aut partium internarum inflammationibus ut pleuritidi vel ² peripneumoniae aut ³ diuturnis vigilijs, aut quandoque ilij doloribus, aut capitis vel quandoque aliarum partium vulneribus, vel etiam ossis aliquo ⁴ insigniter læso supervenit.

Delirare autē sive phrenetici esse ægroti tunc dicuntur quando aliena loquuntur, quādo clamitant, vociferantur, irrequieti sunt, vel quando floccos in veste, aut festucas legunt. Futuri autem in febribus vel

vel internarum partium inflammationibus delirij signa sunt vigiliæ, vel in somnia perturbata, & urinæ prius crassæ & rubicundæ postea tenues & albidæ factæ.

Curantur autem hujusmodi, paraphrenitides in febrib. quidem vel propter internarum partium inflammationem factæ, viribus adhuc valentibus per revulsiones. ut per frictiones, ligaturas, cucurbitulas, & per ea quæ sub pedibus ligantur. de quibus in curatione cap. doloris in febribus dictum est.

Quod si autem propter diuturnitatem vigiliarum delirium factum fuerit somnus provocandus erit sicuti in vigilijs quæ febribus accidunt, & veluti in curatione dol. cap. à bilioso humore dictum est.

Ex alijs verò occasionib. deliria supervenientia curari convenit pro conditione affectuum ad quos consequuntur.

5. Signum enim est quod materia rapiatur ad caput. Si ante judicationem super-

Paraphrenitis. veniant, sine dubio deli-

rium significant. Si autem post judicationem urinæ albae multæ, significant sordes retineri quas ad caput raptum iri verisimile post judicationem non est, sed circa viscera hepar aut alibi herere possunt. Hipp.

in epid. Xenophanem & Critiam dysentericos post judicationem hac apparente factos, refert.

6. *Ab ileo vomitus, & singultus, & desipiētia, & convulsio malum.* lib. 7. aph. 10.

7. *A sanguinis profusione delirium aut convulsio malum.* 7. aph. 9.

8. *Propter plagam in capite stupor aut delirium, malum.* 7. aph. 14. *Fit etiam ex multa potione.* 7. aph. 7. *Ex multa potione rigor & delirium malum. Quidam ita mutus factus ex plenitudine videlicet phlebotomia vocem recepit.*

Phrenitis.

9. *Non est tamen possibile quin ipsa cerebri substantia etiam calore præter, naturali incalescat.* 1. *Prorhet. comm. antipenultimo.*

10. *Quod licet permistus sit humor melanch. humorib. capitis non tamen tumorem aut inflammationem alicujus partis excitarit quæ nunquam sine febre est.*

Interim deliria sive paraphrenitides quæ propter magnos dolores fiunt veluti⁶ ilij, vel magnas⁷ sanguinis profusiones, vel alias immoderatas vacuationes consequuntur, vel capitis⁸ aut aliarum partium gravibus vulnerib. superveniunt lethalia habentur virib. jam dejectis ac debilitatis. Sed quæ in febrium & nonnullo⁹ morborum initijs fiunt viribus ægroti adhuc valentibus minus periculosa sunt.

Phrenitis autem quæ cerebri humani affectio est, membranarū ejus inflammatio⁹ est. non tamen pura, sed erysipelatodes. neq; enim ex sanguine solo, sed ex sanguine bili permixto originem habet. differt verò à mania quod hæc absq; febre fiat, phrenitis verò febrē habeat conjunctam, eamque continuam & ardentem.

Est autem inter phrenitides quædam mitior leviter tantummodo mentem per-

permovens: aliæ vehementiores pro conditione videlicet & qualitate bilis. tenuis siquidem bilis ac palidior mitiorem parit phrenitidem. à flava sive ruffa bile malignior ac vehemētor fit. quæ verò ex bile ruffa, adeo præaffata ut ferè in nigram degenerarit, gravissima est, & ferinam quandam dementiam conjunctā habet¹², sic ut coerceri ægroti debeant.

Acutissimus autem & periculosissimus affectus phrenitis est, ¹³quem nō solū acuta febris aut inquietudo comitatur, sed adsunt quoque capitis dolores, vigiliæ, aut insomnia admodum turbulenta, linguæ asperitas, sitis inexhausta, oculi subinde sunt terribiles, venæ illorum rubent, quandoque sponte illachri- mant, vel læmis gravantur. ¹⁴sanguis etiam aliquando è naribus stillat.

In urinis autem & dejectionibus frequenter febris nulla signa apparent. quod

11. *Quæ quodammodo est tenuior pars sanguinis.*

12. *Vbi deferbuit melancholicus succus in melancholiam facile transit phrenitis.*

13. *Difficillimæ phrenitides in abortientibus.*
3. *Epid. 3. sect. Ægyptū quotānis invadunt Phrenitides quæ paucis, duabus, tribusve horis perimunt. Prosper. Alpin. de med. Ægypt. c. 14. Lect. 14. Sept. 27.*

14. *Quod est signum magni fervoris in capite. neq; enim ob copiam erumpit, sed calore re-
refactus ebullit.*

L 5

tamen valde malum Hipp. affirmat. læditur autem subinde imaginatio tantummodo, quandoque sola ratiocinatio, aliquando verò utraque facultas, ut Gal. 4. de locis affectis exemplis ostendit¹⁵.

15. Quum anterior pars afficitur cerebri, non posterior in qua memoria, ea integra manet quod liquet ex versib. & can-tilenis quas recitant.

Curatio autem phrenitidis à sanguinis missione initium habere debet. ex brachio revulsio facienda; ex vena frontis derivatio.

Secunda autem erit vena media ex Aetij præcepto si adsit sanguinis redundantia. illa non præfente, ex humerarijs sanguis ducendus. Quod si ex brachio commode fieri nequeat propter magnam ægri inquietudinem, tunc, inquit Paulus, ex frontis vena tantum auferendum quantum fatis erit¹⁶.

16. Hæc enim vel si maximè sese jactitent tum empl. echecollo seu glutinoso, tum ligatura, sic obturari seu occludi potest, ut à sanguinis prurptione metuendum non sit.

A sanguinis missione injicienda sunt enemata emollientia ac lenientia. vel illorum loco aliquod leviter alvum deducens & simul alterans exhibendum. quale est serap. ex rosis aut ex violis, fortiora med.¹⁷ fugien-
da

17. Quod humores conturbet & vires dejiciat. morbo satis afflitas.

da sunt. Diversiones etiam leves faciendæ sunt per frictiones, per pedum & manuum balnea, ut aliquo modo humores deorsum revellantur. Continendus æger in quiete¹⁸ & ab omni corporis motu arcendus, & in loco quidem continendus nec obscuro nec nimium lucido ab omnibus picturis libero. non calido, nec tamen omnino frig. sed moderatè frigido¹⁹. Victus tenuis refrigerans & humectans. potus aqua hordei.²⁰ cibus ptisanæ cremor, aut panis ex aqua, vel lactucæ vel cucurbitarum aut peponum carnes coctæ &c.

A frigida aqua potione omnino abstinendum est. Somnis²¹ provocandus est vel odoribus, vel unctionibus ut ex oleo violarum. nymphææ, unguento ex populo naribus & temporibus admotis, vel capitulis papaveris sorbitioni incoctis ut in curatione cap. dol. ex bile dictum. à multo tamen narcoticorum usu

18. Motus enim acriores humores reddit.

19. Quod inflammationes non solum repelli, sed aliquo modo etiam simul discuti, necessum sit.

20. Paulus potiones aliquot ex melle habet quod quum facile in bilem vertatur posteri hac reprobarunt. potest vero aquæ hordei in fine decoctionis aliquid syr. rosati addi. ita boni saporis fuerit.

21. Phreniticos somnus sanat. Plin. 26. c. 11. Omnib. phrenitide affectis somnus & difficilis, & præcipuè necessarius est. sub hoc enim plerique sanescunt. Cels. l. 3. cap. 18.

abstinendum est præsertim
quum longior factus fuerit
morbus.

22. *Quod nec inflam-
matio, nec pars prin-
ceps valde frigida fe-
rat.*

23. *In Heræa Arcadiæ
vites sunt ex quib. vinum
sanam mentem aufert
atque ecphronas seu de-
mentes Arcadas; fœmi-
nas verò fœcundas red-
dit. Ælian. l. 13. variæ
hystor.*

Inter localia med. lau-
datur oleum rosaceum, vel
oxyrhodinum quo frons &
futura coronalis inungen-
da est, non tamen frigi-
do, sed ætate tepido. hyc-
me verò calido. cui in pro-
gressu morbi oleum cha-
mamel. vel anethinum ad-
miscendum erit.

Vbi autem delirium ces-
saverit, vires reficiendæ &
idonea victus ratione repa-
randæ sunt. & tenue, aquo-
sum, dilutumq; vinum con-
cedendum.

Cavere interim debet
æger ab ebrietate, ira, à
solis æstu, à nimijs laborib.
& ciborum corruptione.

Erysipelas Cerebri.

C A P. 4.

Lea. 15. Sept. 29.

AD phrenitidem quo-
que referendum est
quod erysipelas cerebri à
Paulo appellatur nam & in
hac affectione ægroti desi-
piunt

piunt & aliena loquuntur.
caput universum dolet ac
frequenter etiam calet. fa-
cie tamen sæpenumero pal-
lent. os siccum est & lin-
gua nigra & valde aspera,
febris adest lenta in qua
etiam exteriora frigent. in
urina nullæ apparent febris
notæ. Est autem hic affe-
ctus non tam cerebri quam
membranarum ejus prima-
rius morbus, qui à sola &
puriori tenui bile gignitur.
Periculosus verò ac diffici-
lis hic morbus est. germa-
ni dē bruyn appellant, non-
nulli latinè morbum Hun-
garicum. Initium curatio-
nis fit per sanguinis missio-
nem non tamen copiosam;
neque ex brachio, sed ex
venis tantummodo sub lin-
gua per quas & revulsio &
derivatio humoris fit. Al-
vum lubricam esse conve-
nit. itaq; si non sponte pro-
fluat adjuvanda erit.

Victus ratio frigida quo-
que ac humectans esse de-
bet. arcendus autem est
ager non modo à frigida

1. Imò etiam frigent.
Paulus. ob caloris in-
trorsum retractionem.

2. Per med. non potest
trahi materia quod id
nimis forte foret si ex
cerebro trahere posset.

3. Si somnus provocandus provocantia sint valde tenuia nam narcotica nocent.

4. Quod Vng. populeum Officinis dicitur.

potione, sed etiam ob aere frigidiore, ne erysipelas introrsum reperiatur. Linguae verò & ea adhibenda quæ in febribus ardentibus adversus linguae asperitatem dicta sunt. Fronti verò ac temporib. ol. viol. aut nymphaeae illiniri potest: vel cū lacte muliebri calide 3 apponi. addito quandoque ung. ex populo nigra 4. Narcotica med. & hic fugienda sunt.

Erysipelas Faciei.

CAP. 5.

1. Vel natura quod primum est expellente; vel natura propter vulnus, etiamsi magnum non sit attractam.

Est verò & aliud erysipelas quod extrinsecus & praesertim in facie exoritur. rubet autem & tumet facies, cutis ejus tensa levis ac relucens apparet. erumpunt etiam quandoque exiguae vesiculæ. in declinatione laxiore facta cute albidæ quædam ac tenues instar furfurum decidunt squamulæ. In hujusmodi autem erysipelate sanguis, ut inquit Gal. non necessario mittitur.

tatur, sed ventrem per inferiora purgare sufficit med. quod flavam bilem ducat.

• si tamen erysipelas phlegmonodes esset sanguinem quoque mittere utile foret.

Localia autem med. faciei adhibere oportet quæ non repercutiant; ac non multum refrigerent, sed temperata quæ discutiant ac digerendi vim habeant, ut est

lactis serum in quo fumus terræ & nonnihil chelidonix sint incocta. cuiusmodi decoctum sæpius admo-
verit, telis etiam lineis in hoc madefactis superpositis tepidis aut calentibus.

Summopere cavendum est ne frigidum aliquod admoveatur & ne frigidus quidem aër admittatur. per frigus enim erys. introvertitur quod lethale esse Hipp.

in Coac. ait. Signum autem quod introversum sit erysip. est, quod desinente faciei rubore difficilior

est tantummodo dicitur. unde magis confirmor aph. non ab Hipp. editos. est autem revera lethale.

2. Vidi med. forti quale diaprunis est uno die subsedisse tumorem eaq; fortibus adhiberi possunt. mobilis enim propter tenuitatem & calorem humor est; ideoq; vel ex remotis partibus, facillimè versus alvum retrahitur.

3. Si adsit tumor ac rubor magnus; ac signa redundantis sanguinis ad sint.

3. Vid. interfectos imposito succo plataginis quæ astringit. Gal. utitur frig. non tamen astringentib. verum neque frigida nostra corpora ferunt. cui illicitum Nutritum in phrenitim cum periculo devenit.

4. Quæ frigida est herba quando viridis existit, & leviter discutit.

5. 6. Aph. 25. Malum

est tantummodo dicitur. unde magis confirmor aph. non ab Hipp. editos. est autem revera lethale.

6. *Materia ad pulmones & cor delata. Quod si ad Cerebrū ejusq. membranas repellatur Phrenitis, & Convulsio succedunt.*

1. *Estque crisis ac terminatio febris. Fit & per se, maximè in sexu faemineo. in quib. ichores sæpè miscētur aquei. tumq; Erysipelas album vocare solent mulierculæ. nos Oedematodes appellare possemus.*

Lea. 16. Sept. 30.

1. *Quare neque acutus morbus, ut phrenitis est. De mania per consensum non dicitur. quod illa nisi in morbis febrilibus non oriatur.*

reddita sit respiratio. Vitus ratio in hoc affectu qualis in superiore, sed tamē minus tenuis esse debet.

Erysipelas crurum aut aliarum partium.

CAP. 6.

Contingit verò & aliquando erysip. & in alia corporis parte ut in cruribus fieri & frequentiss. post aliquot dierum febre. sed neque tali refrigerantia adhibenda sunt, sed tēperata & aliquo modo discutientia. veluti supra dictum. Vel serum lactis solum. Fiunt autē hujusmodi erysipelata à natura quod pravum est expellente, veluti in crisi, atque idcirco nullo modo repercutiendum.

De Mania.

CAP. 7.

Mania insania est & delirium absque febre: in quo, ut dictum est, à phre-

phrenitide differt. Causa quandoque est biliosus humor sanguini permixtus ad cerebrum perlatus: quandoque capitis vehementes ex bile dolores: vel vigiliæ: vel labores: vel etiam inedia. Biliosus autem humor aliquando mitior, aliquando malignior, ut supra dictum est; sic & mania quædam minus vehemens est & quandoque cum risu; alia verò vehementior, veluti quæ à bile ruffa affata gignitur, omnium autem gravissima est ac molestissima quæ à melancholico humore præaffato ac adusto originem habet. præsertim si talis humor multus ac copiosus fuerit. sævissima siquidem & maximè ferina mania ab hoc procedit, quæ & sæpe diuturna ac curationi rebellis evadit, cum qua & frequenter malignos spiritus commisceri contingit. Transit verò mania quandoq. in melancholiam quando videlicet biliosus humor affari de-

2. Quod non solū Christi-
stiani sed & Iulius Fi-
raucus scribit. Agrippa
nullos facilius à demo-
nibus obsideri quam me-
lancholicos.

M

3. *Furiosi non dormiunt propter perpetuā mentis agitationē, qui quum in alia. ex alijs jugiter cogitando transiliant torvè impu lenterque aspiciunt, sicut insomnes dracones. Philostr. l. 2. de vita Apoll. Erga medicum potissimum exacerbari maligni ac lethalis morbi inditium est. Lucian. in abdicatione.*

4. *Non detrahendum donec viderimus sanguinis redundantis signa. sunt qui nullo modo secari volunt. verum hoc probandū non est. quum sanguis una cum pravis humoribus peccet.*

serit. & jam calor deferbuerit, quod quidem quum non multus fuerit vitiosus humor citius accidit, quàm quum copiosus. Differt autem mania, à melancholia accidentium magnitudine & sævitia. nam in mania adest vel multiloquium, vel clamores, motus & jactatio corporis in ordinata, temeraria audacia, aspectus torvus & inverecondus. In melancholia verò metus aut tristitia absque causa, taciturnitas, & quandoque amor solitudinis.

Curatio autē maniae initio quidem quum per se incipit & redundantis signa sanguinis adsint fit per sanguinis è dextri brachij vena detractionē. sed si post diuturnas vigilias, labores, vel inedia supervenerit sanguinis detractioni parcendum erit.

Somnus verò omnibus modis in utroque casu provocandus. deinde & reliqua facienda quæ in curatione capitis doloris à bile, & in

& in curatione phrenitidis dicta sunt.

Quando autem mania aliquandiu duraverit curatione instituenda est qualis in melancholia. de qua suo loco.

5. Mandandum ministris ut eorum errores quodam consensu accipientes corrigant, ne aut omnibus consentiendo augeant furorem eorum visa confirmantes; aut rursum repugnando asperant passionis augmentum; sed inductivè nunc indulgeant consentientes, nunc insinuando corrigant vana, recta demonstrantes. Cael. Aur. l. tædar. c. de Mania.

De Caro.

CAP. 8.

Lea. 17. Orob. 6.

CAROS: five subeth profundus: est sopor cum sensuum & motus cessatione, illæsa permanente respiratione absque febre. in quo à lethargo & cataphora differt. nam Cataphora febrib. supervenit. Lethargus verò febrem habet ab initio conjunctam. Differt verò & ab apoplexi quod respiratio libera sit & non impedita. in apoplexi enim respiratio læditur ac impeditur. deinde per apoplexin membrū aliquod, vel pars

1. Sequitur ut de morbis ex causis frigidis capitis agamus. Quidam & Coma appellant verum generalius. nā Carus coma somnolentum: Catochus vigilans.

2. Atque per hoc à naturali differt. ac sopor quid magis quā somnus videtur. Vnde virg. Tum consanguineus lethi sopor.

3. De qua egimus quum de sympt. febrium agemus.

M 2

4. *Vt quandoque vidi solos oculorum musculos resolutos, vel etiam musculos masseteres.*

5. *Post vigilias ac labores diuturnos. vel in senectute extincto calore naturali cum pulsus parvitate, & est signum lethale.*

6. *Rarum quidem est. vidi tamen & curavi. R.D.*

corporis + resolvitur: in caro verò nulla pars. Differt verò etiā à Catocho quod catocho laborantes oculos habeant apertos, & vigilantib. similes appareant: in Caro verò oculi sunt clausi sicuti dormientium. Accidit autem Carus quandoq; per consensum à vaporibus ad cerebrū perlatis. quandoq; verò propter nimiam cerebri refrigerationem, quæ fit vel citra humorum affluxum, vel cum humorum affluentia. Accidit autem & carus cranio contuso, vel sic percusso ut cerebrum vel meninges lædantur. Supervenit verò & aliquando carus à virium imbecillitate.

Per consensum fit carus veluti ab ebrietate propter vapores ad cerebrum perlatis. aliquando verò propter vermes, ut in pueris, ex humoribus putridis generatos, præsertim frigidis ac pituitosis, unde vapores ad cerebrum crassi ac frigidi perferuntur. Fit 6 verò & non-

nonnunquā carus per consensum mulieribus ex uterō laborantibus.

Refrigeratur autem cerebrum & quidem citra humorum affluxum per narcotica med. vel intro assumpta, vel foris applicata: ut sunt opium, mandragoras, hyosciamus, cicuta, coriandrum recens & similia, quæ intro assumpta gravem soporem adducunt, & similiter cum oleis, unguentis aut cataplas. permixta capiti temporibusque admota. & nonnunquā etiam ex solo & frequenti odore. Potest verò & cerebrū refrigerari à frigido aëre ventoso vel nivoso, 7 vel simili de causa. Quum affluxu autem humorū refrigeratur cerebrum quando ad caput multi pituitosi frigidi humores perferuntur, atq; hinc factus carus facile in lethargum transit. quando videlicet humores putrescunt & febris accedit.

7. *Non statim, sed diuturnitate.*

8. *Veluti si quis frigidam multā aquam frequenter infunderet capiti.*

Ad Carum autē ab ebrietate non prius remedium

Curatio.

M 3

9. Nisi fortè placeat, aut necessum sit, remediū quod *Amphis* apud *Athenæum* probat: nempe tristitiam incutere. ἐξελαύνει γὰρ σφόδρα τὸν λήρη &c. 1. *Dipnosoph.* in fine.

10. Pulsus est magnus, & menses sistuntur.

Lect. 18. Octob. 16.

11. Difficile est enim aliquem excitare antequā concoquatur. Quod exemplo mulieris quam *Mechliniæ* vehementer

adhibendum quam præterierit tempus quo ebrietas solvi solet. atque si tunc patiens nō expergefiat concutiendus & agitandus est, sternutatioque provocanda aliaque facienda quæ infra dicentur.

Si ex vermib. factus carus fuerit adhibenda erunt quæ adversus eos conducunt. excitato tamen prius puero. nisi sint quæ ventriculi regioni vel umbilico admoventur. quæ etiā puero sopore detento applicari possunt.

Ab utero autem si carus factus fuerit adsunt repletionis signa. & facies rubet. ac in isto casu si, quæ ab utero laborantib. adhiberi solent, non profuērint, sanguinem ex vena pedis interiore detrahare multū prodest.

Si ab usu narcoticorum & stupefacientium in carū quis inciderit & tēpus præterierit intra quod narcotica concocta esse potuissent temporibus ac fronti admo-

admovenda erunt exca-
 cientia ut oleum de euphor-
 bio, de castorio, de piperi-
 bus rutaceum, vel simile ali-
 quod. Narib. etiam admo-
 veda odorata calida ut ca-
 lamentum in aceto deco-
 ctum, crocus cum aceto
 acerrimo. Aceti etiam va-
 por ac fumus per nares re-
 ceptus aut attractus mul-
 tum excitat, & somnolen-
 tiam expellit. Excitatur fu-
 mus quādo super laminam
 vel lapidem acetum fundi-
 tur. 12. Sternutatoria quoque
 naribus indenda. Possunt
 theriaca vetus 13, aut mithri-
 datium vetus temporibus
 ad moveri, & naribus illini-
 ri, vel ori infundi dissoluta
 in aqua vitæ aut pulegij. Af-
 figere verò & cucurbitulas
 cum scarificatione hume-
 ris, convenit, non multum
 tamen sanguinem detrahe-
 re, sed loca scarificata ace-
 to & sale abluere ut dolor
 excitetur. Ligaturæ quoque
 dolorosæ conveniunt &
 acres glandes cū salis gem-
 ma suppositæ 14. Quod si
 tortam nullum doloris
 signum dum torqueretur
 edidisse memini, confir-
 mari peto. vehementer
 autē tortā collegi quod
 sanguinem & in urina
 & in fecibus, & vomitu
 rejecisset, quæ si ante
 concoctum narcot. exci-
 tari potuisset doloribus
 excitata fuisset.

12. Quamvis meliora
 fumus aceti & reliqua
 precedentia.

13. In qua vis opij jam
 fermentatione non ita
 elucet.

14. Exactius enim anus
 sentit quam reliqua om-
 nia intestina. Tum si
 mandrogoræ siccus in
 balano suppositus hy-
 pnoti-

*pnoticus est & somnum inducit, quid contrariæ facultatis remediū ano-
submissum dormientem præter naturam excita-
re poterit.*

hoc modo patiens excitari nequeat de vitæ agitur periculo.

Vbi autem excitatus fuerit sunt nonnulli qui putent provocandum esse vomitum ut narcoticum assumptum rejiceretur: vel ad minus enema injiciendum ut deorsum pertrahi posset. sed frustra hoc fit quando tamdiu narcoticum in corpore hæserit, ut concoqui potuerit. quia posteaquam jam concoctum fuerit à natura superatum & evictum nocendi vires amisit. possunt tamen nihilominus exhiberi calefacientia ut vinum generosum¹⁵, piper¹⁶, & compositiones ex pipere, theriaca vetus cum aliquot granis¹⁷ castorij. convenit verò & sinapeos ac nasturtij usus, quæ dantur ut si aliqua mala qualitas à narcoticis relicta fuerit emendetur & corrigatur.

Quod si verò à sola frigidityte cerebri carus supervenerit velut à frigido aëre vel simili causa externa,

15. Præcipuè contra cicutam valet.

16. Maximè contra hyosciamum, papaver & reliqua.

17. Quod præstans ad omnia narcotica remedium.

na, utilis quoque erit calidorum oleorū & unguentorum usus, sed ab aceto abstinendum.

Conveniunt verò & fomenta sicca veluti ex milio¹⁸ & panico in sartagine munda frixis, capiti admotis.

Quādo verò capite multis frig. humoribus impleto carus factus fuerit, ut quam minimū æger dormire permittatur omnino expedit. Corpus vacuandum est, & omnino ijs remedijs utendum quibus in capitis dolore ex frig. humorib. contracto. neque cessandum est à remediorum illorum usu.

A¹⁹ contusione autem cranij carus aut propter vulnera capitis factus requirit ut benè vulneri aut contusioni consulatur. Carus autem hinc factus subesse magnum indicat periculum & meninges cerebri læsas aut cerebrum ipsum sphacelo laborare.

A virium autem debili-

18. Aut ejus loco semen phalaridis vulgo canarij-sæt. his fomentis quendam curavit. R. D.

19. Memini 4. aut 5. sic mortuos leviter vulneratos. ita tamen quod membrana cranium tegens & pars ossis essent læsa; interior enim pars ossis porosa. unde facile frigus penetrat ad interiora.

20. In primis enim accessionibus est morbus acutus ut ait Celsus. nihil tentandum, quod natura tum se colligat.

21. Sic quendam Antverpiæ & quandā Mechliniæ mortuam fuisse vidit Dodon. remedia producant sed non restituant vitam.

tate propter corporis defatigationem ab exercitatione aut vigilijs aut vacuationem aut à morbi comitialis accessione si gravior aut profundior sopor obrepit periculo caret. nam ab exercitationib. aut vigilijs subinde longior somnus succedit. Si verò propter caloris naturalis paucitatem vires debiles fuerint ut valde senibus contingit, tunc gravis sopor imminere vitæ exitum ostendit. neque datur occasio multa tentandi aut faciendi propter virium debilitatem nisi quis velit theriacen cum aqua vitæ rectificata, vel aquam vitæ solam ori infundere, & ex eadem tempora & nares illinire, aut aliquo oleo ex prædictis tempora inungere.

De Lethargo.

CAP. 9.

Lea. 12. Orob. 11.

Lethargus quem Latini Veternum appellant, gravis & altus etiam sopor cum

cum febre, non tamē acuta, sed lenta. Cessant in hac affectione principes animæ functiones imaginatio, ratiocinatio, & memoria. corpus segne est. facies sæpe pallet. extrema refrigerantur. Decubitus est supinus. urina sponte ignorantibus effluit. & quum moriturus est, inquit, Hipp. multum liquidum infernè egerit.

Duplex autem est lethargi origo, ut Archigenes, apud Aëtiū refert. Vel enim septum transversum & viscera malè affecta cerebrū per consensum afficiunt, vel cerebrum primaria affectione laborat. Et incidit quidem primaria affectio vel statim & ab initio, vel ex alterius morbi + mutatione succedit: veluti à phrenitide quando per stupefaciētia medicamēta nimis refrigerati sunt ægrotantes. tunc enim transitus fit ad lethargum. Læditur autem in primaria affectione cerebrum, non quidem

1. Humorib. putrescentibus. non autem putrescit humor in parte principe ut febris non succedat. in parte tamen ignobili potest.

2. Quia significat naturalium facultatū extremam debilitatem.

3. Quomodo hæc distinguenda non reperi, sed curatio ostendit. soli enim sanari videntur qui per consensum laborarunt.

4. Contrarij β. ut ex erysipel. cerebri vel phrenitide. nam si ex caro succedat non est ita periculosum.

5. Nam si ij afficerentur apoplexis fieret.

secundum ventriculos, sed secundum suam propriam substantiam, & quidem cerebri pars ⁶ anterior.

6. Non omnes consentiunt. verum quum in eo consentiant quod med. omnia fronti sint adhibenda & anteriora affici concedant oportet. Vidi præterea lethargicam cui cum caput post mortem dissectum esset anterior cerebri pars erat corrupta. R. Dodon.

Origo autem ejus quando ab initio invasit ex frig. hum. pituitoso est humore corrupto ac putrescente. Avicenna ⁷ tumorem esse vult œdematis & partim inflammationis naturam referentem .i. esse œdema phlegmonodes ex pituita parte plurima, & sanguine collectum.

7. Verum non probatur omnib. quia videtur sensisse non posse humores nisi in tumore putrescere. tamen contrarium in tabidis quibus sine tumore putrescit, videmus. concedi tum hoc Avic. potest quum non faciat ad curationem.

De lethargo autem per consensum facto videtur scripsisse Hipp. in lib. de Coacis prænotionib. Quicunque ait, ex lethargicis ⁸ servantur plerunque pectore suppurati fiunt. nam idcirco suppurati fiunt quod circa septum transversum & præcordia affectio constitit.

8. Eosque solos curari videtur indicare. ac si ex

humida peripneumonia fiat paucam spem superesse ait Hipp. nisi suppurati fiant. multò minus igitur in primaria affectione.

Gravis autem & acutus

• morb.

9. morb. lethargus est. nam, ut Hipp. in lib. de morb. Lethargicus in 7. diebus moritur, si verò hos effugerit, sanus evadit. lethalis autem & quidem citissimè est qui ex alterius morbi permutatione per stupefactionem ac nimium refrigerium factus est.

Quando igitur lethargus non ex alterius morbi permutatione successit, sed per se incepta tentanda erit curatio¹⁰, per venæ sectionem si vires permittant. sunt & injicienda acria enemata¹¹ in quibus hiera diacolocyn vel similes compositiones addendæ. Cucurbitulæ etiā humeris ac lumbis admoveendæ & sanguis extrahendus. Frons & tempora oleis calefacientibus ungenda sunt ut in caro à narcoticis facto, vel cum oxyrhodino¹² addito castoreo. castoreum verò & naribus admoveendum. idem quoque strandum. valde autem commodat castoreum in hoc casu.

9. Gal. 1. epid. sect. 3. in fine; in definit. Cæl. Aurel. & Herod. itaque in l. qui Medic. inscribitur, quum inter chronicos recenset Lethargum voce hac improprie est usus. Magis plus Lethargici quam phrenitici periclitantur. nam phrenitici plus gravati lethargicos faciunt: lethargici verò relevati in phreniticos revocantur. Theod. Priscian. 2. logici. c. 3. Ut lethargicus quum sit pugil, & medicum urget.

10. Propter morbi magnitudinem, febrem, & quod nulla vacuatio promptius tollat humorem peccantem.

11. Non semel, sed sæpe. ad revulsionem. non enim fit nisi ex multitudine humorum.

12. Paulus tostum vult admoveeri quod tenuius ita reddatur ad penetrationem.

ita reddatur ad penetrationem.

ori, si fieri potuerit, infundendum cum aqua pulegij; vel sinapeos semen tritum cum melle.

13. *Phenigmus, qui ex alto trahit humores.*

14. *Incidit ac attenuat crassos ac frig. humores.*

15. *Ob humorem multum. & morbum brevem. ptisana frigidior quam ut hic conveniat.*

16. *Satis calidum & expurgat pectus.*

17. *Motus animi in avaris per affusionem nummorum, ut Horat. refert. aut corporis, ut ab icrib. à phrenitico illatis, de quo versus in Anthologico extant, convenit.*

Itis non proficientib. piluli capitis abradendi erunt. & applicanda calida fomenta ex milio & sale, vel cataplasma¹³ ex stercore columbino cum oleo rutaceo aut simili aliquo. aut cataplasma ex euphorbio, castoreo, pipere, semine rutæ, semine sinapeos cum eodem aut simili oleo. Si æger assumere aliquid potuerit detur ei¹⁴ oxymeli per se vel cum oxymelite scyllitico.

Parcè autem ac modicè cibandus¹⁵ est. & sufficit jus pulli gallinacei in quo rosmarinus, thymus, hyssopus vel similes herbæ incoqui poterunt. Si ad sanitatem morbus inclinaverit largius cibandus erit, & pro potu¹⁶ hydromeli exhibendum¹⁷.

De

REMBERTI DODONÆI,
De Carcho.

191

CAP. 10.

Lect. 20. Octob. 13.

Caro aut lethargo similis esset: catochus nisi oculi non clausi sed aperti permanerent qua de causa & coma vigilans dicitur; à nonnullis etiam Catalepsis sive deprehensio. in ea enim qua apprehensus est figura æger permanet, nullâ corporis partem movens. hac enim affectione correpti: motu & sensu privantur. interrogati non respondent. palpebras habent apertas, oculos fixos, & penitus immobiles, sic ut & admota manu non claudantur. subito autem invadit & quandoque in febrium intermissionum accessionibus, ut in 3. anis non exquisitis.

Quandoq; verò sine febre apprehendit & per se incipit. Periculosus est morbus, & quàm lethargus, ut inquit Aëtius, periculosior.

Causa, ut idem Aëtius ait, sanguinis est multitudo confertim caput occupans

1. Non tam rarus est affectus quam lethargus aut carus.

2. Est enim Imaginatrix veluti quædam paralysis. l. de differ. symptom. Condiscipulus tamen ille Gal. cujus sect. 2. Prorhet. 1. aph. 59. meminit obscure se audire correptum dicebat. quorundam meminerat. sed nec linguam, nec ullam aliam partem movere poterat.

3. Quia subito ventriculi cerebri posteriores humore aut vapore implentur.

4. Ut in adolescente illo qui à triduo paroxysmo hæmorrhagia succedente liberatus est.

5. *Quod aliquo modo vigilare videantur. vigiliæ autem ex siccitate.*

6. *Quod inde liquet quia nullorū meminerunt quæ circa ipsos facta sunt. Catochus enim condiscipuli Galen. fortè minoris vehementiæ fuit.*

& ipsum superimplens. Paulus causam ad pituitam refert, bilem ipsam superantem, & ad humorem frigidiorē & sicciorē quam is sit ex quo carus oritur. & quando ab hujuscemodi humore posterior cerebri ventriculus obstruitur ubi memoriae sedes, tunc catochum excitari ait. non fit tamē ex pituita sola, sed etiā ex pituita sanguini permixta. neque etiam semper ab humore, sed quandoque ab ipsis vaporibus eo perlatis. atque ita in febribus fieri contingit, in quib. tempore accessionis vel paulo post catochus supervenit & una cum declinatione desinit.

Quando igitur catochus una cum febris accessione apprehendit pulsus sæpe numero parvi & languidi sunt. Durante autem ipsa accessione frictiones, ligaturæ & similes diversiones faciendæ sunt. ab alijs verò remedijs donec febris accessio præterierit abstinendum.

Die

Die verò intermissionis præsentibus plenitudinis & sanguinis redundantis signis, sanguis mox detrahendus erit, vel illis non apparentibus. purgans medicamentum exhibendum quod pituitosos expurgat humores, neque ab alterutro remed. cessandum. nam si subsequente accessione catochus iterum redierit valde lethale habendum. non posse enim naturam, per febrem præsertim debilitatam, hujus affectionis vim bis sustinere apparet.

Vacuationibus factis reliqua curatio instituenda quam febris cui supervenit postulabit.

Quod si verò citra febrem catochus subito aliquè invaserit corpore existente repleto, vel non omnino extenuato, mox sanguis pro viriù robore educendus erit citra cessationem.

Deinde acria enemata injicienda. & ubi æger ad se redierit humores præpa-

7. Quod facile animadvertitur. nam 1. accessione non invadit sed quando sibi jam quandoque restituti videntur post hebdomadas duas aut tres.

N

randi & amplius vacuandi sunt & victus ratio instituenda, veluti in curatione doloris & gravedinis capitis à frig. humoribus.

Si autem Catochus citra febrem supervenerit macilento alicui gracili & extenuato, præsertim seni, aut decrepito, sola sufficiunt quæ caput calfacere & calidis vaporibus implere & frigidos discutere queant. ut sunt aqua vitæ rectificata & deficiente illa aqua lavendulæ vel pulegij cū the-

3. *Qui multum facit ad confortationē capitis.* riacæ veteri aut^r croco, aut simili aliquo.

De Memoria læsa.

CAP. II.

Lea. 21. Octob. 14.

1. Morbi de quibus jam dictum circa cogitatricem ac imaginatricem memoriae partē fuerunt.

Sequitur is qui circa memoriam. Non aliud æquè fragile in homine quam memoria morborum, & casus injuriarum, atque etiam metus sentiens, alias particulatim, alias universa. ictus lapide oblitus est literas tantū. Plin. l. 7. c. 20. Valer. maxim. l. 1. c. 6. Messala Corvinus post morbum proprii nominis oblivione percussus est. Solin. c. 6.

ram

rum quæ sibi antea nota fuerunt. Accidit autem hoc dupliciter, vel enim per se nullo alio morbo præsentē, vel aliquando cum aliqua alia affectione, ut cataphora, catochō, caro, phrenitide, apoplexia, morbo comitiali, vel simili.

Vbi igitur memoria perijt vel insigniter læsa est nullius alterius morbi occasione frigida cerebri intemperies in causa est, ut Galenus ait.

Fit autem quandoque ut per solam intemperiem frigidam memoria lædatur: aliquando verò simul adsit, vel humiditas* vel siccitas. Humiditatē simul cum frigida intemperie cerebri adesse ostendit somnolentia, & profundi ac longi somni. præsertim si multi per nares, ac os humores ex capite defluant. Siccitatem ostendunt vigiliæ, somni & excrementorum paucitas†.

Læditur autem cerebrum & quidem posterior ejus

2. *Eratolai filio dysenterico hujusmodi oblivio oborta est ut eadē paulo interposito spatio iterum percontaretur, seq; desidere nisi admonitus oblivisceretur. Ipse autē sibi conscius erat hujus affectionis, neque ignorabat.* 7. *Epidem. Hipp.*

* *Premiū sumunt ebrietatis rerū omnium oblivio, morsque memoria.* *Plin. l. 14. c. 22.*

3. *Non est tamē signum πηλογρωμωινῶν. nam ἔ* ab imbecillitate cerebri proveniunt, ut in senibus.

4. *Tum causæ siccantes, ut labor, vigiliæ literariæ, tenuis victus.* *Gal. 3. de loc. aff.*

N 2

pars. per proprium corpus,
ut Gal. ait, non autem ven-
tricus ipsius.

5. In his autem maximè
remediorum occasio est.

6. Aëtius utitur biera
Ruffi. utuntur & alijs
verum cum vel scammo-
neam vel colocynthida
recipiunt libenter ab ijs
abstinemus.

7. Quod duplici ratio-
ne confert. qualitatis
videlicet calidioris, &
quod capitis humores
tanquam apophlegma-
tismus expurget. Utun-
tur & pœonia quam ca-
piti proprietate prodes-
se experientia docet.

8. Nullam enim habet
qualitatē. Vtlo quidam
utuntur, at tum non nisi
resiccando convenire
poterit. etenim proprie-
tatem amittit.

9. Ac potissimum futura
lambdoidi.

Vbi igitur propter frig.
& humiditatem, memoria
læsa est redundantes humo-
res vacuandi sunt ad quod
conducunt pillulæ ex hie-
ra cum agarico vel his for-
tiores cochia vel aureæ, &
ea quæ in dolore capitis à
causa frigida ac humida di-
cta sunt.

Exhibenda quoque om-
nia quæ excalfaciunt ac re-
siccant: ut majorana, stœ-
chas, betonica, rosmari-
nus, & ex his conservæ.
item & cubebæ, cardamo-
mum, pyretrum. quæ & in
ore sumi ac mandi possunt.
Ex compositis laudantur
elect. pleris, diamuscum,
diaambra, & Arabum con-
fectio anacardina. Aëtius
eboris ramenta memoriæ
opitulari tradit. profunt au-
tem non qualitate, sed sub-
stantiæ suæ proprietate.

Iam & capitis posteriori
parti & calida, admoven-
da sunt ut ol. ex castoreo,
ol.

ol. laurinū & similia. Æstate, inquit Aëtius, oleum per se¹⁰ calidum: hyeme irinum cum aceto. aliquando serpillio vel calamintha in ipso decoctis.

10. Maturum tamen sit, non omotribes. hoc subviride, illud magis flavum est.

Victus rationem cal. quoque & siccam esse oportet. Ab oleribus fructibus præsertim crudis omnino abstinendum. item à caseo & lacte & ab omnibus quæ crassum succum¹¹ ingenerant, & flatus gignunt, ut sunt legumina. Vinum utile est tenue & album, mediocris ætatis, moderatè sumptum. nā nimium sumptum caput implet & humectat.

11. Qualia omnia opera quæ à lacte conficiuntur.

Quando verò propter solam frig. vel siccitatem simul memoriæ detrimentum factum est: veluti post labores, vigilias, vacuationes immodicas, aut post affectionem aliquam cerebri frigidā, reficiente diætā¹² uti, inquit Aëtius, convenit. neque aliud curiosius agendum. viribus enim reparatis memoria restituitur.

12. Ut sunt ora, & generosum vinum, quale malvaticū quod aliquibus senibus aliquando consului ut his manè uterentur qui senectutis frigiditatē istis temperari quodammodo senserunt. R.D.

Eodem modo si propter senectutē memoriæ offensam sola conveniente diætā contentum esse oportet.

13. *Neceſſe eſt ut hoc fiat ex influxu humorum in ventriculos. qui ſi poſt ad principia nervorum decumbāt, epilepſia oritur.*

Quibus autem ſubitò, addit Aëtius, & derepente ¹³ memoria deficit in his comitalem ſucceſſurum morbum, vel resolutionem timere oportet vel omnino aliquod magnum malum.

De Melancholia.

Lea. 22. Octob. 17.

CAP. 12.

1. Melancholiæ participes fuere viri clari ut Hercules, Bellerophon, Empedocles qui ſe in Æthnam præcipitavit. deniq. Socrates, & Plato abſque atra bile non fuere. Volater. At hæc illa Mania eſt. Σεῖξ δὲ οὐδὲ δίδομεν, per quam optima quæque nobis contingunt. Plato in Phædra.

Melancholia : à cauſa efficiente nomen accepit ab humore videlicet melancholico. Delirij eſt ſpecies abſque feбри cum metu & mæſtitia. melancholicī ſiquidem frequenter abſq; cauſa mæſti ſunt. hominum conſortia quandoque etiam vitant. timent & vix ullo tempore metus illos deferit. non eſt tamen omnibus idem modus. ſunt etenim & qui non metu, ſed & alia quadam imaginatione

natione detineantur. Depravatur autem per hanc affectionem imaginatio. ratiocinatio verò & memoria non læduntur.

Accidit autem melancholia uno modo, cerebro per essentiam sive primario affecto: alio modo per consensum cerebro laborante. idque dupliciter. vel enim à toto corpore venis scilicet sanguine melancholico plenis, vel ab hypochondrijs malè affectis, quæ flatuosa & hypochondriaca melancholia dicitur.

A toto corpore melancholiam fieri ostendit habitus corporis macer extenuatus & hirsutus, venæ latæ. præsertim si accesserit victus ratio crassum & melancholicum sanguinem ingeneras. deinde & sollicitudines, mærores, vigiliæ, hæmorrhoidum ac mensium suppressiones. Hypochondriacā verò melancholiam præter metum & tristitiam testantur cruditates, aciditæ, flatu, ventriculi do-

2. *Vt qui cimices per aures irrepisse, ac copiosa prole auctos, totum sub cute, habitum occupare, ingentesque species. sibi molestias faceßere, cõquereretur. Plerumque tamen deliria ista avaritiam, aut superbiam conjunctam habet, ut in illo juvene qui Regina nuptias, somniabat.*

Melancholia
fit vel

{ A toto corpore.
Per cõsensum
Ab hypochondrijs.
Primaria cerebri affectione.

N 4

lores, & quandoque in hypochondrijs ardores, & circa splenē tumores. quum verò neque circa ventriculum aut hypochondria prædictorum aliquod apparuerit, neque redundantis in toto corpore sanguinis melancholici adsunt signa, metu tamē & tristitia æger torqueatur cerebrum primariò affici existimandum erit.

Lect. 23. Octob. 18.

I. A. Corpore toto.

3. *Facce sanguinis, vel humore ex adustione nato.*

4. *Sic scribunt autores. id tamē vix fieri potest. & tam ijs quos primò invaserat melancholia, quam illis quos post maniam adoriretur, omnibus atrum fluere sanguinem animadvertit. R. Dodon.*

Si itaq; melancholia fiat ab atro humore in toto corpore redundante sanguis ex sinistri brachij vena media detrahendus est. & si quidem valde niger fluxit copiosus. si autem pulcher & rubicundus, non multus.

Si verò atrii sanguinis copiosam vacationem æger nō sustinuerit una vice, post aliquot dies, aut post purgationem, sanguinis detractionio iteranda erit. Misso sanguine exhibenda sunt quæ humores ad purgationem idoneos reddant, quæ ex differentibus facultatib. permista esse convenit, ita ut

ut quædam sint quæ crassos humores attenuare queât, alia quæ siccitatem eorum contemperent, & cordi profint. Attenuantia sunt cort. rad. capparorum, cortices tamaricis, fraxini, & rad. mori. chamædrys, thymum, epithymum, asplenium sive cæterah, adiantum, polypodium.

Contemperantia verò sunt fumus terræ, borago, buglossum, violæ, succus pomorum dulcium, & hujusmodi ex quibus vel syr. vel decocta parari possunt. Decoctis addendi sunt syr. ut de epithymo, fumo terræ, buglossio, vel de pomis Mezuæ.

Præparatis humorib. exhibenda sunt quæ ipsos expurgent, ut folia senæ, epithymum, & quod efficacis-

polypodij, cort. rad. fœniculi, cort. rad. cappar. ana ℥ 2. passul. glycyrb. ana ℥ 2. s. anisi ℥ 1. chamæd. beton. melissæ ana p. 1. flor. comm. p. β. veratri nigri ℥ 2. misce. f. omnium ad ℥ 3. decoctio. adde succi pom. dulc. ℥ 2. in quib. infunde senæ, epith. ℥ 2. syr. de epith. & bugl. ana ℥ β misce. f. haustus.

5. Ne ex incidentibus quæ calida valde, adurantur & ex humore atro naturali, in non naturalem, & ægro damnum majus inferatur.

6. Quia raro aut nunquam fit melancholia absq; communitate cordis.

7. Dioscor videtur florem thymi sic appellare, recepta tamen pro hac cassutha quæ thymo innascitur.

8. Quidam destillata aqua utuntur quæ vim non habet nisi novo modo ut aqua vitæ, tubis per aquam frig. transfuentibus destilletur.

9. Decoctio purgans in melancholia. ℞. Rad.

10. Credo cum imitatione Tralliani nitrum intelligi voluisse.

11. Nitri loco sumendus sal gemmæ. non sal petreæ. A compos. alcermes & omnibus lap. lazuli habentibus quod valdè venenosus sit lapis lazuli nisi sæpe abluatur, libenter abstinemus. Quidam quum frequenter hac uteretur pro cordiali, tandè in morbum incidit. ex qua mortuo effluxit sanguis multus putridus. quod si corpus apertum fuisset sine dubio viscera corrupta fuissent inventa. quum enim in pauca quantitate uteretur non potuit hinc purgari. at si pro cordiali uti quis velit omittat lazuli lap.

12. Ad cujus imitationem syr. hunc composui quem utilem inveni. Rec. rad. bugl. asparagi, rusci ana \mathfrak{z} β . chamædryos, cuscute, hepatorij vulgaris, melissæ ana manipulum semis. cort. myrobal. indorū \mathfrak{z} β . senæ, epithymi ana \mathfrak{z} 1. vel β . veratri nigri \mathfrak{z} β . seminis anisi \mathfrak{z} 1. passularum \mathfrak{z} 1. f. decoctio ad \mathfrak{v} 1. colato addantur succi pomorum dulc. \mathfrak{z} 4. sacc. 12. & si. syr. R. D.

simum veratrum nigrū. Ex compos. confect. hamech diasen. pill. de fumo terræ, pill. indæ, præsertim quæ sunt descriptæ à Guilhelmo de saliceto quæ recip. aloes \mathfrak{z} 1. agarici \mathfrak{z} 2. salis indi¹⁰ aut gemmæ ejus loco \mathfrak{z} β veratri nigri \mathfrak{z} 1.

Commendantur & pill. de¹¹ nitro Alexandri præsertim ab ipso descriptæ in cap. de cura quartanæ. Repetere autem hujuscemodi purgantia subinde, utile est. Medio tempore poterunt exhiberi quæ cordi profunt & ad hilaritatem faciunt: ut sunt elect. de gemmis, elect. lætificās, aut diamar gariton vel simile aliquod. aut syr. supradicti dandi sunt, vel syr. de pomis regis¹². Saporis qui omnibus

præ-

præferendus alijs est. cui si veratrum nigrum addatur multo erit futurus efficacior.

Post purgationes factas balneo aquæ dulcis utendum in quo malva & violæ, & flores chamæmeli incoqui poterunt.

Hæmorrhoides si fluere desierint conandum est ut iterū fluant vel sanguisugæ ipsis sunt admovendæ. Menses etiam præter naturam suppressos provocare refert. non tamen per assumenda ¹², sed potius per externa remedia ut balnea, fœtus, olea vel emplastra.

Originem habet melancholia hypochondriaca ab atro humore circa ventriculum, mesenterium, hypochond. & lienem ¹³ ut plu-

12. Etenim valde calida qualia sunt quæ provocant menses, metus est ne adurant humores.

Lect. 24. Octob. 20.

11. Hypochondriaca.

13. Imò, secundum Arabes, etiam hepar atque

uterum. Non in venis. In flatibus autem ratione caloris naturalis intumescis quamvis effusus foras non fermenti modo radat terram ut adusta melancholia. maximè autem flatu excitat quando adest pituita unde in quibusdam locis palpitatione fit.

rimum consistentem, ubi collectus non modo cruditates aut flatus excitat, sed & vapores melancholicos procreat qui ad cerebrum transmissi imaginationem lædunt ac depravant. Non est autem hæc melancholia adeo vehemens ut aliæ, sed mitior, & quæ per certa intervalla remittitur.

Qui hac affectione laborant vacuatione opus habet, sanguinis missio non¹⁴ requiritur, nisi vel mensium retentio, vel hæmorrhoidum adsit suppressio,¹⁵ vel omnino corpus sanguine redundet, vel lien inflammatione minetur, sed purgantia medicamenta exhibenda sunt. Habita tamē ventriculi ratione. quia in hac affectione sæpe cruditate laborant. idcirco à fortibus initio medicamentis abstinendum, & senna, epithymo, polypodio & similibus contentum esse oportet.¹⁶ utilis verò & aloës usus,¹⁷ etiam singulis diebus in exigua quantitate sumptæ.

14. *Quia humor peccans in venis non continetur.*

15. *Quia circa hypoch. herere solet regurgitans sanguis.*

16. *A cassia & ea quæ cassiam habent (nisi confectioe hamech quæ paucam recipit) abstinendum quod & ventriculum perturbet & flatus augeat.*

17. *Vel in satis magna quantitate ut purget: vel in minima ut tantum sit emulsiōis.*

sumptæ. facit enim ad alvi dejectionem quam utile est non astrictam esse. ventriculum non perturbat. sed magis corroborat. hæmorrhoides aperit, menses provocat. ex hac formata pill. leviores exhiberi possunt. Perseverante malo & non proficientibus istis ad fortiora transeundum qualia supra dicta sunt.

Exhibere & quandoque ad humorum præparationem syr. expedit. inter quos de epithymo reliquis præstat.

Exhibenda verò & quæ ventriculi concoctionem adjuvèt & flatus discutiant ut diatrion pipereon, diagalanges, vel aromaticum rosatum pro delicatis. tum & ipsum piper per se in cibo sumptum.

18. *Paulus exhibet absinthium ratione ventriculi sed non admodum rectè. nam crudi humores eo non perducuntur ad concoctionem; quin magis astrictione in ventriculo retinentur, bilem tamen abstergit.*

Vsus quoque seminis anisi, ammios, carvi, & similia etiam à cibo non est improbandus. Ventriculo verò & hypochondrijs externis quoq; remedijs providendum. veluti fomento

19. *Solum ad roborationem. reliqua ad flatus discutiendos.*

20. *Simul mixtus.*

21. *Dissolvit.*

22. *Mollificat.*

23. *Vnguent. spleniticum. & Olei liliorum*

3 1. *ammoni-
aci dissolu-
ti in aceto &
ad spissitudi-
nem cocti 3 1. β. cere.
qu. s. f. ung. molle.*

24. *Quia non potest esse
magnus morbus, nisi &
reliquum corpus afficia-
tur.*

ex ruta, anetho, 19 absyn-
thio, pulegio, origano, me-
lissa, sem. anisi, cumini, in
sacculo confutis qui deinde
in aqua decoctus ventricu-
lo & hypochondrijs calens
est admovendus. Possunt
verò & hæc in oleo deco-
qui cum quo ventriculus &
hypoch. ungenda. Ventri-
culus etiā seorsim ungi po-
terit oleo nardino, 20 & de
absinthio: Sinistrum verò
hypochondrion, si lien tu-
meat, oleo 21 capparorum,
22 liliorum, addito 23 ammo-
niaco vel ex ammoniaco
emplast. admoveri.

Quando verò melan-
cholia cerebrum primariò
& per essentiam afficitur
initiò non 24 medicamen-
tis, sed idonea & nonnihil
humectante victus ratione
curatio instituenda. & pau-
cis externis remedijs. ut in-
unctione frontis & tempo-
rum ex oleo violarum vel
nenupharino si somnus non
succedat. Sed ubi diutur-
nior facta fuerit hæc melā-
cholia ad majora remedia

ve-

veniendum est. & talia qualia quando ex toto corpore melancholia procedit, & crebro balneis, utendum est.

Ad melancholiam verò & referenda quam Paulus ²⁵ Lycanthropiā vocat quæ ex humore melancholico in toto corpore redundante originem habet. fugiunt qui hac laborant hominum consuetudinem. tenebras amant. circa monimenta mortuorum libenter versantur. Curandi autem hi sunt veluti qui melanch. totius corporis vitio laborant.

Lycanthropia.

²⁵. Nihil nisi intensa melancholia est. Apud Marcellū & Cynanthropia inter Melancolia species recensetur.

²⁶. Plin. videtur Faunorum in quiete ludibria appellasse. l. 25. c. 4. & nocturnam lymphationem. l. 34. c. 15. Pnigastionem Themison. quidam veteres Ephialten, vel Epibolen. Neque Deum, neque semideū, sed Epilepsie tentationem, h. e. præludium Soran. probavit. Cæl. Aur. Babuycarius posterioribus Græcis. Suyd.

²⁷. Sæpe contingit in puerperis si non benè à crassis succis purgatæ fuerint post partum.

²⁸. Atque

huic quum vitiata sit imaginatio ad melancholiam tanquam genus referendum, quum in hac lædi imaginatiōnem in definitione dictum sit.

& subinde voluisse clamare ac non potuisse sibi videntur. & tanta quidem est hujuscemodi falsa imaginatio ut expergefacti præ sudore madidi quandoque repariantur. Causa sunt crassi & melancholici humores pituita subinde admixta*.

*Quæ ex ciborum repletionē, & cruditatib. in caput effertur anathy-miasis, Ephialtes dicitur. Suyd. Prognosis.

29. Herculem quod melancholiæ particeps esset, sacro morbo obnoxium fuisse dicit Volateran. Non raro admodum hoc fit. est autem comitialis gravior incurabilis si post 24. annū incidat. fit autē si tamdiu remaneat morbus donec cerebri ventriculi in quib. comitialis, corrumpantur.

30. Hoc quomodo fieri poterit non video nisi in morbo comitiali puerorū mutatione ætatis, temporū &c. Vnum habui sub manib. melancholicum qui in pueritia comitiali dicebatur laborasse. R.D. 31. Capitis sensum, aut motum auferentem.

Curatio verò hujus etiam veluti melancholiæ à toto corpore.

Melancholia autem sæpe in morbum transit comitalem 1º quod Hipp. 6. epid. affirmat: Melancholici, inquit, magna ex parte morbo comitali afficiuntur. & è contrà morbo comitali 3º laborantes fiunt melācholici. Incub. etiam, si sæpe & continuò accidat morbum aliquem magnum 31 superventurum præfagit. vel apoplexiam β. vel comitalem morbū, vel maniam, autore Paulo.

Me-

Melancholici autem in tenebris aut loco obscuro non sunt continendi, nec in solitudine relinquendi³², sed inter amicos versari eos convenit, & omni decenti animi recreatione delectari: ut cantibus, instrumentis musicis, fabulis. ad deambulationes deducendi sunt per loca amœna. ad ludos quoque & spectacula ludicra & ad gaudia & hilaritatem omnibus modis excitandi³³. & ita quoque cum ijs agendū qui nimio amoris affectu languent. Victus sit ex optimis cibis. Vitanda sunt sale aut fumo durata. caro item bubula, cervina, aprina. pisces in cœno viventes. legumina omnia & inter olera maximè fugienda est brassica. Caro autē vervecina, caponum, gallinarum, & omnium volucrum quæ non circa aquas versantur, commendatur. & præstat subinde magis elixis uti quam assis.

Inter olera buglossum, borago, lactuca, cichorium.

32. *Helenam Ægyptijs medicamentis in crate mixtis, h.e. philosophicis sermonib. quos in Ægypto vino interpositis, mœstitiā discutere solitam vetustas credit. Philostr. 7. de vita Apollonij. Iræ tristitiæque remedium etiamnum reperiri apud Diospoliticis solos, testatur Diodor. Sicul. l. 1.*

33. *Expedit quandoque ut decipiantur. sic quidam costam sibi confractam imaginabatur. cui exhibita purgatione ac in excrementis costæ bovis aut alterius animalis confracta reposita, quæ se excreasse eam opinaretur, à morbo melius dein habuit.*

34. *Sic etiam cerevisia tenuis convenit.*

non reprobantur. Fructus crudi nō admittuntur. Vvæ passæ non sunt inutiles. Vinum album & tenue³⁴ conducit. rubrum & crassum non probatur. multo minus mustum. Sic neque etiam cerevisia potens & crassa.

In vigilia & somno modus servandus. Curæ & sollicitudines omnes excutienda.

De Comitiali morbo.

CAP. 13.

Leſt. 26. Oſob. 24.

1. ἰερον νόσημα, ἡερακλείον νόσημα ob difficultatem dicitur. item ἐπιληψία quod subito apprehendat: vel quod sensum atq; mentem pariter apprehendat. Cælius Aur. Sacer, quod divinitus immitatur, seu quod sacram animam; vel sacrum templū partis anime in corpore dominantis, contaminet; sive ob magnitudinem passionis. Cæl. Aurel. Vide Apulejum 2. apolog. 2. Contagiosum vetustas credidit. hinc illum despuebant, h.e. contagia regerebant. Plin. Eo laborantes fugiebant. Horat. & ne familiam inficerent rus ablegabant. Apul. 1. apolog.

COMITIALIS: morbus si-
ve epilepsia est universi corporis convulsio cū principū operationum læsione ac oppressione, sed nō diuturna, in quo à reliquis convulsionum generibus differt². Contingit autem hic

mor-

morbus frequentissimè ipso cerebro primario laborante & in ipso affectu consistente. interdum verò ab ore ventriculi cerebro per consensum laborante. fit etiam sed rarò, ut Gal. ait, morbi comitalis species quum à parte aliqua (cui id fortè accidit) incipit affectus, qui sentiente ægro ad cerebrum usque ascendit. Causa primariæ affectionis est humor pituitosus⁴, vel multus vel crassus. interdum verò crassus melancholicus. quales si in⁶ meatibus ventriculorum cerebri sive is medius, sive postremus sit, retineantur, comitalem morbum efficere solere Gal. testatur.

⁷ Primario autem cerebrum affici cognoscitur quando non propter oris ventriculi sensibilitatem, aut non propter alicujus partis magnum dolorē vel non ab aliqua parte vaporosus spiritus ascendere sentitur.

Corripiuntur autem hoc

3. Sic ab uteri suffocatione comitalem ortum vidit. R. Dodon. Ego etiam in parturientibus. Vide Cæl. Aurel. l. 1. Tard. c. 4.

4. Ad quem semper refert Hipp.

5. Ad quos etiam refert Gal. & Plato in Timæo.

6. Ab uno ventriculo ad alium.

7. Qui comitali vitio solent corripi jam adventare valetudinem intelligunt si calor summa deseruit, & incertum

lumen nervorumque trepidatio est. si memoria sublabitur, caputq; versatur. Seneca de ira. c.

10. Splendores instar iridis oculis obversantur, odorem fædum sentiunt, aures sonant, bilis præter rationem accenditur. Aretæus, l. 1. c. 5.

8. Hinc puerilis passio dicitur. Cael. Aurel.

9. Aetatis melioribus & pulchrioribus viget. cum aetatis flore sepe evanescit; sed & tum abiens, quasi pulchritudinis invidia quosdam deformat, aut manum inutilem reddens, aut faciem torquens, aut sensum aliquē auferens, quod apud Aretæum repertum in praxi verum esse aliquoties vidimus.

10. Potissimum tamē illi quibus cerebri sensus exactior; ut maximi quique hanc passi sint Livius Drusus, Iul. Cesar alijque. Mahumeth fortē arreptitius, h.e. Deo plenus videri voluit. De Carolo 5. hostis Galli commentum puto.

11. Ut ex Lunæ radijs. quos Anthyllus medicus apud Stobæu. serm. 100. dicit καρηθαρειας & ὑπληψίας ἀνακινεῖν quod humidius reddent cerebrum. idem etiam Gordonius asserit.

12. Quia oportet causam esse magnam quæ cerebrum jam per aetatem siccius humectarit. Quod si familie propria, non ætas, non medicus discutere illam valeat. Pallad. 6. epid. s. 1. aph. 4.

morbo facillimè pueri. deinde adolescentes ac juvenes. rarius ætate majores. Pueris autē planè infantibus à naturali intemperie hic provenit, quādo cerebrum valde humidum est. definit verò in his cito ac facilè ætatis conversione. sed qui in ætate aliquousq; progressa vexare inceperit ob peccata in victus ratione commissa, vel aliam quampiam causam externam exortus est. atque in his ætatis conversionem expectare non convenit, sed morbosum affectum discutere & idonea adhibere remedia priusquam invalescat. Gal. quoque autore. Qui autem in majore ætate supervenit & post 25. annum ferè ad mortem usque comitatur,

nām,

nam, ut Hipp. quibuscunq;
morbi comitiales ante pu-
bertatem fiunt, mutatio-
nem accipiunt: quibuscun-
que autem in 25. commo-
riuntur. Quicunque verò
senes apprehendi incipiunt
maxime¹³ moriuntur.

Gravissimus autē & dif-
ficillimus est morbus qui
à capite oritur & cerebro
primaria affectione labo-
rante. qui verò ab alia par-
te veluti¹⁴ à ventriculo, aut
à manu, aut à pede initium
sumunt maximè sanari pos-
sunt. ¹⁵ Quum autem pri-
mum morbus iste aliquem
apprehēdit acutus & mag-
nus est, & subinde diutur-
nam habet accessionem,
nec cito ad se homo redit.
quando autem frequentius
invadit minus gravis est &
accessionem minus diutur-
nam habet.

Curatio.

Si ¹⁶ itaque puer recens

*Amphiarai. Plutarch. in Hallenic. Menecrates qui se pro
Iove gerebat, quos à sacro curabat morbo variorum deo-
rum habitu circumducebat. Athenæus. l. 7.*

^{13.} Aut aliqua parte le-
viter syderati fiunt. aut
si non moriantur cito li-
berabuntur.

^{14.} Ac talem in qua-
dragenarijs quandoque
curavi. R. Dodon.

^{15.} Ita ut quandoque
per triduum jaceant. ac
quandoque diu manent
in sopore seu caro solu-
ta convulsione. fit au-
tem hoc ob magnitudi-
nem causæ quæ sanū an-
te hac potuerit afficere.

^{16.} Elafij dicebantur
qui hunc propulsarent,

Lect. 27. Argis. erant

Octob. 25. autem ex
posteris Alexidis filie

natus hoc morbo corripia-
tur nulla opus est curatio-
ne. spes etenim est æta-
tis mutatione cessaturum.
interim radix pæoniæ collo
appendi potest, quæ pueris
gestata maxime prodest.

17. In Oasi non solum
nulli comitali morbo
corripiuntur; sed & qui
aliunde illuc veniunt, ab
illo morbo liberantur;
propter aeris maximam
tēperiem. Olympiodor.
apud Photium in biblio-
theca. Belgio nostro
contrà frequens; quod
frigida humidaque re-
gio sit, quam auster,
ventus minimè salubris
perpetuò afflat. Læm. l.
2. c. 3. Adde quod cibus
crassi succi ut plurimum
utamur.

Quod si verò alicui ma-
joris ætatis morbus hic su-
pervenerit cura & diligen-
tia major requiritur. ad
aërem calidiorem & sic-
ciorem perducendi sunt &
ad exercitia & labores, je-
juno corpore. In victus ra-
tione abstinendum est ab
omnibus quæ crassum, fri-
gidum, lentum ingenerare
succum queant. Attenuan-
tia conveniunt ut carnes
volucrum quæ nō in aquo-
sis aut circa aquas versan-
tur. inter olera sinapi, na-
sturtium, eruca probantur.
ex herbis hyss. orig. majo-
rana, rosmarinus, thymus,
betonica. Quod si verò &
ætas sanguinis detractiōni
& purgationi suffecerit non
erit hæc prætermittenda.
Et statim post morbi inva-
sionem vel vere aut autum-
no

no hæc facienda.

Quando verò post 25. annū morbus hic primum invaserit frequenter initio morbus acutus est. atque tunc si vires ferant sanguis quoque detrahendus. aut acri enemate alvus irritanda. & quando æger aliquantum ad se redierit purgans medicamentum non negligendum.

Victus ratio ad calidam & siccam mutanda ut supra dictum.

Prodest verò non rarò histum & junioribus cauterio ulcus in cervice procurare, idque diu apertum retinere. postea verò simile in uno brachio aut uno crure facere. quod & diu apertum manere expedit. Laudat Rhazis lib. 9. ad Almanz. elect. quoddam quod valde utile est in morbo comitali, cujus loco sumi potest aliud compos. ex Mithridatio & conserva majoranæ additis cubebis, cardamomi, pyretri radice, & præoniæ radice aut semi-

18. Metui enim posset ne in apoplexin fieret transitus.

19. In morbo recenti in quadragenarijs vidi profuisse. in inveterato non tantum prodest. dicitur vulgo fontanella. videtur Appulejus meminisse quū dicit rapum rannunculi collo alligatam curare comitalem.

20. Non primò, ante ulcus in cervice. nec illud claudendum antequā in brachio vel cruce apertum, quod diu, imo quandoque per totam vitam, apertum retinendum.

21. *Exteriore dextri posterioris pedis. Parac. post alios Viscum commendat. qui suo more Viridellum appellat.*

22. *Vt in Diodoro Grammatico, de quo Gal. I. contra Erasistratos.*

23. *Dolorem calculi vel etiam coli in testini.*

ne cum syr. ex stœchade permixtis.

Gestare verò & ex²¹ ungula alcis vel annulum vel aliud quiddam subinde tum his, tum & alijs utile est.

In senectute autem si quis hoc morbo corripitur & ab hoc convaluerit idonea victus ratione continendus est, & danda quæ cerebrum resiccant ac corroborant, veluti quæ jam diximus.

Quod si verò ab ore ventriculi morbus comitialis fiat²², id quod ex oris ventriculi dolore & sensu rosionis præsertim ab inedia ac fame cognosci potest, ventriculi ac oris ipsius ratio habenda erit. cibus tempestivè exhibendus qui ut bene concoquatur curandum. Si aliquo humore gravari ventriculum contigerit exhibenda erit hiera picra. exterius verò & admovenda ventriculum roborantia.

Si autem propter alterius partis affectionem vel²³ dolorem

lorem acciderit parti labo-
ranti curatio debetur. Si ex
crure vapor aliquis efferri
sentiatur qui ad cerebrum
pervenians affectum inge-
neret mox vinculo prius-
quā ascendere vapor queat
membrum stringendum.
deinde parti calfacientia &
exulcerantia adhibenda ut
sunt medicamenta ex tha-
psia, sinapi, euphorbio.

De Vertigine.

CAP. 14.

Lea. 28. Orob. 27.

Vertigo : five scotoma
inordinatus est spiri-
tuum in cerebri ventriculis
motus, propter quem om-
nia quæ quis videt sibi in
orbem converti, ac circu-
lariter rotari, falso apparet,
adeo ut stans nequeat cō-
sistere atque in terram con-
1. Scotomata & Ilin-
ges, cōgeneres Epilepsia
sunt, ex iisdem causis, &
circa eadem loca fiunt.
superficie tenus tamen
inherent tantum. unde
& facilius curatur. In
l. Medico. c. de humori-
bus. Hinc veteres parvā
Epilepsiam vocarunt.
Cæl. Aurel. c. 2. l. 2. Chronicor. 2. Nihil enim refert
τὸ ὄψιν, an quod videtur, in orbem vertas. 3. Probl. 9. &
2. de cælo. t. 48. & 3. Meteor. c. 3. 3. Quod spiritus ani-
malis perturbatus, & cum humorib. confusus, ineptus fiat
ad suscipiendam facultatem sensum, motumque suppedi-
tantem. Aphrodis. 1. problem. 131.

O 5

4. *Leviorem Græci solum δίον vocant. Differt autem hic morbus sola magnitudine ab epilepsia. hic enim perturbantur ibi prorsus impediuntur spiritus.*

5. *Vt in μικροχόλοις. & in ebrijs. 3. Probl. 9. Effertur autem vel per arterias quæ circa aures; vel illas quæ interiorius ad Retiformem adscendunt, plexum. l. 3. de caus. sympt. Gal. Alienus autem hic spiritus internum cum humoribus in gyrum pellit ut simile quid fiat ac si quis caput in gyrum vertisset; nihil enim interest, aut quod movet intus, aut foris sit. Theophrast. l. de vertigine.*

cidat nisi aliquo fulciatur quemadmodum sanis post multas corporis circūgirationes accidit. Non solum autem stantibus aut euntibus, sed subinde & in lecto decumbentibus ac quietis hujusmodi accidens supervenit quod & quandoque adeò magnum est ut & tenebras oculis offundat, quod + σκατόδιον græci nominant. Contingit verò & hanc affectionem quandoque per consensum fieri, quandoque verò cerebro primariò laborante.

Per consensum fit quando ex ventriculo acres, calidique vapores efferuntur, cujus signum ventriculi atque ipsius ostij morsus acrosio, & quandoque nausea. Cerebrum verò primaria affectione sive per essentiam laborare ostendit dolor capitis, & præcipuè aggravans, & cum somnolentia, stupor sensus odoratus, aurium tinnitus, quæ in capite frigidos redundare humores testantur, unde cras-

si va-

si vapores generantur spiritus cerebri perturbantes, ac inordinato motu concitantes.

Quando igitur vertigo propter ventriculi ac ipsius oris affectionem accesserit providendum est ventriculo ut supra dictum est, & si multo humore vitioso gravatus fuerit hiera picra exhibenda.

6. Quod non solum pituitosos sed & biliosos humores evacuet.

Sed quando propter crudos humores in capite redundantes vertigo facta fuerit. citò ad corporis vacationem festinandum, & aut sanguis detrahendus, aut purgans medicamentum exhibendum; prout conditio ægrotantis suaserit, aut postulaverit. deinde verò & apophlegmatismis ac sternutatorijs utendum.

Quod si verò etiam sæpius recurrat neque factis vacationibus cesset, cauterium etiam cervici admove- vere utile fuerit, veluti in comitali morbo.

Tempore verò accessio- nis cum vertigo molesta est

7. Quosdam vertiginosos ac jam convellendos atq; ad epilepsiam pronos cauterium liberavit, nec unquam sefellit, inquit Dodon.

si non cito cessaverit frictions, ligaturæ, similesque diversiones faciendæ, & odore aromatum æger reficiendus, ut cinnamomi, garyophyllorum &c.

Non est autem hæc affectio negligenda. nam ut Hipp. in Coacis; Quibus capitis sunt dolores & sonitus aurium² citra febrem & vertigo, & vocis tarditas, & manum torpor, eos aut³ apoplecticos, aut lethargicos, aut epilepticos fore, expectandum.

8. Nam quæ cum febre sit criseos per hæmorrhagiam futuræ præ-nuncia.

9. Si in ventriculos fluat humor.

1. Dicitur morbus attonitus. & sideratio quod pars aliqua ferè siderata relinquitur.

2. Vna cum principallium actionum læsione. Aëtius. estque ut idē ait, morbus toto genere acutus.

3. Læsis instrumentis voluntarij motus à quib. & respirationem quodammodo perfici certum.

De Apoplexia.

CAP. 15.

A Poplexia¹ est sensus & motus universi corporis privatio² subitò & derepēte superveniens servata tamen aliqua ex parte respiratione quæ tamē difficulter admodum³ procedit, ex qua periculi magnitudinē intelligimus. quando enim respiratio adeo est exigua ut nulla esse videatur fortissima ac vehementissima

tissima est apoplexia⁴. ubi
verò vel liberior vel minus
impedita est respiratio mi-
nus fortis apoplexia habe-
tur quam Hipp. debilem
vocat.

4. Non interficit Apo-
plexia, nisi quum respi-
rationem ledit.

Lect. 29. Octob. 28.

Causæ autem apoplexiæ
sunt humores crudi ac pi-
tuitosi, quandoque soli, sed
frequenter cum sanguine
permixti, in ventriculos ce-
rebrī subito incidentes eos-
demque implentes ac ob-
struentes, sic ut nullus aut
vix ullus, spiritus animalis
nervos subire queat.

5. Apoplexia fit multo
sanguine in principium
animalis incurrite. Gal.
de phlebot. c. 5. Sic Ve-
rus Antoninus dum cum
fratre in Vehiculo ve-
heretur subito sanguine
ictus est casu morbi quē
Græci Apoplexin vocant
Eutrop. l. 8. & S. Au-
rel. Victor. Valentinia-
nus dum Quadorum le-
gationi responderet, su-
bito effusione sanguinis
quæ Græcè Apoplexis
vocatur, voce amissa,
sensu integer exspiravit.
Paul. Diacon. l. 11.

Affligitur autem in hac
affectione cerebrum pri-
mariorum sive per essentiam, &
non modo ventriculi ipsius,
sed & substantia ejus su-
perfluo humore imbutur,
citra autē febrem & humo-
rum putredinem in quo à
Methargo differt.

6. Primū oportet ut sint
humores in substantia
cerebrī ex qua in ven-
triculos subito influant.
Vide Pallad. 6. sect. 6.
epid. com. 7.

Cessante autē apoplexiæ
vigore, & excitato utrum-
que ægroto, facultatibusq;
animalib. aliquo modo re-
paratis, succedit paralyfis
vive resolutio, vel dimidij
corporis, vel alicujus unius

7. Quando materia non est copiosa.

8. Non est convulsio, sed est resolutio. unde oppositus musculus ad principium suum retrahitur. Quod in nobili fœmina clarissimè advertimus ex eo quod qui Oculum claudit musculo, una cum alijs faciei resolutio palpebras arcte conducere non posset.

9. Quod humorib. maximè tunc abundantib. dominari calor natus non amplius potest. utpote qui jam declinare incipiat. Videtur autem Gal. in comm. hujus aph. sui oblitus referre ad melancholiam quum alibi semper pituitam causam ejus statuatur.

10. Detractio fiat è dextra manu & copia ejus qui detrahatur dividatur. commovere enim oportet, non exolvere vires, & calorem extinguere.

7 partis, ut maxillæ cynico
8 spasmus, vel linguæ, vel vocis instrumentorum vel alterius membri, mens etiam in nonnullis læsa manet, præsertim post fortissimam apoplexiam.

Fiunt autem apoplexiæ ut Hipp. ait maximè à 40. usque ad 60. annum. Supervenit verò & non raro senioribus ac majorè ætatem habentibus. Sed his potissimum ex solo pituitoso humore: illis verò ex pituitoso humore cum sanguine permixta. nam ut Gal. apoplexia senili ætati familiaris. quoniam in ea cerebrum pituitosis repletur superfluitatibus.

Quum itaque alicui mediæ ætatis apoplexia supervenerit sive illa fortis, sive debilis sit, à sanguinis missione curatio incipienda est, quæ etiam repetenda, si repletio magna est, morbus vehemens, & vires constant. Etenim acrimonia deinde acrimonia injicienda, aut glandes similes subjiciendæ; neque cess-

cessandum si fieri potuerit
donec æger excitetur fri-
ctionibus & ligaturis etiam
adhibitis, alijsque diversio-
nibus ut cucurbitulis cum
scarificatione * dorso ad-
motis.

Senioribus verò & præ-
sertim macilentis non te-
nere sanguis detrahendus
est, sed enemata injicien-
da vel glandes subjienda,
diversionesque quales jam
dictum est faciendæ.

Restituti aliquo modo
proxi sive juniores, sive se-
niores, mox purgandi sunt
ut vires ferant, medicamen-
ta quæ pituitosum humo-
rem subducant ut sunt dia-
phoreticæ, elect. indû, dia-
phoreticæ, pill. aureæ, pill. co-
muniæ, vel similes; vel ex sena
& agarico decocta.

Præmissis autem genera-
bus vacuationibus ad par-
ticularia veniendum, ut sunt
pneumophlegmatismi, sternu-
toria, odoramenta, un-
ctiones & similia.

Exhibenda quoque sunt
quæ cerebrum resiccent ac

* *Vel pedibus. ut in Io-
hanne Imperatore Con-
stantinopol. factum nar-
rat Georg. Logothet.
Scarificationibus autem
inditum Ephorbion (for-
tè ἐφόλκιον, vel ἐυφόρ-
κιον) addit. ut major fie-
ret attractio.*

11. *Obstat tempera-
mentum & virium debi-
litas.*

12. *Quod valde com-
modum præsertim si in
pulvere dari posset.*

13. *Quæ singularia in
affectibus capitis.*

roborent : ut conf. ma-
joranae, conf. florum ros-
marini, elect. pleris ar-
chonticon, diambra, ¹³ cu-
bebae, cardamomum, pæo-
niae radix, aut semen; ex
quibus cum syr. de stœcha-
de permixtis, conditum ef-
formari potest, ex quo ma-
ne jejuno corpore aliquid
exhibendum. Prodest verò
& ipsum el. pleris arcont.
vel diambra si in tabulis
formatum sumatur.

Lect. 30. Octob. 31.
Apophleg-
matismi.

14. *Utebantur veteres
etiam rad. staphidis
agriæ qua abstinemus
quod strangulationem
afferat.*

Apophlegmatismi fieri
poterunt ex radicib. ¹⁴ py-
retri, rad. pimpinellæ saxi-
fragæ, thymo, origano, hys-
sopo, semine erucæ, in aqua
decoctis addita tertia aceti
parte, vel ejus loco oxyme-
lite simplici, aut quod for-
tius est oxymelite scylliti-
co, quo sæpius gargarizan-
dum & os colluendum est.
Lac quoque ex amygdalis
amaris, aut ex nucleis per-
ficorum cum aqua pulegij
factum non inutiliter, apo-
phlegmatismi loco, usurpa-
tur. nam & pituitam detra-
hit & linguam expedit fre-
quen-

quenter in ore detentum,
præsertim erucæ aut fina-
peos semine addito. Pos-
sunt verò rad. pyretri & so-
læ manducari vel cum sem.
erucæ & cubebis, tritæ in
nodulo colligari.

Sternutatoria¹⁵ facienda
ex¹⁶ pipere & veratri albi
radicibus quibus addi po-
terit nonnihil castorei. atq;
his etiam in ipsa 1. morbi
accessione uti licet. ad ipsos
videlicet apoplecticos ex-
citandos, sed tamen post
purgationē tutissimus ho-
rum usus.

Semen¹⁷ melanthij .i. ni-
gellæ per se vel cum majo-
ranæ folijs in nodulo colli-
gatum, sæpiusque narib. ad
motum, & odoratum, ad
cerebrū resiccandū etiam
confert.

Quod si verò post san-
guinis missionem vel ene-
mata adhibita apoplecti-
cus excitari nequeat & pi-
tuita vel sola, vel plurima
causa morbi fuerit, calfa-
cientia etiam capiti op-
portune admoventur. qua-

Errhina.

15. Quod educant hu-
mores & excitēt egros.

16. Struthio seu condys-
itebantur olim, nunc in
cognitum est.

17. Sic cuidam cui sen-
sus odoratus perierat ex
humorum decubitu ad
nervos odoratus sensum
restitutum memini me-
lanthij odore.

P

lia in curatione lethargi dicta.

18. Quod fortuitò fuit observatū. etenim quandam mihi cognatam ex apoplexia balbutientem curabam quā delapsam per gradus quū ex vulnere frontis vena rupta multus sanguis effluxisset post expedite loqui animadvertit. R. Dodon.

19. Quod 7. par nervorum ibi ex calvaria excidat quod linguam & labia movet.

Diæta.

20. Quod morbus acutus, & quod fames morbum humidum juvare poterit, siccando.

21. Pro quo oxymelite uti nil prohibet.

22. Tantū quantum additum saporem non reddit ingratum.

Membris autē ac partib. exteriorib. resolutis cujusmodi remedia adhibenda sint in curatione paralyseos dicendum. Ad linguæ autem resolutionem conveniunt gargarismi jam dicti, tū¹⁸ & venæ rectæ in fronte sectio, præmissis generalib. Possunt verò & circa colum superiores partes proximæ¹⁹ capitis ossi, inungi oleo aliquo calfaciente, ut de castoreo, de euphorbio, costino quod describitur à Rhazi nono ad Almanz. quæ ad linguæ expeditionē etiam conducunt.

Victus ratio in apoplexi initio²⁰ tenuis esse debet, postea paulo plenior, sed attenuans, & ad calidum & ficcum inclinans, veluti in curatione comitialis morbi. Ab omni vino toto curationis tempore abstinentiū & ab omni potione inebriante. hydromelite utēdum aut²¹ apomelito in quo si incoctū fuerit²² non-nihil

nihil salviæ vel betonicæ,
utilius erit. neque etiam ex-
hibenda est aqua vitæ aut
aqua lavendulæ, vel cum
ipsis composita, nisi in val-
de senibus. nam usu istorum
humores funduntur & ca-
put magis impletur. In val-
de tamen senibus quibus
venæ sectio aut purgatio
non convenit & vires debi-
les sunt & universum cor-
pus perfrigeratum, conve-
nire potest ex aqua²³ laven-
dulæ vel sola vel addita
aqua vitæ, cum theriaca &
mithridatio ac exiguo cro-
ci, mixtura; ex qua mane &
ante cænā dimidij cochlea-
ris instar exhibendum.

23. & Mithridatij, &
theriacæ veteris ana) 1.
croci. g. 5. aquæ laven-
dulæ 3 2. vel aquæ la-
ven. & aquæ vitæ ana
3 1.

Prognosis.

Cæterum superveniens
apoplectico febris, signum
est malum: significat enim
humorum in cerebro pu-
trefactionem quod absque
periculo cōtingere nequit.

De Paralyfi.

CAP. 16.

Paralyfis est potentia^{Lee. 31. Nov. 4.}
voluntarij motus priva-

P A

tio & quandoque simul sensus tactus. & talis quidem paralyfis exquisitissima & difficillima, sed raro accidens. frequentius siquidem non nisi voluntarij motus deperditur.

Contingit autem resolvi quandoque dimidiam corporis partem ut in hemiplexia; alias inferiorum: aliquando unam solam partem, veluti manum, pedem, vesicam, anum &c. Causæ autem resolutionis duplices sunt, quædam externæ sive procatarticæ, aliæ antecedentes sive internæ.

Externæ causæ sunt ut fortis alicujus membri ligatura diuturna fortis. præsertim primis annis quando corpus adhuc incrementum sumit. item nervi aut principij ejus attritio, contusio, vulneratio, præcisio, durities; refrigeratio, vel

1. Cæl. Aurelian. etiam interiorum singula paralyfi vitiari credibile putat pulmonem, cor, diaphragma, lienē, hep. & Herophilum ex cordis paralyfi repentinam mortem, nulla ex causa manifesta fieri credidisse refert l. 2. At emissus harum partium sensus repente haud perimit. Cordis motus animalis non est. Diaphragmatis tantum suffocare posset.

2. Vt in puero in quo à sagitta cervicis nervus læsus erat. unde stupor in crure, cum atrophia, & incrementi privatione. Vide Niceph. Greg. comm. in Synes. de insomnijs.

3. Vt à plumbo, argento vivo aut alijs metallis.

ver-

vertebræ + alicujus luxatio.

Interiores causæ sunt humores, nervorum principium aut ipsos nervos nimia, humiditate imbuentes atque relaxantes, & subinde quoque obstruentes tunc videlicet quando sensus tactus abolitus est. humores autem qui nervos ipsos humectant, pituitosi & tenues sunt: vel tenuis & pituitosus sanguis.

Succedit autem paralyssis quæ non ab externa causa accidit frequentissimè apoplexiæ. Contingit verò & quandoque citra interiorum sensuum & facultatum principum offensa, nulliusq; partis quæ ad faciem & caput pertinent actione amissa, servata etiam respiratione, omnes tamen partes inferiores resolvi. Fit verò & paralyssis critica quadam permutatione ex alio morbo, & frequentius per colicum dolorem.

Sunt verò & qui diuturnam cataphoram; quod cerebrum utero

4. *Luxatio ex casu, ictu vel tumore fit. casus aut ictus si magnus sit resolutionem inferiorum omnium inducit. Sed à tumore ut in gibbosis paralyssis non fit quod sensim fiat, & proxime vertebra una quodammodo cedunt.*

5. *Aëtius. Sanguinis, detrahendus verum moderate, ne refrigerentur frigiditas enim cum siccitate morbi causa. i. ut ante dixit, frig. crassi ac viscosi humores.*

6. *Bilis licet tenuis tamen quum omnes partes resiccet quas attingit paralyssin non efficit quod vult fernelius, sed potius convulsionem induceret. atque in hoc accedo Ronde.*

7. *Gordonius. Nos Vteri suffocationib. frequenter tentatam, apoplecticam denum mori vidimus.*

Terminari autē solebant hujus suffocationes in

nis febribus & uteri suffocationi nervorum resolutionem quandoque succedere affirmant.

Quando igitur propter causam aliquam externam aliqua corporis pars resoluta fuerit parti quæ primario læsa & affecta est, & unde resolutarum partium nervi dimittuntur, præmissis generalibus si opus fuerit, topica erunt remedia adhibenda, ut Gal. I. de loc. affect. docet. modo talis sit affectio, quæ curationis spem admittat. nam ex causis externis quædam resolutiones omnino sunt incurabiles, ut à præcisione nervi. & sæpè etiam à vertebrarum luxatione.

8. Imò difficilis etiam curatio si vel à duritie nervi solum fiat.

9. Si diuturna fuerit luxatio, quod si ab egressu nervorum vitium fuerit illæ tantum resolvuntur ad quas partes illæ dimittuntur.

Resolutis autem ab apoplexia partibus factis universalibus, observata victus idonea ratione, non prætermittis his quæ cerebrum resiccant ac roborant, localia erunt adhibenda remedia. ut sunt olea, unguenta, & adipēs nervos calfacientia, resiccantia, ac

con-

confortantia. veluti oleum
lumbricorū, ol. vulpinum,
ol. terebinthinæ, & quæ his
fortiora ac potentiora sunt
ol. de castoreo, ol. de eu-
phorbio, ol. costinum Rha-
zis, ol. laurinum, ol. junipe-
rinum, ol. ¹⁰ benedictum.
quibus addi possunt adi-
pes vel leonis, vel ursi, vel
taxi.

10. *Seu de lateribus.*

Possunt verò & ex ijs-
dem & unguenta componi
storace, vel myrrha vel, ca-
storeo, vel euphorbio, vel
pipere, vel aliquot horum
simul cum cera additis. Un-
gendæ autem sunt istis un-
guentis & oleis calentibus
partium resolutarum jun-
cturæ¹¹, & dorsi spina quæ
spinalem medullam conti-
net unde nervi oriuntur. &
initio quidem levioribus
utendum postea ad fortio-
ra veniendum.

11. *Quod ibi à muscu-
lis liberi quodammodo
nervi, quodque etiam li-
gamenta ibi sunt quæ
una afficiuntur.*

Quando autem mem-
bra corporis subito resol-
vuntur nulla præcedente
externa causa principibus
facultatibus non læsis, neq;
ulla circa caput aut faciem

Leet. 32. Nov. 3.

parte resoluta, servata etiā respiratione ab humoribus ex capite in spinalis medullæ principium defluentibus affectionis origo est.

In hac affectione vacuatio mox facienda est. vena secanda est, si sanguinis redundantis adsint indicia. deinde purgans exhibendum erit quod solum satis erit, non redundante sanguine. modo tale sit quod pituitosos expurget humores. qualia in apoplexiæ curatione dicta sunt.

12. *Quia sola purgatione multi curantur.*

Post vacuationes factas ungenda, ¹² si opus fuerit, dorso spina aliquo supradictorum oleorum observata victus ratione, & exhibitis caput roborantibus. remedia ut in apoplexi.

13. *Rarum.*

Quod si verò pertinacior & istis remedijs curari nequeat ¹³ (veluti dum non solum motus voluntarius amissus, sed & simul tactus sensitiva vis abolita est) tunc enim pluribus erit remedijs utendum. Balneum parandum erit ex rosmarino, lauri fo-

ri folijs, serpillio, origano,
 betonica, calamintha, pule-
 gio, salvia, thymo, majora-
 na, hyperico, floribus cha-
 moemeli, floribus stœcha-
 dos, &c. addito etiā¹⁴ ebu-
 lo & feminibus calfacienti-
 bus ut semine anisi, sem. se-
 seleos, sem. cumini & simi-
 libus, quæ in aqua deco-
 quenda sunt¹⁵ ad dimidiā,
 aut ad minus 3 partis aquæ
 consumptionem, quæ dein-
 de calens in vase fundenda.
 in quo patiens jejunus ita
 sedere debet diligēter con-
 tectus ut aquam decoctam
 non contingat, sed vapo-
 rem ejus tantummodo re-
 cipiat in quo aliquo tempo-
 re permanere debet. Vbi
 vero satis¹⁶ corpus inca-
 luerit & sudaverit in lecto
 collocandus erit ac diligen-
 ter contegendus, exhibita
 vel theriace vel mithrida-
 cio, vel aurea Alexandrina,
 vel confectione Anacar-
 dina 3 vel 2^{orum} ponde-
 re. Postea ubi æger requie-
 verit oleis aut unguentis
 ungendus erit. Non semel

14. *Quod tenuium sit
 partium & exsiccet.*

15. *Vt tota facultas
 herbarū in aquam trans-
 feratur. nam actuali hu-
 miditate magis noceret.*

16. *Quia tunc facilius
 ad nervos penetrat vis
 medi. omnib. poris aper-
 tis.*

autem hujuscemodi balneo utendum, sed sæpius & bis vel ter in hebdomade æger in balneum mittendus erit, habita virium ratione.

Quod si verò nec istis balneis paralyticus sanari queat confugiendū ad naturalia balnea calida & sulphurea, ut sunt Aquisgrani. adhibitis cautionibus quæ talia balnea postulant.

Cynicus spasmus.

17. *Non fit sine mentis aliqua perturbatione, ac sola resolutio est in quā apoplexia debilis desinit, ut fortis in hemiplegiam.*

18. *Vel insuper etiam empl. similis facultatis imponenda. quibus aliquam euphorbij partem addi quandoq; necessarium est.*

19. *Sine dolore. Contingit ex sola refrigeratione ferè in senib. nec opus vacationibus terminatur autem lentè.*

In Cynico 17 spasmō factis generalibus ut in apoplexiæ curatione fricare cervicem & partem resolutam initio expediens est. Admovenda deinde sunt fomenta calida ex salvia, majorana, floribus stœchados, chamæmeli & similib. in sacculo confutis. Postea cervicis vertebræ, & pars resoluta oleis supra-dictis ungenda 18.

Vesicæ verò musculis resolutis & urina præter 19 voluntatem effluente admovenda erunt topica remedia pubi, imo ventri, & regioni quæ inter anum & scrotum. Paulus etiam olea in

in anum infundi jubet qualia supra dicta.

Cole autem sive pene resoluta & iisdem partibus tum & lumbis remedia adhibenda.

Recto autem intestino resoluta, & fecibus præter voluntatem excidentibus. fovendus erit anus decocto calfacientium simul & astringentium, ut ex herbis supra dictis & gallis, nucibus cupressi, glandium calicibus, semine myrti, rosis rubris, balauistijs & similib. astringentibus. Oleum verò matricinum vel myrtinum etiam alijs admiscendum, quibus anus foris inungendus, immixtis etiam in ipsum intestinum per syriginem huiusmodi oleis.

20. Quod Langius male per sextum par nervorum quod ad ventriculum pervenit fieri. id enim ad manus non pertingit, sed 6. par quod è vertebra ori-
 tur. numero forte deceptus.

21. Quod non sint humores in causa, sed debilitas partium.

22. Quum colicus dolor vinum requirit.

Qui ex permutatione colici doloris resolutas habent manus ²⁰ & brachia facile & subinde absque remedijs curantur. modo cesset causa colici doloris, neque opus ²¹ habent purgantibus medicamentis. à vino ²² etiã abstinere non de-

Lea. 33.
Nov. 4.

bent. bona victus ratio servanda. Partes resolutæ unguentis & oleis ungendæ.

Profunt verò & his balnea naturalia sulphurea.

Similis curatio adhiberi debet ijs qui ex permutatione aliorum morborum resoluti sunt.

23. Quorum talis est affinitas ut plumbū impositum argento vivo lique scat & simile ei fiat. dolus agnoscitur quod hoc evanescat igne, plūbum minimè.

24. Difficulter curantur quod spiritus metallorū tenuissimus musculis impressus non extrahatur facile.

Qui autem ex tractatione argenti vivi²³, plumbi & aliorum²⁴ metallorum paralytici facti sunt difficile curantur. balnea & unctiones ipsis conveniunt. purgantibus med. non adjuvātur idcirco nec ipsis danda, nisi corpore repleto & ante balneorum usum, & ea quidem admodum levia.

De Stupore.

CAP. 17.

1. Ideoque ejusdem cum Paralyfi speciei quidē, secundū verò magis & minus ab illa differt.

Stupor sive torpor est Simminutio : sensus & motus in partibus sensu præditis. non enim in omnibus contingit, sed in ijs tantum membris quæ suos affectus sentire queunt & pro arbitrij voluntate moveri¹.

veri. Neque etiam sentien-
di vis omnino amittitur, sed
sensus obscurus fit & he-
bes, & motus redditur dif-
ficilis. mediam autē quan-
dam inter paralyfin & sani-
tatem dispositionem tor-
porem esse Gal. ait, & viam
quandam ad paralyfin.

Causæ autem torporis si-
ve stuporis quædam exter-
næ, aliæ internæ. Externæ
sunt frigus & compressio
nervosorum corporū. item
& marinæ torpedinis vi-
ventis contactus, & narco-
ticorum applicatio, & usus.
Internæ sunt crassi & frigi-
di humores, vel consuetæ
alicujus vacuationis sup-
pressio.

Torpore autem quando
cerebrum laborat si non ab
externa causa vel propter
narcoticorum usum acci-
derit successuram vel apo-
plexiam, vel carum, vel ca-
tochum, aut lethargum sig-
nificat, nisi sibi in tempore
æger providerit.

Torpor qui ab externa
causa factus est solvitur fri-

2. Privatio enim præsup-
ponit habitū. Ossa stu-
porem non patiuntur
(dentib. fortè exceptis)
quod sensum, motumque
qui imminui possit à na-
tura non habeant.

3. Quod idem. nam si
supprimatur biliosa va-
cuatio non fiet torpor.
Atque hæc quidem Con-
gestionis causa. Genera-
tionis autem talium hu-
morum Vita deses, Effi-
ciens: cibi verò crassi, &
lenti, Materialis causa
existit.

cationib. & calidorum adhibitione. sed qui ab humore redundante natus est, vacuationem postulat, quæ instituenda veluti in apoplexia & paralyfi dictum servata simili victus ratione.

De Convulsione.

CAP. 18.

Lea. 34. Nov. 7.

Convulsio est affectio per quam voluntarij motus instrumenta ad principium suum contra voluntatem & cum dolore trahuntur. Accidit autem vel propter repletionem instrumentorum, vel propter eorum inanitionem & siccitatem. adest & tertia causa mordicatio ab aliquo qualitate acri.

Convellitur autem quandoque universum corpus, ut in epilepsia quando cerebrum laborat, quandoque verò quædam solummodo partes. Inter convulsionum genera & is est quem rigorem nervorum Celsus vocat, cujus

cujus 3. sunt species: modo enim caput ad scapulas, trahitur, modo mentum pectori annectitur, modo recta & immobilis cervix intenditur, sic ut nec antrosum, nec retrorsum flecti queat. priorem affectionem ὀπισθότρονον, alterā ἐμπροσθότρονον, teriam τέτανον græci appellant. Acutus autem morbus tetanus est. nam, ut Hipp. ait, Quicunque à tetano corripuntur in 4. diebus pereunt: si verò has effugerint sani fiunt.

Ab inanitione autem fit convulsio quæ sequitur vacuationes immoderatas, ut vomitus aut purgationes vehementes, alvi fluores spontaneos modum excedentes, sanguinis profluvia immoderata sive per vulnus sive alio modo, sudores copiosos. Item & illæ quæ succedunt vigilijs diuturnis, fami ac inedia, & continuis laboribus. hæc enim omnia nervos & voluntarij motus instrumenta sicciora reddunt & contrahi faciunt.

1. Tetanū semel vidisse se, reliquas species nunquam. R. Dod. narrabat. Opistotono sepiissime recurrēte laborantē

puellam 12. annorum vidimus quam in cantationibus læsam adstantes credebāt. dorsi enim spina in arcum veluti convulsa supra ventrem prona in lectulo suoolvebatur. ac musculi faciei contracti risum mentiebantur Læviorem aliquoties observavimus.

2. Magis convulsiones sequuntur spontaneos fluores, præsertim in cholera, quam arte factos. Ex usu autem helbori albi resolutiones fiunt ob malignitatem ejus.

3. Vulnus convulsionem infert vel ratione vacuationis, vel ratione inflammationis ex vulnere nate.

4. *Vocant hanc convulsionem per consensum: vel etiam convulsionem non proportionatam ad materiam morbi.*

5. *Convulsi vi potius motus, quam convulsiones sunt.*

6. *In morbillis etiam, seu Variolis, quum nondum ad cutem prorupere severissimas convulsiones aliquando vidimus, quæ tamen materia peccante ad circumferentiam habitus expulsa statim desinunt.*

A qualitate autem acri fiunt ⁴convulsiones quando vaporosus aliquis spiritus acrimoniam habens, vel venenosa aura, cerebrum & nervos infestat ut fit à morfu phalangiorū, & canis rabidi, vel aliorum similitum. Tales autem convulsiones non sunt constantes, nec membra rigida permanent, sed per exigua intervalla, veluti quiete aliqua intermedia, assidue molestantur, quales in febribus ardentibus & phreniticis frequenter accidunt.

Acres æruginosi humores os ventriculi infestantes huiusmodi convulsiones etiam inducunt, ut Gal. testatur.

Quando verò à nulla tali causa sano alicui subito & derepente convulsio supervenit, ob repletionem hanc fieri necessarium est.

Replentur autem ac distenduntur nervi aliquando à vaporoso spiritu frigido, sed hinc facta cōvulsio non est perpetua & confestim sol-

solvitur : veluti in comitali morbo & convulsione ab utero. sed quæ subito quidem quoque invadit non citò autem & confestim solvitur, ex humore fit nervorum meatus obstruente qui crassus ac viscidus est.

Contingit verò & nonnunquam propter inflammationem 7 alicujus partis nervosæ convulsionem fieri, quando videlicet in nervorum principio, aut prope admodum constiterit.

* Hipp. autem etiam frigidum convulsiones facere scriptum reliquit.

Facta igitur convulsione ab inanitione laborandum est ut cessent causæ; corpus verò etiam mox humidis & idoneis quæ citò & facile nutrant alimentis, reficiendum, ut sunt sorbitiones ex jusculis caponū vel aliarum similium carniū. item & sorbitiones ex carnibus confusis caponum, gallinarum, perdicum, aut similium, cum amygdalis dulcibus quib. placent, vel

7. Gal. de sympt. causis lib. 2. cap. 2. ad repletionem refert.

8. Convulsiones, tetani, palpitaciones, torpores, resolutiones, comitiales

morbi, attoni-

Lea. 35.
Nov. 8.

ti, frigidita-

tis sunt vin-

centis effectus. Gal. de palp. trem. rigore &c.

Q

9. *Ut in cholera.* Omnia enim jurulenta movent alvum. jus Gallinarum astringere dicit Gal. quod minus moveat quā jus galli veteris, sed tamen movet.

10. *In qua non fuerint incoctæ herbæ.* quod apud quosdam fit.

11. *In enemate ad colicos dolores* juvat, impotentes ob duritiem nervorum ex pulnere vel alias restituit, ac ad multa utile est.

cum nucleis nucum pinearum, cum earundem carniū jure apparatus. nisi obstet, alvus fluida. quandiu enim illa liquida permanet à carniū jure abstinendū & illius loco aqua simplici ad sorbitiones faciendas utendū. Profunt verò etiam ova sorbilia atq; ex his cum vino factæ sorbitiones. Vina etiam dulcia utilia sunt. cito .n. vires & humidū reparant. Sic & cerevisiæ potentes modo nō sint acidæ, nec inutile hydromeli est.

Partes verò cōvulsæ ungendæ sunt vel oleo amygdalarū dulcium, vel pinguedine porci, vel butyro insulso, vel simili aliquo. fovere verò & easdē convenit vel decocto malvæ, bismalvæ, sem. lini, additis florib. chamæmeli, vel cerevisia crassa recēti adhuc 10 calēte priusquam lupulus incoctus fuerit. Vel jure 11 omasorum & pedum bovis. Balnea verò aquæ dulcis etiam utilia sunt addita si placet malva aut bismalva. Extrema autem

sem sive calor sive frigus ^{12.} Quia valde ledunt
vitanda sunt. nec est ab his nervos.
remedijs cessandū nam ab
inanitomine convulsiones
periculum minantur, & le-
thales eas non uno loco
Hipp. pronuntiavit.

Quod si verò ab acri ali-
quo convulsio orta fuerit,
aut à venenosa aura veluti à
morsu phalangij vel ^{13.} Si possit inveniri
rabidi curatio adhibenda, remed. erit quod conve-
qualem affectus postulat niat hydrophobie ante-
quem comitatur. In febrib. quam convulsio jam su-
autem ardentib. & morbis pervenit ex morsu canis.
acutis hujuscemodi convul-
siones pro lethalib. & per-
nitiosis signis habentur.

Si verò propter ærugino-
sam bilem in ventriculo
hærentem convulsio fiat
mox vomitione expurgan-
da erit, quæ aqua tepida so-
la, vel cum addito oxyme-
lite, provocari poterit.

Ex plenitudine convul-
sione facta (si non ex vapo-
roso spiritu) mox corpus
vacuandum est, & præci-
puè purgante medicamen-
to quod crassam pituitam
expurgat, qualia ^{14.} Ut pillulis cochijs.
dicta sunt.

Q 2

15. *Potius tamen utendum purgatione.*

in curatione Apoplexiæ. neque expectanda est, aut præmittenda est humorum præparatio aut concoctio propter morbi violentiam.

Venæ sectio, si^{is} sanguis cum frig. humorib. redundare videatur poterit initio admitti.

Post purgationē ad particularia veniendum qualia sunt unctiones & balnea veluti in paralyfi ex humorum in spinal. medull. defluxione facta, adhibita simili victus ratione, attenuante, & calida.

Balnea sulphurea in hujusmodi convulsione etiā prodesse possunt.

Si verò cōvulsio fiat propter inflammationem principij nervorū aut partium vicinarum, sanguine ex opposita parte detracto, curatio adhibenda est qualem inflammatio requirit.

Sic & convulsiones à vaporoso spiritu veluti in epilepsia, vel ex utero; non aliam requirunt, quam affectiones quas comitantur,
cura-

curationem.

Si tamen aliquod membrum sæpius ex aliqua¹⁶ occasione hujuscemodi convulsione corripiatur, humores etiam frigidi erunt expurgandi, sicuti in convulsione à repletionem, servata eadem victus ratione.

A frigore nata convulsio calfacientibus curari debet.

Sic & qui convulsione aut tetano detinentur superveniente febre liberantur.¹⁷ aph. 57. lib. 4.

que in rigore convellebatur, accedente calore restituebatur, eaque ratione per febrem liberata aliquo modo dici potuit. R. Dodon.

16. *Vt ex flatu, quod tamen ex frigido humore elevatur. ideoq; purgandus ille homo.*

17. *Sic juvenula quædam gravida, ex utero in comitalem morbum, atque ex eo in convulsionem incidit, superveniente verò febre continua, quæ post in intermittentem mutata est, ac tandem desijt, liberata fuit. Verum puellam navi 6. annorum*

De Tremore.

CAP. 19.

TRemor depravatus : Lect. 36. Nov. 10.
est motus sursum deorsumque qui fit partim à facultate motiva elevante, & partim à gravitate ipsius membri deorsum trahente. Differt à rigore quod tremor non fiat nisi quum

1. *Nisi imminutum dicere malueris. quæ enim stupor ad ἀναίσθησιν, eandem Tremor ad ἀνίσθησιν proportionē habere videtur.*

2. *Vel immotum servare. ad hoc enim motus requiritur tonicus, qui tremorem magis quam ille per quē pars de loco in locum movetur, prodere solet.*

3. *Quia vinum crudos humores secum rapit ad hepar qui non possunt concoqui ab hepate, unde cruditates multæ fiunt. Inter præmia ebrietatis Plin. recenset, & Tremulas manus. l. 14. c. 22.*

4. *Quod colligitur si nō præcesserint aliæ causæ.*

quis membrum voluerit movere: rigor verò citra voluntatem & nolentibus nobis superveniat.

Fit autem tremor propter imbecillitatem facultatis motivæ nequeuntis membrum sic elevare quin pondere suo rursus decidat, ac deorsum trahatur.

Causæ imbecillitatis facultatis motivæ complures sunt ut nimia refrigeratio instrumentorū voluntario motui deservientium, frigida aquæ intempestiva potatio, ebrietas & multa vini nigurgitatio præsertim quotidiana ac frequens. nō rarò etiam nimius timor. item morbus aliquis gravis qui præcessit, vel præsens ut in cardiacis ac stomachicis. abstinentia nimia, vel alimenti defectus, nimia vacuatio, veneris immoderatus usus, fluxus sanguinis immodicus. jam & virtutis per ætatem exolutio ut in senibus. Quandoque verò cruditas & humorum viscidorum crudorumque copia

pia vires veluti pōdere ag-
gravans & ad officiū inuti-
les reddens tremoris causa
existit.

Orto igitur tremore à
causa externa ut à frigore
partes calfaciendæ sunt.
Frequens ebrietas & fre-
quens vini potatio absti-
nentiā requirunt. Timor
excutiendus est.

Qui verò ex morbo cō-
valescentes, vel propter ni-
miam abstinentiam, vel ali-
menti inopiam, vel exce-
dentē vacuationem, aut im-
portunū veneris usum, aut
propter sanguinis immodi-
cam vacuationem tremore
correpti sunt: omnes ali-
menti & optimis cibis ci-
tò ac facile nutrientibus re-
ficiendi sunt, veluti in con-
vulsione ab inanitione fa-
cta. Eodem modo & senes
tractandi sunt quibus ovo-
rum recentium forbilium
ac vini potentis ac dulcis
usus multum conducit.

5. *Omnia aut saltem
pleraq; quæ habet Ægi-
neta in cap. de tremore
sunt remedia rigeris.*

Q 4

aliam quam ipsius morbi curationem requirit.

Sed si ex copia crassorum viscidorumque humorum tremor contigerit humores attenuandi, incidendi præparandique sunt & deinde expurgandi veluti in curatione febris quotidianæ & dolore capitis ab humore pituitoso, faciendum. In hoc casu convenit quoque post purgationem uti compos. caput ac nervos calfacientibus & roborantibus, ut sunt Aurea Alexand. Conf. Anacardina vel rad. acori aut zinziberis conditæ, laudatur & elect. diacastor. Nicolai.

Partes debiles ac tremētes ungendæ sunt oleis ut vulpino, lumbricorum, costino vel simili.

Victus rationem cal. & siccam observare eos convenit qui ex cruditate laborant: Reliquos verò talem qualis ante dicta est. quos & ab acidis & acetosis abstinere convenit & frigidum omnino vitare.

De

De Palpitatione.

CAP. 20.

Palpitationis est alicujus Lea. 37. Nov. II.
 partis præter naturam
 velox dilatatio & contra-
 ctio five elevatio & de-
 pressio. Differt à tremore
 quod hic quidem non ac-
 cidit nisi quum membra
 voluntariè moventur: pal-
 pitatio verò etiam in parti-
 bus jacentibus & non mo-
 tis contingit.

Contingit autem hanc
 fieri in palpebra, supercilio,
 musculo temporali & in
 alijs corporis: musculis &
 subinde sub ipsa cute. Iam
 & partes quæ tremunt non
 dilatantur aut contrahun-
 tur.

1. *Vt in sura, in brachio.*

Causa palpitationis est:
 crassus vapor & pro captu
 spatij multus, difflatu ca-
 rens, à frigido crassoq; hu-
 more procreatus, ad cujus
 generationem conferunt
 natura corporis frigidior,
 otiosa vita, satietas, temu-
 lentia, cibi frigidi ac flatuo-
 si, & non raro aëris con-

2. *Alioqui citò evapo-
 raret.*

Q s

stitutio frigida.

Curatio palpitationis fit partim per ea quæ frigidos humores attenuant, partim per ea quæ cutim rarefaciunt, partim per flatus discutientia.

Attenuantia sunt ut lavandula, thymus, origanum, majorana, pulegium & similes. Inter rarefacientia flores chamæmeli primatum tenent. Flatus discutiant sem. cumini, anethi, seseleos, & similia.

Ex horum aliquot sacculus impleri poterit, quo calente fovendæ sunt partes palpitantes. Profunt verò & cucurbitulæ parti palpitanti aut vicinæ sine scarificatione admotæ. Olea & inunctiones exiguum vel nihil profunt; Poros & meatus cutis facile occludunt, quos refert apertos & patentes esse. Victus ratio servanda qualis in alijs frigidiorib. morbis. Frequentes autem palpitationes + periculum minantur vel apoplexia, vel comitialis morbi,

3. Communia. nam chymica subtilia sunt. Multi præterea ut quibus pori exigui, non ferunt unctioes oleorum.

4. Sic quandoque duos observari ex palpitatione in apoplexiam incidisse. R. Dodon.

bi, vel etiam convulsionis,
authore Avicenna.

De Ophthal- mia.

CAP. 21.

Lect. 38. Nov. 14.

De morbis Oculorum.

Ophthalmia.

Ophthalmia sive lippitudo generali voce quævis oculi perturbatio dicitur, quæ cum rubore adnatæ tunicæ sive conjunctivæ accidit, & cum dolore in quo ab hypophagmate differt. nam hypophagma rubor est adnatæ tunicæ citra dolorem. Est autem ophthalmia quandoque minor, quandoque major. Minores ophthalmiæ à causis fiunt exterioribus ut à pulvere, à fumo, à vento, ab excedente

Causis externis est, ophthalmia non vera.

Oculorum
ophthal-
mia
vel est à

Humori-
bus
fluentibus

Sanguineis. tunc fit Inflammatio oculi. hæc intensa, habet symptoma χήμωσιν.

Acribus pruritum excitantibus si copiosi ὀφθαλμοειδής dicitur si erosa cornea uvea prominet sympt. proptosis est.

Aquosis Εμφύσημα.

Pituitosis

Salsis { *ἰσχυρὰ*
paucis { *ξηρὰ*
 { *οφθαλμία.*

2. Plurimorum oculis præcipuè perniciosus fuit rigor nivis insolitus. &c. Curt. l. 6. Xenoph. l. 4. expedit. Cyri.

3. Cayri ex septem millionibus & uno millione & sex millib. Iudeorum, vix tertia pars visum integrum habet. propter esum fructuū, aquæ potum, & sudorem ob cydari in regione calidissima ad oculos defluentem. accedēte & pulvere latearum non stratarum.

4. Neque ex alijs partibus fluunt ad oculos humores.

frigore, vel à nimio calore ut à balneo calidiore. Majores verò & molestiores ophthalmiæ à causis fiunt interioribus, ut sunt humores à capite destillantes ad oculos.

Humores autem in oculum fluentes, vel sanguinis naturam referunt, vel acres & biliosi sunt, vel pituitosi falsi.

Sanguinei humores ad oculos copiosius cōmeantes inflammationem oculorum excitant. Intenditur tunc oculorum rubor, palpebræ magis elewantur & non nisi cum magno negotio suspicere quis potest, aut lucem intueri. dolor verò etiam magis intenditur si acres aut falsi humores simul permixti fuerint. Quod si autem & omnino maxima inflammatio fuerit palpebræ tumentes invertuntur. adeo ut oculi ab ipsis vix contegantur & adnata tunica tumet ac sublimior evadit, quod accidēs chemosis dicitur.

Chemosis,

Ab

Ab hujuscemodi autem inflammatione succedente abscessu contingit oculum videndi facultate privari.

Acres autem ac biliosi humores vel pituitosi falsi pruritus & ardores cum dolore & rubore excitant. ab his verò & quandoque inflammatio præsertim sanguineo humore admixto, imminet.

Quod si verò hi humores largiter & diutinè fluât, & præcipuè pituitosi falsi epiphora affectio dicitur, per quam corneam tunicam exulcerari quandoque contingit, qua exulcerata succedit proptosis sive uveæ tunicae procidentia.

Humores autem pituitosi si aquosi si ad oculos fluant tumor succedit palpebrarum, sed mollis, laxis & citra dolorem & ruborem. palpebræ verò graviores redduntur & difficiliter moventur ac aperiuntur adnata verò tunica & quandoque simul tumens supra iridem oculi elevatur, & attollitur,

5. Effusis, ac locum multantibus humoribus & tunicis. quas etiam rugari in tali casu contingit. Puerulo uterque humor crystallinus per abscessum excidit, ut vidimus. Alij aqueo solum humore profuso post consolidationem oculus minor factus, & videndi usu destitutus est. Annibalem dum per paludes

in Hetruria item faceret, gravi ophthalmia,

Epiphora. quod quiescere curarique non posset, uno oculo privatum. Polyb. narrat. 3. l.

Proptosis.

6. Quæ paulum eminent myocephalon appellantur si magis staphyloma.

ἐμφύσημα. atque hæc affectio ἐμφύσημα dicitur.

Si verò humores pituitosi corrupti ac falsi eo delati fuerint, sed in exigua quantitate scabies succedit palpebrarum, quæ ψωροφθαλμία dicitur, & quandoque cum rubore pruritus, quem Aëtius ait ab oculi angulo circa nasum, incipere, & plerunque senioribus accidere & frequenter in æstate.

ψωροφθαλμία.

ξηροφθαλμία.

7. Communis palpebrarum ac oculi est affectio. Aëtius.

Lea. 39. Nov. 15.
Curatio.

8. Oculi urforum hebetantur crebrò, qua maximè causa favos expetunt, ut convulneratum ab apibus os, levet sanguine gravedinè illam. Plin. l. 8. c. 36.

Huic vicina est 7 ξηροφθαλμία .i. arida sive sicca lippitudo pruriginosa absque humorū fluore dispositio.

Curatio omnium oculorum dolorum qui à plenitudine & cum inflammatione fiunt à venæ sectione incipienda est. secanda autem est humeraria è directo laborantis oculi, si unus tantummodo affectus est. dextri verò brachij si uterque, vel etiam utriusque, si venæ sectio iteranda est.

Alij dolores & affectus pur.

purgantibus medicamentis
 curandi sunt qui ab humo-
 rum influxu fiunt. nec ta-
 men in inflammationib. post
 sanguinis detractionē pur-
 gationes negligendæ. Pro
 conditione autem & viri-
 bus laborantis & qualitate
 humorum peccantium pur-
 gatio faciendâ. profunt fre-
 quenter pill. cochiaæ, vel au-
 rea, vel aggregativæ, vel ex
 octo rebus: quæ plures di-
 versosq; humores educunt.
 faciendæ verò sunt & aliæ
 diversiones. Cucurbitulæ
 dorso cum scarificatione
 affigendæ. pedes in balneo
 ponendi ex decocto ebuli,
 betonica, salvia, & florum
 chamomeli in lixivio & ad-
 dito sale.

9. Oculorum phlegmo-
 nem alvi profluvium sa-
 nat. 6. Epid.

10. Probata etiam, sine
 quibus esse nolo pill.

Pedibus autem in balneo
 positis fricanda sunt crura
 deorsum, & faciendâ hæc
 manè ventriculo jejuno,
 nec semel tantum, sed sæ-
 pius, usque dum rubor &
 dolor oculorum cessaverit.
 Perserverante autē fluxio-
 ne ac doloribus, ac istis re-
 medijs parum proficienti-

11. Alioqui pleno ven-
 triculo si fiant, humores
 ex eo attraherentur ad
 loca affecta.

12. *Torlaquis Turcæ* in cervice ulcus cau-
panno veteri temporib. terio faciendum, atque hoc
inustis humiditates ce- quam diutissimè apertum
rebri exsiccant ne ad conservandum, aut appræ-
oculos fluant. quod hensa cervicis cutis cum
Æthyopes olim etiam carne perforanda est, &
facere solebant. immittenda ¹³ cordula ex

13. *Laquei injectionem* serico aut ex cannabe, aut
hanc curationem vocat in duris corporibus ex setis
Amat. Lusitanus. alij equinis, quæ per intervalla
Setaceum, vel Setonem. movenda. sinenda verò &
Efficacissimum sanè hoc cutis hoc modo pertusa ad
auxilium, nec tã, quam aliquod tempus, donec sa-
videtur, crudele. nitatem oculi receperint.

Victus in omni vehemē-
ti cum inflammatione ac
fluxione oculorum dolore,
initio tenuis esse debet &
parcus, postea liberalior &
plenior. Cibi conveniunt
facilis concoctionis ac bo-
ni succi. A vino etiam hoc
tempore abstinendum. te-
nui cerevisia aut ptisanæ de-
cocto potius utendum.

Cessante vigore morbi
vinum tenue aut dilutum
concedi potest. lactis usus
omnino improbatur ¹⁴. ab
omnib. etiam falsis & acri-
bus abstinendum. quies uti-
lis ¹⁵. sic & mediocris som-
nus,

14. *Vt & in omni affe-*
ctione capitis.

15. *Pila lippis inimi-*
cum & ludere crudis.

nus, atque locus à fumo ac vento tutus exiguum lucis habens. Aspectus viridis aut cærulei coloris & smaragdi lapidis visus instrumentum recreat. Alvum autem respondere oportet. quod si sponte non fecerit, adjuvanda erit mollib. enematis, aut glandibus suppositis, vel ut Aëtius ait, aloë exhibenda cum brassicæ succo trita.

Vt autem ad localia veniamus si pulvis molestus fuit aqua dulci simpl. vel in qua maceratum sit semen lini oculus sæpius ablundus, vel in eum mittendus lapis ¹⁶ saphyrus tenuis & bene politus, qui sordes & pulverem ex oculo excutit, quod & facere semen scarlæ orvalæ Antonius Mizaldus scribit.

Ab alijs verò externis causis lippitudine facta, quando non omnino sicca est, sed aliquid etiam humoris ad oculum confluit utilia sunt quæ citra morsum resiccant, ut pompho-

Ex pulvere,

¹⁶. Describitur à Macro. item Valescus de Taranta refert, idemq; tribuit rubino. Quidam cui ex itinere redeunti oculi pulvere repleti omnē, v. saphyri intra horæ spatium excussit. R. Dod.

R

17. Vera tutia est pompholyx. tutia quam durum dico est spuria que tudiculis adheret quando æs coquitur. ligatur in nodulo & eo aquæ rosaceæ intincto illinuntur oculi.

Leet. 40. Nov. 16.
Ophthalmia
vera.

18. Vel Sief albū Rhabdis. & Gummi arab. tragacantha, amydi ana ʒ 1. cerusa lotæ ʒ 1. β opij g. 7. cum ovi albumine fiat collyrium. usus tempore cum lacte muliebri ʒ 2. dissolvantur. Mez. sarcocollam insuper habet.

19. Quamvis in magna necessitate opium, etiam admitti posset.

20. Refrigerat & dolorem sedat.

lyxlota, & 17 tutia dura præparata quæ in aqua rosacea dissolvenda; quæ aqua deinde sæpius in oculum immittenda addito vino albo tenui, si nullus in oculo calor sentiatur.

Quando verò oculi inflammatione ac χημώσι laborant generalib. non prætermisiss admovenda erunt initio ea quæ partim dolorem sedant, partim influentem humorem reprimunt. quandiu videlicet humores profluentes copiosi ac tennes sunt. Accipiat igitur collyrium sive sieph 18 Mezues album absque 19 opio compositum, quod dissolvatur in aqua rosarum & lacte muliebri, & de ista 20 mixtura frequenter gutta una aut altera in oculum immittatur. Vtilis & mucago sem. psyllij, sem. cytoniorum & gummi tragacantha facta cum aqua rosarum cui additur lac muliebri & immittitur in oculos ut prius.

Madefiant quoque telæ
lineæ

lineæ in istis & applicentur oculis extrinsecus, aut ex hujusmodi muccagine & ovi albo addito Sieph prædicto fiat²² cataplasma, prius tamen tela linea madefacta in²³ lacte muliebri oculis superposita. finendum autem cataplasma 4. aut 5. horis, ²⁴ deinde amovendum & renovandum. & tale cataplasma utile quoq; est in oculorum epiphoris.

Quando verò²⁵ humores qui fluunt pauciores fuerint & crassiores facti notam concoctionis ostenderint, fovēdi subinde oculi erunt cum decocto seminis fœnugræci, quod & collyrijs & cataplasmatibus supra dictis utiliter etiā tunc admiscetur²⁶. Quando verò²⁷ humores adeo crassi fuerint ut dormientium palpebræ inde agglutinentur à primis illis collyris abstinendum; sed decocto sem. fœnugræci & florum meliloti oculi fovēdi & ablueri. Commodum verò & in

21. Singulare in doloribus oculorum sedandis extrinsecus admotum. Hinc Antonin. ad philosophiam tanquam ad pædagogum (à quo mentuas) sed ut Ophthalmia laborantes ad spongiam & orum (à quib. leniendum dolorem speres) itandum esse. l. de Vita propria.

22. Seu Epithema potius.

23. Seorsum admoveatur, ne molestiam pariat dū admoveatur epithema superscriptum, quod pilis sit agglutinandum.

24. Ne calefactum per accidens calfaciat partem, quod & in plumbo, si alicui parti admoveatur, cavendum.

25. Atque tunc est augmentum morbi.

26. Ut partim discutiantur, partim reprimatur fluxus.

27. In statu hæc fieri solent.

R 2

oculos guttatim tunc immittere decoctum feminis fœnugræci & fem. fœniculi in parva quantitate, cui additum sit nonnihil gummi tragacanthæ, & lac muliebri, si dolor adhuc perseveret.

28. In declinatione. ad roborandum, ut &. partes 4. aquæ rosacæ. vini unam. & paucum mastiches.

Cessante 28 autem omni fluxione & dolore oculi vino albo & aqua rosacea dieb. aliquot erunt ablundi, aut aqua fœniculi aut chelidonij.

Cōvenit verò & uti collyrio ex pompholige, aut tutia dura præparata, de quo jam ante dictum est.

Scabie verò laborantibus oculorum palpebris, quod *Psorophthalmia*. *ψωροφθαλμία* dicitur, & ex vitiosis eo confluentibus falsis humoribus fieri contingit, corpus omnino purgandum erit per aliquas ante dictarum pilularum.

Oculi verò fovendi & abluendi erunt decocto sem. fœnugræci & malvæ aut althææ. palpebræ postea illinendæ aloë dissoluta in vino

vino albo & tenui, aut in aqua fœniculi. Si autem lippitudo ista diuturna fuerit & ægrè curabilis, fumendum erit decoctum fumi terræ ex fero lactis aliquot continuis diebus, æstate quidem.

Hyeme verò ejus loco fyr. de fumo terræ. & pillulæ subinde repetendæ.

Sicca verò sive arida lippitudo, qualē venti faciunt aquilonares, & constitutio aëris frigida & sicca, tepidis ac humentibus balneis ac fomentis etiam curatur: ut est decoctum malvæ, bifmalvæ, & seminis lini.

ξηροφθαλμία

Suffusio sive ὑπόχυμα vaporum vel humorum sub cornea tunica est collectio, pupillam obscurans. Cujus 3. sunt constitutiones. 1. Est vaporosa quædam effusio quæ spiritus visorios disgregat & obtenebrat, facitque ut muscæ, festucæ, vel alia præ oculis obversari videantur, vel alterius coloris res esse appareant quam sint.

Leet 41. Nov. 17.
ὑπόχυμα.

29. *Venas ab oculis per-
tingere ad cerebrum,
peritissimi autores tra-
dunt. ego ad stomachū
crediderim: certè nulli
sine redundatione illius,
ervitur oculus. Plin. l.
11. c. 37.*

30. *Vel ob atrophiam
nervi optici, vel sangui-
nis in illū pemptosin,
vel humorū post tenuio-
rum partium dissipatio-
nem, crassitiem. Dionys.
Ægeus in Dictyacis
apud Photium in bi-
blioth.*

Atque hujuscemodi suf-
fusio quandoq; fit per con-
sensus & vitio ventriculi,²⁹
alias verò propter cerebri
plenitudinē. Quæ à ventri-
culo fit nō continua est, sed
per intervalla & circuitus
accidit, & magis vētriculo
jejuno quā post cibum sum-
ptum, & frequentius etiam
quando ventriculus malè
concoquit, quam ubi bene
concoctio cedit. Quæ au-
tem à cerebri plenitudine
procedit magis continua
est, nullo tamen adhuc ma-
nifestè apparente circa pu-
pillam vitio. Altera consti-
tutio est quum jam incref-
cente malo nubecula ali-
qua circa pupillā apparere
inceperit, & videndi acies
magis obtundi. 3. Consti-
tutio est quum pupillæ co-
lor ad albedinem conver-
sus est, & videndi facultas
abolita quæ affectio³⁰ glau-
coma dicitur. Huic vici-
na est affectio ἀμαύρωσις
dicta .i. cæcitas & absolu-
tum visus impedimentum,
nullo manifesto affectu ap-
parente

parente, ³¹ & pupilla pura ac incolumi existente, in quo à glaucomate differt. Contingit autē hanc quandoque sensim & paulatim etiam fieri, subinde tamen repente & uno impetu irrui. Quæ paulatim fit priusquam confirmata & absoluta cæcitas facta fuerit ἀμβλυωπία dicitur & hebetudo sive debilitas visus.

Causa vel frigidi crassique humores, vel penuria aut imbecillitas spiritus visorij, vel tunicarū siccitas & densitas, ut post magnum morbum, vel à mœrore, vel propter senectutem fit.

Quæ subito irrui cæcitas fit à repentina nervi optici sive visorij obstructione cujus antecedentes causæ possunt esse cruditates, temulentia, & similes quæ crudos humores ingenerant.

Suffusionib. igitur à ventriculo factis exhibēda subinde est hiera picra ut Gal. suadet, ut vitiosi humores expurgentur. bona victus

31. Quare etiam barbaris Gutta serena dicta fuit. Quibusdam statim nascentibus negatus visus nullo oculorū vitio. multis repente ablati simili modo, nulla præcedente injuria. Plin. l. 11. c. 37.

Carneadi ignorant. Id oculos suffusione occæcos Diog. Laert. narrat. lucernam itaque quum afferri mandasset, & famulus allatam diceret, ut falsitatis illum, uti credebatur argueret, legere iussit.

Curatio suffusionis.

R 4

ratio instituenda & ut ventriculus bene concoquat providendum.

Quando verò suffusio non ex vitio ventriculi, sed ex plenitudine humorum in cerebro redundantium provenit, initio & priusquam affectus invalescat corpus idoneis medicamentis vacuandum est. Vena etiam secanda si sanguis redundaverit. Cauterium quoque in cervice ponendum. Frictiones & balnea facienda ut in oculorum inflammationibus, & alvus quoque in officio continenda, ut supra dictum.

Sunt verò & hæc facienda in ἀμβλυωπία quæ non post longum morbum aut propter senectutem advenit, sed ex crudis crassisque humoribus corpore repleto vigente adhuc ætate contingerit.

Exhibenda verò etiam sunt quæ cerebrum reficere & spiritus visorios confortare valeant, quæ non modo junioribus post vacua-

uationes & diversiones factas, sed & ex gravi morbo restitutis & senescentibus. tutò dari possunt. Laudatur inter alia euphragiæ herba & fœniculi semen ex quibus in pulverem tritis addito nonnihil maceris, vel etiam cubebarū & faccaro quantum est omnium pondus fit tragema, ex quo jejunis cū exiguo albi & tenuis vini ad quantitatem cochlearis exhiberi debet. Parari verò & vinum tenue cum euphragiæ herba potest. cujus quotidianus usus oculis & visui prodest.

Collyria verò etiam initio & quum nubeculæ ante pupillam apparere incipiunt in oculos injici possunt, quæ partim discutienti ac digerendi vim habeant, partim astringendi: qualia sunt ex ³² fellibus avium ut accipitris perdicis, columbæ aut similibus, & omphacio aut succo ³³ granatorum. quibus quandoque vel ³⁴ sarcocolla in ³⁵ lacte nutrita, vel aloë ad-

Leet. 42. Nov. 21.

32. Quia aliquid oportet esse quod penetret quā materia sit sub cornea tunica, sel autem tenuis substantiæ est, & magis aviū sylvestrium.

33. Ad robur partis nobilis conservandū. quod commune præceptum ad omnes partes nobiles.

34. Quæ absterget & astringit.

35. Ut acrimonia leniatur & ita dolor quodammodo sedetur.

R 5

ditur. Vbi autem nubecula major facta fuerit & albugo sive glaucoma perfectū ad cumpunctionem & manus operationem veniendum, quæ ophthalmiacis committenda est.

An autem suffusi & jam glaucoma in oculis habentes per cumpunctionem restituendi sint, vel non, docet cognoscere Gal. I. de sympt. causis, ex dilatatione pupillæ³⁶ unius oculi altero clauso. nam quum uno oculo occluso alterius pupilla dilatatur recipiendi visus magna fiducia est.

36. Quia spiritus utriusque ad unum qui apertus, defertur. & tunc manifestò dilatatur pupilla. quod si non fiat obstructus
est nervus
opticus. tunc frustra cruciaretur æger.

Amaurosis.

37. Omnia eadem die & simul facienda sunt. nam humore semel impacto, malum incurabile existimandum.

In amaurosi autem & visus obscuritate quæ subito irruit mox & sanguis, si vires ferant, mittendus est ex humeraria vena. enemata etiā acria injicienda³⁷, cucurbitulæ cum scarificatione humeris admoventur. ex cantharidib. cum fermento in acetum madefacto vesicatoriū toti cervici imponendum. crurum frictiones faciendæ. medicamenta purgantia non prætermitt-

mittenda.

Victus ratio initiò tenuis esse debet. Posteaquam videndi facultas aliquo modo reparata est, magnā sui curam æger habere debet. ab omni repletionē, à multi vini usu, & ³⁸ à venere illi abstinendum. in cœna parcum admodum esse oportet ³⁹. pisces, fructos crudos, legumina ⁴⁰, allium, cæpas, porrum & lac vitare etiam debet. carnes volucrum silvestrium non circa aquas versantium maxime conveniunt. Oculis nihil admovendum ⁴¹, nisi quis aqua sceniculi aut euphragiae hos velit abluere.

Caput verò & oculos roborantia utiliter dari possunt, veluti ex euphragia tragema de quo dictū est.

Pertinet verò ad hæc oculorum vitia nyctalops quæ est nocturna quædam cæcitas. hoc enim vitio laborantes interdum quidem vident, sub occasum solis obscurius, nocte verò exiguum aut nihil,

38. Hinc illud : Vale charum lumen, Et illud Martalis ; Vinū Phryx, oculus bibit venenum.

39. Omnes enim crudos humores, nullo excepto, ingenerant.

40. Non crudos gignunt humores, sed oculis nocent per se.

41. Ne revocentur humores ad oculos.

Nyctalops.

42. *Vt in senib. aut post magnum morbum. alias à cruditate ventriculi ferè. morb. non ita præceps ut in amaurosi. unde non ita festinandum.*

43. *Quia est quasi suffusio quedam.*

44. *℞ Succi chelidonij, mellis despumati ana ℥ 4. succi fœniculi ℥ 2. vini albi ℥ 1. misceantur & super calidos cineres leviter coquantur addantur dein fellis perdicis ℥ due vel tres.*

Causa mali ⁴² vel spiritus visorii paucitas & debilitas est, vel crudorum humorum copia & redundantia.

Hæc si adsint med. purgantia subinde sumenda sunt, veluti initio suffusionis. Ratio victus & similis esse debet. cœna etiã parca. Roborantia & confortantia spiritus visorios sunt quoque utilia.

Commendantur & collyria ⁴³ non admodum ⁴⁴ acria ut ex succo chelidoniæ, succo fœniculi, & melle, & exiguo vini, quibus si addatur nonnihil fellis perdicis, erunt præstantiora.

De Angina.

CAP. 22.

Leet. 43. Nov. 22.

1. *Faucium dolor Angina vocatur, Festo. Synanche inflammatio vehementes est circa Epiglossida & pharyngem, dolorifica. Iul. Poll. Hinc illud apud Plautum; Vellēm me in anginam verti, quo huic anni fauces*

A Ngina, dicitur affectio quæ cibi ac potus liberam deglutitionem impedit & respirandi difficultatem simul affert. hæc autem vel interior est, vel exterior & circa guttur aut cervicem apparens. Interior angina duplex est. una fit

fit cum tumore vel inflammatione circa fauces aperto ore apparentibus. altera vera citra ullum apparentem tumore, quæ latens & occulta angina ea de causa dicitur. Tumores autem qui hiante ore apparēt sunt ut plurimum tonsillarum tumores, quandoque etiam gurgulionis. affert verò & impedimentum linguæ inflammationis tum & *Βαρεγ*. *χ* & five ranunculus dictus affectus, sed tamen exiguum.

præoccuparē. Est autem & Angina vinaria; & Argentangina, de quib. tamen alibi dicendum. Aliquando Epidemia est, & vel Benignior, qualem nos vidimus; vel Maligna & pestilens, qualis illa de qua Cedren. testatur quod tam multos tolleret, ut superstites mortuis effendis vix pares essent anno mundi 5018. anno à nato Domino 1040.

Exterior affectus est circa gutturis partes aliqua magna inflammatio, vel vertebræ colli ad interna luxatio, locum in cervice cavū relinquens; quæ gravissimum respirationis & cibi demissionis impedimentum affert. & pro deplorato malo, cui nō est remedium, habetur.

Tonsillarum autem tumores aliquando majores, quandoque minores sunt, subinde verò & una tantummodo tonsilla tumet.

Paristhmia.

2. *Bilioſi enim exulcerationem non tumorem excitarent. Melancholicorum nemo meminit.*

3. *Sed talis remanet qualis in ſanitate fuerat.*

Curatio.

Cauſa ut plurimum ſunt humores ſanguinei quandoque etiam pituitoſi.

A ſanguine ſi tonſillæ tumeant, accedit partium ad fauces & iſthum pertinentium rubor & inflammatio cum dolore, præſertim in deglutiendo: qui ad aures uſque extenditur. comitatur ſpirandi difficultas & ſæpenumero etiam febris. intenditur autem interdum tumor cum inflammatione in tantū, quod os vix aperiri queat. ſed quū à pituita tumor fit partium color non mutatur, neque inflammatio aut febris accedit. adeſt tamen in deglutiendo difficultas.

Incipiente itaque inflammatione tonſillarū ſanguis mox detrahendus eſt ex humeraria vena partis affectæ, ſi una tantummodo ſit inflammata. ſi utraque & ſanguis redundet iteranda erit detractio ex altero brachio, præſertim ſi tumores non ſubfederint.

Deinde purgans aliquod med.

med. propinandum vel enema injiciendum.

Cucurbitulas circa humeros ac cervicem cum scarificatione admoveri utile etiam est.

4. *Quæ in debilibus qui-
que sanguine non abun-
dant, solæ sufficiunt.*

Gargarismis autē & oris collutionibus utendum primum est reprimentibus & astringentibus, ut ex decocto foliorū rubi, aut summatum, fol. ligultri, cort. malorum punicorum, calicibus glandium, rosis rubris aridis cui addendum est diamorum vel ex corticibus nucum compositum quod Officinæ dianucum vocant, & nonnihil aceti. nisi qui laborant extenuato sint corpore & pectore angusto, quibus acetum addi gargarismis non convenit. Possunt verò, & gargarismi fieri ex aquis destillatis ut plantaginis, polygoni, equiseti, & similium, addito diamorum vel dianucum & similib. & sufficiunt quandoque hujusmodi gargarismi soli quando una sola consilla citra inflammatio-

5. *Quæ quandoq; man-
se in parvis inflamma-
tionibus solæ profunt.*

Lect. 44. Nov. 24.

nem & magnum dolorem non valde tumet.

6. *℞ Fol. bifmalvæ, scabiosæ ana m. j. ficus aridas. N. 10. uvarum pass. glycyrrhizæ mundatæ ana ℥ β sem. lini. ℥ 2. vel ejus loco seminis fœnugræci. nucleorū ex bulbis liliorum ℥ 2. fiat decoctio ad ℥ 1. β. sepe aliquid in ore teneatur. Lac cum semine lini coctum quamvis non ita utile, in necessitate tamen illo uti possemus.*

Quando verò tonsillarum cum inflammatione tumores adeo increverint ut os aperiri nequeat & dentes ferè cohereant, neq; per astringentia & reprimētia tumores remissi sint: proximum erit ut inflammationes ad suppuracionem perducantur. quod fiet per gargarismos maturantes ut ex decocto foliorum bifmalvæ, scabiosæ, caricarum, uvarum passarum & rad. glycyrrhizæ. addito sem. lini vel fœnugræci & si fortius desideretur aliquot nucleis ex bulbis liliorum additis, quæ in aqua decoquenda sunt ad cōsumptionem ad minus tertiæ partis, atque ex hoc decocto tepido sæpius in ore aliquid detinendum & gargarizandum est. Potest verò & gargarismus fieri ex rad. bifmalvæ cum caricis & uvis passis decoctis in aqua, cui ut fortior fiat, potest addi mel scylliticum.

Cata-

Cataplasma verò & foris ad collum sub mento & circa mandibulas admo-
vendum est ex farina hor-
dei, sem. lini, & fœnugræci,
& rad. althææ decoctis &
fermento veteri; quando
fortius desideratur, vel etiã
nucleis radicum liliorum,
quæ coquenda & miscenda
sunt cum aqua decoctionis
rad. althææ, deinde adden-
da vel pinguedo porcina,
vel oleum amygdalarum
dulcium, & simul aliquid.
ung. 7 dialthææ.

Abscessu autem per hæc
remedia rupto, pure effluẽ-
te & ore libere patẽte, tunc
gargarismus faciendus ex
decocto hordei communis
non mundati: cui adden-
dum aliquid mellis rosati,
quo frequenter fauces ab-
luendæ erunt.

Quod si verò ulcera
difficulter sanescant, addi
conveniet gargarismo ali-
quid succi vulgaris apij, vel
ejus compositionis, quam
vocant mundificativum ex
apio. 8 sic enim facilius ul-

7. Vt & Rad. althææ de-
coctarum ad mollitiem,
farinæ hordei, sem. lini,
fœnugræci ana ℥ β. fer-
menti veteris ℥ 2. vel si
fortius cupimus ℥ β. aut
nucleorũ liliorum ℥ β.
miscantur & decoquun-
tur cum aqua decoctio-
nis althææ. quib. deinde
addantur rad. althææ
contuse, & pinguedinis
porcinæ ℥ 1. vel ol.
amyg. dulcium ℥ 1. vel
ung. dialthæas ℥ β.

8. Quod fit ex succo
cleoselini & melle.

S

cera coalescent & sanabuntur.

9. *Quando humor partim frigidus, partim sanguineus.*

Quod si vero tonsillæ per astringentium usum & factis vacuationibus non subsideant, neque augeantur sed cessante magna ex parte rubore ac inflammatione in eodem statu tumores consistant; gargarismi parandi erunt ex digerentibus. & discutientibus, ut ex decocto scabiosæ & præcipuè ex herbæ morsus diaboli dictæ. cui si aliquid mellis rosati additum fuerit erunt gratiores. Quod si verò & majore resolutione opus sit gargarismo convenienter addetur cinis¹⁰ hirundinum ustarū, vel deficiente illo, radicis cavæ pulvis. Possunt verò & pulveres horum gutturi insufflari.

10. *Tertij generis ripas incolentium quæ nidos non habent. Plin. l. 10. c. 33.*

Foris verò & cataplasma imponi utile erit ex farina hordei, seminis lini, fœnugræci, floribus chamæmeli & meliloti & stercore¹¹ ex nido hirundinum, vel canino stercore albido, cū oleo & aqua

11. *Ipse nidus, ut quidā putant materia magis impingeret.*

& aqua decoctis. Vel potest fieri cataplasma ex stercore canino, vel ex stercore hirundinum, vel ex ipsis hirundinib. uſtis, mixtis cum melle, quod circa mādibus collo erit applicandum.

Sed ſi humores frigidi ac pituitoſi ad tonſillas ac partes ad iſthmum pertinentes confluant tumentes citra ruborem, mox purgans med. exhibendum. inter quæ quod diaturbith cum rhabarb. dicitur utile ac commodum eſt, cujus ſpecies 3 1. aut ad ſummū 4. pondere cum tenui cereviſia, aut juſculo aliquo, addito ſaccharo exhiberi poſſunt. Et ſi opus fuerit gargarismo, uti licebit decocto folius morſus diaboli cum melle roſato. vel potest addi pulvis rad. cavæ & cinis hirundinum ut ſupra dictum 13.

Inflammato autem gurgulione atque cum dolore & rubore tumente, & cum difficultate deglutitionis, adhibendi ſunt gargarismi

Lect. 45. Nov. 256

12. Quod Arabes pro correctorio turbith. quod non pulveri qui ſitum contraheret ex humiditate ſacchari, ſed quum exhibetur, addi dicitur.

13. Tumores iſti aliquando in Schirrhū; imō materia ipſorum in lapillū abit, quales inſtar nucleos olivarum ſemel atque iterum ſcalpui unguium prorupiſſe vidimus.

S 2

14. Qualib. Columnnam, ut Aretæus vocat. h.e. tumentem à radice ad extremum columellam digiti crassitiem equallem, & ad principium Oesophagi jam descendente, curavimus. rejecta sectione ab alijs proposita.

15. Quod tamen raro contingit.

astringentes & reprimentes ut in principio inflammationis tonsillarum¹⁴. Et siquidem corpus repletum ac humorum multitudine gravatū, sanguis etiam ex humeraria detrahendus erit. Sin minus, & vitiosi humores redundarint, purgans etiam med. exhibendum. Si verò & inflammatio hujus ad suppurationem¹⁵ tendat, maturantibus supra dictis gargarismis quoq; erit utendum.

Vva.

16. Tum ad naturam illa pars livens redire non potest. sed tollendam esse certum est. In Norrvegia frequentissime columellam exscindunt, magno, ni fallor, agrorū malo, ferè enim in tabem incidere necessum est.

Quod si verò longior propenderit, & inferius crassior ac livens¹⁶, superius vero extenuatus, neque ad suppurationem perducipotuerit, & non proficientibus quoque quæ ad laxatam columellā conveniunt: tunc adhibendam ait Hipp. 3. prædict. manus curationem, quæ antea non absque periculo fieri potuit.

Gurgulio.
nisi laxatio
seu colu-
mella.

Laxato autem gurgulione & absque rubore, tumore, ac inflammatione longius propendit, adhibere convenit non modo astringen-

gentia, sed præcipuè resic-
cantia & discutientia. Pul-
vis hirundinū ustarum utilis
est, sive per se, vel cum mel-
le mixtus admoveatur, sic
& radix cava cum sale per-
mixta & admota. Potest
verò & multum gargarif-
mus ex ¹⁷ posca cum sale &
sinapeos semine, vel ejus lo-
co condimento ex sinapi,
quo citò laxatus gurgulio
contrahitur.

Lingua si inflammetur &
cum dolore & rubore tu-
meat: eadem sunt adhiben-
da, quæ tonsillis laboranti-
bus. & si quidem inflamma-
tio ad suppurationem per-
venerit, neq; ¹⁸ queat sponte
erūpere: scalpello aperi-
endus erit abscessus. dein re-
liqua facienda quæ in ab-
cessu tonsillarum.

Ranunculus tumor est in
ea oris parte, quæ sub lin-
gua & cui veluti vinculo
ipsa annectitur, mollis, la-
xus, citra dolorem, rubo-
rem & inflammationem,
qui supra dentes eminet, si-
militudinem referens po-

*17. Vel cerevisia tenuis:
si quis nolit acetum. est
autem valde singulare
in affectu hoc: quæ vulgo
den buych nominant.*

*Lingua
inflam-
matio.*

*18. Quod sit quia mem-
brana involvens linguā
dura admodum est.*

*Ranunculus.
seu ranula
barbaris.*

19. Non in medio. ob membranam quæ alligat linguam. si ab una tantum parte, ab una tantum efflueret.

20. Quia uno die non possunt exhauriri humores. prohibet hæc agglutinationem.

21. Hæc glutinant.

22. Ut in illo qui ranunculo & inflammatione tonsillarum laborabat.

23. Qui alioqui rarissimus affectus.

Leç. 46. Nov. 24.
Angina latens.

24. Hanc horrendissimam Hipp. appellat.

25. Quod deorsum trahatur distensione arterie, in deglutitione quæ tum laesa, movetur sursum larynx.

sterioris partis ranæ, unde nomen habet.

Curatio hujus citissime & perfectissime manu perficitur, scalpello¹⁹ utrinque tumorem aperiri oportet, quo aperto effluit humor mucosus, lentus, & ovi albo similis. os deinde abluendum²⁰ posca cum sale donec humor omnis effluerit. quo expurgato aqua hordei²¹ cum melle rosato os colluendum.

Quod si quid impediat quo²² minus in ore tumor aperiri queat: sub mēto facienda sectio est. Præcedit hunc²³ affectum frequenter dentium inferioris mandibulæ dolor.

Latens ac occulta angina dicitur²⁴ quando nullo in faucib. apparente tumore, aut inflammatione cibi ac potus via præcluditur & respirationis adest magna difficultas. dolet per hanc anginam larynx sic ut citra dolorem contingi nequeat, & nec sursum aut deorsum²⁵ moveri queat nisi cum summa

summa difficultate ac labore. Causa mali est copiosus ²⁶ humor ex capite in pulmonem & asperam arteriam defluens, & ramos ejus implens atque distendens. unde fit ut distentis arteriæ ramis larynx moveri nequeat.

Curationis initium à sanguinis ²⁷ detractiōe faciendum. quæ etiam si necessitas urgeat & vires ferant, reiteranda erit. Enemata quoque injicienda & quam primum integrum fuerit medicamentum aliquod purgans exhibendum. Cucurbitulas etiā dorso ²⁸ applicari convenit. Gargarismi autem non reprimentes neq; astringentes ²⁹ esse

26. Nulla inflammatio nam muscoli tam exigui ut non possit magna ibi fieri inflammatio. neque ejus ulla nota in dissectione apparet.

27. Quia nullam aliam occasionē habemus. unde & in cacoehymico mittimus.

28. Cels. etiam mento & circa fauces admovent; ut id quod strangulat evocetur. Utinam est, inquit, incidere satis altis plagis sub ipsis maxillis supra collum, & in palato citra uvam, vel eas venas quæ sub lingua sunt; ut per ea vulnera morbus erumpat. quib. si non fuerit ager adjutus, scire licet

malo eum victum esse. l. 4. c. 4. Cæl. verò Aurelian. ex venæ sectione sub lingua tantum boni fieri non potest, quantum mali ex strictione colli; quæ fit mappa ut venæ appareant: nam strictio non fit sine maximo dolore, qui fluxionē concitat magis. & revera quàm destillent humores non convenit sectio.

29. Ita enim retento humore strangulantur ægri. utuntur omnes astringentibus. excepto uno Cælio Aureliano, idque pessimè. Archigenes etiā quamvis astringentia adhibeat; in occulta tamē angina garg. ex sinapi probat. sic & Aræta.

30. Quo solum usus sum.
R.D.

31. Rarò tamē sine febre
est. ac tum fieri potest ut
sit sine febre quādo san-
guis in tempore detra-
ctus fuit.

32. Non tamen adeo ne-
cessaria hæc sunt.

Lea. 47. Nov. 29.

debent, sed dulces & ex-
pectorantes, ut est deco-
ctum 3^o uvarum passarum
vel glychyrrizæ. hydrome-
li, vel aqua cum saccharo
decocta. Laudatur & de-
coctum radicum althææ &
myxarum seu jujubarum,
palmularum pinguium. Et
si non adsit 3^a febris, admit-
titur & vinum mulsum, vel
vinum cum saccharo; sed
absque aromatis paratum.
Foris collum ungendum 3^a
erit oleo amygdalarum dul-
cium, vel oleo ex sem. lini
recenti, butyro recenti abs-
que sale, pinguedine capo-
nis, aut gallinæ, aut aliquo
horum simili: quod habeat
vim leniendi & molliendi,
& circumponēda lana suc-
cida.

Anginæ autem occultæ
sive latēti superveniens do-
lor lateris, cessante magna
ex parte circa collum &
fauces dolore & difficulta-
te deglutiendi & respiran-
di, anginā in peripneumo-
niam conversam esse ostē-
dit. Conversio autem hæc
fit

fit, non quod purulenti humores rupto jam circa laryngem ³³ abscessu in pulmonem destillaverint, sed alia de causa, ex transitu videlicet humorum ad alias pulmonis partes, prius male affectas, quæ affluente humorum copia distentæ dolorem excitant, ³⁴ qui in latere sentitur. Periculosa autem & perniciofa admodum est hujusmodi permutatio. nam quibus contingit, vel citò moriuntur, vel suppurantur, ut Hipp. scriptum reliquit 10. aph. 5. particulæ.

Remedium autē ad hujusmodi lateris dolorē non aliud est, quā fomentum ex flor. chamæmeli, meliloti, anethi, folijs bismalvæ, sem. lini in sacculo cōsutis. qui in aqua decoctus expressus calidè loco dolenti admovendus est, & unctio cum ol. amygd. dulcium vel solo, vel addito ung. dialthæas, vel alio simili dolore leniente.

Ad anginas referri po-

33. Qui magnus esse non potest, dein pus tam citò non corruperet pulmonē, nam qui ex pleuriticis empyici fiunt, quamvis maxima sit humorum copia, tamen Hipp. ait per 40. dies pulmonem adhuc manere integrum.

34. Pulmonis πᾶσέῃ χυμᾷ non dolet, sed membrana tensa, quam vomica rumpi periclitatur. quam semper in dolente inveni latere. Pauci autem perveniunt ad 7. diem, quod Hipp. ait. unam vetulam, quæ supervixerit lateris dolori, novi.

35. Quod non sæpè prodest tamen ut satisfiat ægro, aliquid faciendū, ac prohibendi ab omni frigidorum usu, ut in omni laterum dolore.

36. *Vel acicula, qualem per triginta quasi dies circa hæc loca hæsisse animadvertimus.*

37. *Quum aliquid non infixum est difficulter transit, ut cuidam qui medium dalerum deglutierat. exhibenda lubricantia ut cerevisia omnis crassa ut Gedana, decoctum extremitatum animalium, malve, altheæ, omnia juscula pinguia. Ex frustra carnis bubule nervoso & crudiore suffocari quãdam vidimus.*

Externa
angina.

test & œsophagi inflàmatio. quæ ab officulo aliquo veluti piscis ipsi inhærente ac pungente ³⁶ excitatur. per hujus enim inflammationem cibi & potus via impeditur, sic ut potus per nares resiliat respiratione tamen satis libera.

In hoc casu tutissimum est gargarismum in ore detinere & quantum fieri potest etiam demittere, qui inflammationem citissimè ad suppurationem perducatur. & talem quidè qualem dictum est adhibendum inflammatione tonsillarũ ad suppurationẽ tendẽte. Abscessu rupto aqua hordei cū melle rosato utendum ³⁷.

In tumore autem cum rubore & inflammatione foris circa guttur apparente, quæ *παρὰ τοὺς ὤφθαλμοις* dicitur generales quoq; vacuationes faciendæ sunt pro conditione & viribus ægrotantis. Tumori verò cataplasmata adhibenda, non quæ reprimāt aut reperiunt, ut in inflammationũ principio

cipio fieri solet, sed maturantia tantum, & humores evocantia, & inflammationem ad suppurationē perducantia admovenda sunt, nam ut Hipp. ait, tumorem in angina & ruborem foris verti bonum est.

De Destillatione ac Tussi.

CAP. 23.

DEstillatio sive κατάρρος Lect. 48. Decemb. I.
generaliter dicitur humorū ex capite in aliquam inferiorem partē influxio. quæ pro partium diversitate fluxionē recipientium nomēclaturas differentes accipit, ad oculo epiphora, ad nares coryza, sive gravedo; ad fauces & asperam arteriam, branchos, sive rauco; ad pectus & pulmonem catarrhi ac destillationis nomen retinent, quæ multarum pectoris & pulmonis affectionum causa est, ut tussis, orthopnææ, asthmatis, phthisis & aliarum.

1. *Dianam* Χελύπδα Spartani colebant. tussire enim ipsis χελύπειν dicebatur. Clem. Alexandr. in protreptico. Huc etiam κέγχυς, quam nos orillam tussim vocamus, referendus.

Contingit tamen has affectiones non semper à destillatione, sed quandoque & ab alijs causis pervenire ut suo loco dicendum.

Causæ.

2. Tum quod cerebrum instar spongiæ madentis compressum, humorem, quem continet, elidat: Tum quod ut potentia frigidum, à frigido aëre ledatur, & alimēto destinatos humores, crudeos relinquat.

Causa autem catarrhi si-ve destillationis procathartica quidem si-ve primitiva, frequentissimè est externum frigus: ut à vëto Aquilonari, aut alia occasione, præsertim si præcesserit australis humida & pluviosa constitutio, ut ostenditur aph. 1 2. lib. 3. Sic & omnia quæ caput calfaciunt ut balneum, exercitium vehementius, tegumentum calidius, destillationē faciunt: si frigus postea admittatur, Antecedens verò causa catarrhi est frigidum & humidum cerebri excrementum. quandoque verò & tenuis mordax ac salsus humor.

Signa.

Frigidos autem esse humores qui destillant ostendit ipsorum copia, & sapor dulcis aut insipidus. ad hæc faciei tumor & color pallidus, corporis temperam.

ftigi-

frigidum, ætas senilis, locus habitationis humidus, aëris constitutio similis, & plenior ac humidior victus ratio. Caliditatem autem humorum ostendit acris, aut falsus sapor, narium pruritus, faciei rubor, temperamentū calidum, ætas, anni tempus, aëris constitutio similiter calida.

In omni autem destillatione ad quamcunque corporis partē humores fluant, evacuatio facienda est & purgantia med. exhibenda: pro cōditione peccantium humorum, habita ratione virium ægrotantis. Curatio.

Capiti verò, quod membrum est mandans, providendum est. in mediocritate caloris conservandum, hoc est, & ab omni externo frigore diligenter defendendum.

Prodest verò & pulverem thuris, vernicis, mastiches, styracis, rosarum rubrarum seminis myrti, santalorum & similiorum resiccantium capati inspergi

3. *Vt Rosarum rubrarum Santalorum citrinorum ana ʒ 2. Mastiches, thuris ana ʒ 1. β. Cubebarum, Cardam. ana ʒ 1. Misr. fi. omnium pulvis, qui cū gossypio q. s. in sacculo gestando in capite consuetur. Majorana stachas & similia odorata nocent odore: quamvis specie ut siccantia profint. itaq; non immiscenda. Quidam addunt corallum ut siccans.*

Lect. 49. Decemb. 2.

4. *Quia implet caput. qualitate enim promovere concoctionem humorum possit.*

circa futuram coronalem. Possunt verò & pulveres isti cum gossypio in sacculo consui qui capiti erit imponendus. Utile verò & fumum istorum gossypio aut lana excipi; quæ capiti similiter imponenda. Valet & suffitus istorum naribus exceptus, præsertim quādo humores per nares copiosi destillant. quo casu & odor feminis nigellæ in nodulo ligati utilis est. sic & pilæ factæ ex ladano, styrace, thure, mastiche, ac nonnullis aromatis addito moscho & ambra, utiles quoque esse possunt si sæpius naribus admoveantur.

Victus ratio in universum qualiscunque sit humor qui destillat ac defluat sobria & parca esse debet, & coena etiam parcior, & tunc quidē præcipuè quando crudi ac pituitosi redundant humores. A vino abstinendū + quamdiu humores fluunt & destillatio perseveret. illa cessante licet uti in exigua quantitate vino

vino dulci, quale est Creticum, vel alio tenui addito saccharo. modo febris absit. Potus verò defluentibus salis & mordacibus humoribus, sit decoctum glycyrrhizæ cum uvis passis, vel ptisanæ decoctum cum glycyrrhiza, vel tenuissima cerevisia. Destillantibus verò frigidis humoribus hydromeli vel apomeli cum cinamomo, vel gingibere decoctum, magis convenit, vel potus quem Medonem vocant. Cibus sit facilis concoctionis & boni succi, ut sunt carnes vervecinæ, vitulorum, caponum, gallinarum & similium. Sorbitiones ex amygdalis dulcibus, ex pini nucleis, ex ovis conveniunt. Mediocre exercitium jejuno corpore utile esse potest. reliquo tempore quies. Subitanea æris impensè calidi aut valdè frigidi mutatio fugienda est. A cœna aut mox cibo sumpto studere, & scribere, & seridè in litteris occupari, nocet.

5. Non tamē nisi in exigua quantitate, alioqui siccitate nimia pectori nocet.

6. Quia humores ad circumferentiam ducit.

7. Alioqui crudi humores in corpus delati facile implerent caput.

8. Quia occupato cerebro es adducuntur humores & impeditur concoctio humorum.

9. Nam quaecunque sal-
sa vel acria, mali sunt
succī.

10. Ut pillulæ ex hiera-
que omnium utilissimæ.

Abstinendum est à cru-
dis fructibus ab oleribus. à
piscibus, potissimum non
duræ carnis. ab omnibus
salsis & acribus, ut sunt al-
lia, cape, eruca, sinapi, & si-
militer ab aceto & acetosis
omnibus. Alvum lubricam
& facilem esse refert. quod
si talis spontè non fuerit ut
glandibus suppositis, vel
enematis, vel etiam pillula-
rum¹⁰ assumptione erit ad-
juvanda.

De Raucedine.

Raucedo.

1. Erosio gurgulionis ac
tonsillis quæ etiam ad
efformationem vocis fa-
ciunt. Talis autem rau-
cedo incurabilis est.

INTER affectiones autem
lex destillatione humo-
rum ad pectus, raucedo
una est, quæ vocis est præ-
ter naturam mutatio & de-
pravatio. Non solum autem
ex destillatione hæc fit, sed
& ex alijs causis accidere
eam cōtingit. nam vulnera
& præsertim maligna ulce-
ra, ut ex lue venerea, circa
gurgulionem & partes ad
isthmum pertinentes sæpe
numerò raucedinis & vi-
tiatæ vocis causa sunt. de
qua nunc non agimus, sed
de ea

de ea quæ ex destillatione
facta est.

Ad cujus curationē factis
generalib. si opus fuerit,
& observata victus ratione
dicta, initio offerenda sunt
eclegmata non calida, sed
temperata. ut ex serapio de
capillis Veneris, cui si adda-
tur syr. de papavere, citius
humorum destillatio cessa-
bit. Hac cessante, offerenda
sunt quæ humores expur-
gent, ut syr. de glycyrrhiza
& ex hyssopo. Potest verò
& initio dari diatragacan-
thas in tabellis, deinde pill.
albæ sub lingua; quarum in
officinis usus est, & diape-
nidion. Laudatur verò &
sanum & expertum loch.

Vngere verò & superio-
rem pectoris partem cum
oleo amygd. dulcium utile
est, butyro insulso, pingue-
dine caponis, vel vituli vel
simili aliquo.

Et si magna refrigeratio
pectoris causa fuerit rau-
cedinis, non multo humo-
re destillante, vel destil-
latione cessante, poten-

2. Ne incitemus fluxum
humorum.

Quidam diacodion ve-
speri dormituris seorsim
dant. veteres sequi pla-
cet, qui interdum exhi-
buere arteriacas compo-
sitiones, quæ omnes ha-
bent capita papaveris,
& bene cessit.

3. Constant amydo ma-
stiche, rad. iridis. unde
calidiores paulo.

T

4. Qui plus potest quam
vel diacodion vel syr. de
papavere.

tis vini + haustus vesperi ad
ingressum lecti sumptus
multam ad concoctionem
humorū & eorundem ex-
purgationem facit.

Lect. 50. Decemb. 5.

De Tussi.

1. Motus alij à natura:
alij à morbosa causa, ut
palpitatio, alij partim
à morbosa causa, partim
à natura: ut tussis.

2. Adeo ut quandoque
vena rumpatur & se-
quatur sputū sanguinis.

3. Humiditas tussim non
excitat quum naturalis
pulmoni humiditas. unde
& consille institute.
neque calor nisi. siccitas
adsit.

De Tussi.

CAP. 24.

Tussis est: motus præ-
ter naturam facultatis
expultricis pulmonis &
partium respirationi deser-
vientium, conantiū expel-
lere quod ipsis molestiam
facit & impedimentum af-
fert. Est autē tussis aliquan-
do: vehementior & cum
multa spiritus ad exteriora
motione: aliquando exigua
& sine violentia. Ut sunt ut
plurimū quæ ex causis fiunt
externis. nam & tussis cau-
sæ quædam externæ sunt:
aliæ verò internæ sive ante-
cedentes. Externæ, pulvis,
fumus, vel aliquid casu in
asperā arteriam incidens.
acetosa, falsa, vel acria edu-
lia: & quandoque intempe-
ries aëris frigida vel cali-
da. Internæ causæ tripli-
ces

ces sunt 1. humores ex capite in pulmones & thoracem destillantes. 2. Morbus & affectio circa pulmonē & respirationis instrumenta consistens, ut pleuritis, peripneumonia, empyema, phthisis & similes. 3. Inferioris alicujus visceris tumor septum transversum comprimens + cujusmodi tussis per consensum fit, ac sicca & non vehemens est.

Humor. a. ex capite destillans vel salsus & mordax est; vel dulcis aut insipidus: & quandoq; tenuis, quandoq; verò lētus ac viscidus.

1. Si igitur ex quapiā causa externa excitata fuerit tussis veluti à pulvere, vel re quapiam in asperam arteriam illapsa: exhibenda erunt eclegmata quæ asperā arteriam leniant & expurgationem adjuvent, ut sunt syr. de capillis Veneris, & de glycyrrhiza, tum & ipsa glycyrrhiza manducata.

2. Eadē quoq; exhibēda sūt si ab acetoso aliquo, aut acris assumpto, tussis provenierit.

4. Vt plurimum jecur: quandoq; etiam lien, vel ventriculus. Fit etiam lumbricis ventr. instantib. acris præterea humor in stomacho irritativam qualitatem ad fauces emittens imaginariam tussim præbet: ut fit in cardiogmo tentatis. Aëtius.

5. Præsertim qui salsus & acris, dulcis & insipidus ut plurimum lenis. quandoque tamen tenuis.

6. Atque hi syr. quandoq; profuerunt puellæ, cui phaseolus in asperam arteriam inciderat.

7. Quod deprehenditur si frequenti inspiratione irritetur. Aëtius.

8. Quia calor in instrumentis respirationis ita intenditur & per totum pulmonem penetrat.

9. Atque hic diligentius agendum ne rupta vena sputum sanguinis exci-
tetur.

10. Quod magis convenit quam piper, aut cinnamomum, quia non ita siccum, sed magis temperatum.

11. Vel quod exsiccet, vel quod inflammationi similem affectum exci-
tet.

3. A frigido autem aëre facta, si quidem exigua ac non violenta & sicca sit, sic ut tussiendo nihil expuatur: facile calidis aliquibus pectori admotis curatur, vel etiam sola spiritus cohibitione, ut Gal. ait. Si verò vehemens tussis fuerit, & cum magna violentia fiat, confert cumini aut fceniculi semen, 10 gingiber, nuxmoschata, crocus & similia in cibo aut sorbitione sumi, vtile quoq; est vinum potens vesperi potū, ut in curatione raucedinis à simili causa. Calida verò actu & pectori admovēda. deinde & unctiones ex oleis & ung. calfacientibus ut ol. lili-
orum, anethino, rutaceo; & si refrigeratio fuerit maxima, ex ol. de euphorbio.

4. Quod si verò aëris excedens calor tussis causa fuerit; refriger. & humectantia conveniunt: ut syr. ex jujubis, & de zyzyphis & similibus: subinde solius ptisanæ decoctum, vel tenuis cerevisia cum saccharo sufficit.

ficat. Sic & unctio pectoris cum butyro insulso, aut pinguedine caponis, vel gallinæ in aqua simplici aut rosarum lotis. Quomodo autem occurrendum sit tussi ex causa calida in acutis febribus, prius dictum est.

5. Ex destillatione autem quando originem tussis habet, si magna & vehemens fuerit; generalia nullo modo sunt prætermittenda, & servanda bona victus ratio, præsertim ubi humores qui defluunt falsi & acres fuerint.

Lea. 51. Dec 6.

12. Quod ostendit partium, ab utraque palati parte, titillatio. Aëtius.

Eclegmata verò & exhibenda refrigerantia & incrassantia, ut syr. de violis de jujubis, quibus ad reprimendum fluxum addendum nonnihil syr. de papavere, aut diacodiū Galeni, quod ex melle & capitibus papaveris fit, & quidē tamen diu quam materia falsa & acris fluxerit. Conducit verò eodem tempore syr. ex farfara: cujus hæc est compositio. & Farfaræ cum rad. *Syr. de farfara.*
m. 2. rad. rusci, glycyrrhizæ ana ʒ. β. passularum ʒ. i.

13. Prodest hic compo-
sitio Pauli. ꝛ. Styracis,
myrrhæ, galbani, opij
cum passo si. pillulæ.
ꝛ Sem. hyosciami, ꝛ 12
nucleorum pineorum ꝛ
6. croci. ꝛ 2. cum pas-
so vel sapa. f. pillulæ.

jujubas. N. 20. nucleorum
nucum pinearum ꝛ. 1. capi-
tum papaveris ꝛ 1. sem.
cyton ꝛ 1. sem. malvæ ꝛ 2.
Decoquantur in aqua. q. s.
ad ꝛ. 1. cōlentur & addan-
tur sacchari ꝛ 12. & f. sy-
rupus. Dandum & subin-
de saccharū violaceum &
diatragacanthēs frigidum.

Quod si verò tam co-
piosa destillatio ꝛ fuerit ut
& somnū impediat: tūc syr.
de papavere, aut diacodij
ꝛ ꝛ. aut ꝛ 1. ad summum,
mensurâ, hora somni vtili-
ter exhiberi possunt. vel
pill. de cynogloss. ꝛ ꝛ.

Pectus verò ungendum
est ol. violaceo, vel butyro
insulso & loto, vt supradi-
ctum. Procedente tempore,
& tussi aliquantum inve-
terata, & præsertim destil-
latione cessante, syr. expur-
gantes vel soli vel cum alijs
permixti exhibendi, vt syr.
de glycyrrhiza, de hyssopo,
vel capillis veneris.

Quod si verò humor de-
stillans dulcis, aut insipidus
fuerit & ad hæc viscidus,
ecleg.

eclegmata etiā initio quæ expurgent exhibenda sunt, vt syr. de glycyrrh. vel de hyssopo: quibus destillante humore diacodium, vel syr. de papavere admiscere utile est.

Tussi verò jam inveterata etiam syr. de prassio exhibendus, & præsertim ille qui à Paulo describitur diammarrhubij nomine. Convenit autē & diapenidion & pill. sub lingua usuales, loch sanum & expertum, & similia.

Pectus verò ungendum ol. amygd. dulci, pinguedine gallinæ, aut caponis addito croco, & muccagine vel semine lini, vel sem. malvæ.

6. Tusses verò quæ morbos & affectiones pulmonis & thoracis consequuntur non aliam quā ipsius morbi curationem requirunt.

7. Sic & quæ per cōsensum fiunt propter hepatis aut lienis tumorem: & illæ solent ut plurimum esse prænuntiæ hydropis.

14. *Profunt verò & his
rad. enulæ campanæ cō-
ditæ vesperi sumptæ.*

15. *Theodorus Priscia-
nus, & Trotyla maxi-
mè laudant grana juni-
peri; præsertim in tussi
puerorum frigida. gra-
na autem decoquenda in
vino ad dimidium. Bo-
hemi etiam ex granis ju-
niperi cum aqua potio-
nē conficiūt, quam pau-
peres pro potu bibunt.*

8. Tusses quæ senibus ac-
cidunt, quum illorum ætati
sint familiares, non aliam
curationem requirūt, quam
bonam victus rationem
& 14 linctus sive eclegmata.
quæ expurgationem adju-
vant. Quod si tum vehe-
mens aliqua tussis senibus
molesta sit, poterit ipsis dari
decoctum tale, quale pueris
gravi ac molesta tussi labo-
rātibus. cōtingit enim pue-
ros adeo molesta & gravi
tussi aliquando laborare, ut
simul cum sputo sanguinē
quoq; excernant. ad hujus-
modi tussim talis potio cō-
venit^{is}. & Bacc. juniperi ℥ β.
enulæ campanæ, glycyrrhi-
zæ ana ℥ 3. aut 4. capitum
papav. ℥ 2. vel 3. hyssopi,
marrhubij ana. M. β. uva-
rum passarum ℥ 1. f. deco-
ctio ad ℥. 1. Ex qua dentur
puero dormituro ℥ 1. β. vel
℥ 2. feni verò ℥ 3. vel 4. &
si necessitas major, etiam
mane tantum est exhiben-
dum.

De

De Difficultate Respirationis.

CAP. 25.

Leſt. 52. Decemb. 12.

Respirandi difficultas quæ absque febre evenit triplex est magnitudine differens, vel enim non admodum magna est, vel major, vel omnino maxima. Non admodū magna Dyspnœa dicitur respirationis difficultas, per quam spiritus densior ac crebrior quam secundū naturam efficitur, non tamen valdè, veluti jis contingit qui currerunt, vel montem aliquem conscenderunt. Altera respirandi difficultas quæ major est, Asthma sive anhelatio dicitur, & in hac non solum cum difficultate, sed & cum stertore & strepitu fit respiratio. & sæpenumero non nisi cervice & corpore erectis fieri potest: cujusmodi affectus orthopnœa etiam dicitur.

1. Gal. sæpe confundit asthma & orthopnœā, lib. tamen 7. de med. secund. loca videtur distinguere.

Tertia omnium gravissima & maxima cum ster-

T 5

2. Pausanias medicus
*dictante Empedocle πo-
 eī tūc* Aπv8v scripsisse
 refert ex Heracito
 Diog. Laert. 30. autem
 dies corpus harum absq;
 respiratione & putredi-
 ne (vel ut Suydas, nec
 malè forsan habet, ci-
 bo) servari: Spiratione
 autem tales potius non
 indigent, quam quod il-
 lam impeditam habeāt.
Vide Gal. de loc. affect.
l. 6. c. 6.

3. Aph. 55. lib. 7. Qui-
 bus hepar aqua refer-
 tum eruperit in omen-
 tum, his venter aqua re-
 pletur & moriuntur. ait
 Gal. vesiculis ruptis ad-
 herentibus jecur, hoc fie-
 ri, verum ea ventrem
 non implerent. Dum au-
 tem jecur ita tumet dif-
 ficultas spirandi oritur.
 Adipis nimis copiosi im-
 mobile onus, difficilem

spirationem, præsertim in senibus, facere solet. L. Apro-
 ny consularis filio detractos narrat Plin. l. 11. c. 37.

tore & tāta difficultate fit,
 ut quasi nulla esse videatur.
 qualem in Apoplexia fortis-
 sima fieri contingit: tum &
 quandoque mulieribus ex
 utero suffocatis. = Apnoea
 autem hæc dicitur non ta-
 men quod nulla supersit, sed
 quia difficillima.

Contingit autem respira-
 tionis difficultatem citra
 febrē, fieri vel pulmone pri-
 mario laborante, vel per
 cōsensum tantomodo affe-
 cto. Per consensum autem
 afficitur pulmo, quādo he-
 par tumidum septum trās-
 versum comprimit & liber-
 tatem respirationis impe-
 dit, ut frequenter fit in inci-
 piente hydrope. sic quoque
 & in ascite. Ita & virgini-
 bus deficientibus menibus
 dyspnœa quædam per con-
 sensum accidit, sed non dif-
 ficilis horū affectuum dig-
 notio. tumor enim jecino-
 ris in hypochondrio senti-
 tur & alia ejus apparent
 signa,

signa, + hydrops diu latere non potest. Mensium sup-
pressionē, & alia signa co-
mitantur & ipsius laboran-
tis relatione dignosci po-
test. Primario autem affi-
citur pulmo quando crudi,
lenti, ac visceri humores
pituitosi in pulmonis bron-
chia infarcti spiritus itinera
obsident; vel crudum ali-
quod tuberculum in pul-
mone asperā arteriam co-
arctans enatū fuerit. quæ
per præterita accidētia dis-
cernenda sunt, ac cognos-
cenda, nam si cui per bo-
nam valetudinem respiran-
di difficultas supervenit. de-
inde paulatim increverit,
nihilque interim expuatur,
neque inter respirandum
stertor aut sonitus aliquis
audiatur: crudum aliquod
tuberculum in pulmone
circa asperā arteriam ena-
tum suspicari oportebit.
præsertim si aliqua etiam
gravitas, aut ponderis ali-
quis sensus circa pulmonē à
laborante sentiatur.

*4. Ut tumor pedum &
faciei color qualis in
hydrope.*

*5. Quod, nisi circa arte-
riam asperam fuerit, sine
asthmate esse potest. ut
in Antipatro Medico,
de quo Gal. 4. de loc.
aff. c. ult.*

*6. Hinc aph. 46. lib. 6.
Qui gibbi ex asthmate
aut tussi fiunt, ante pu-
bertatem moriuntur. po-
tius legēdum cum asth-
mate. nam ex asthmate
vix gibbus quis fieret;
tuberculum enim quod
gibbū efficit in vertebra
est, quum asthma prope
asperam arteriam. Cum
asthmate autem gibbus
comprimi thoracem sig-
nificat, neque pulmoni-
bus sat loci superesse:
unde crescentes suffoca-
ti pereunt.*

*7. Aët. non magnam ab
egris gravitatem sen-
tiri ait.*

Si verò stertor aut sonitus

una cum difficili respiratione fiat, præsertim quando æger decumbere conatur, lentorum crassorumq; humorum multitudinem vijs pulmonū pertinaciter impactorum & ejus bronchia occupantium, indicium est. Contingere verò & quandoq; potest ut crassus, vaporibus infectus hybernus aër, maximè nocturnus, asthmatis & difficilis respirationis causa sit, quem non modo asthmatis, sed & peripneumoniæ causam fuisse observatum.

Lea. 53. Decemb. 13.

Curatio autem asthmatis ex crassis viscidisq; humoribus fit per ea, quæ hos ad concoctionem perducere & attenuare valeant. deinde & per ea quæ per inferiora queant expurgare. tum & per eclegmata expurgantia, incidentia, moderatè calida, substantia liquida & humida, accedente bona victus ratione.

Ad concoctionem humorum bene faciunt rad. enulæ campanæ, & fœniculi,

culi, ac petroselini. Ex herbis hyssop. scabiosa, marrubium, adianthum quod vulgo capillus veneris dicitur. tum & quorundam sententia & calamentum. Ex seminibus semen anisi & semē apij. quibus dulcia quædam sunt admiscenda ut expectorationem adjuvēt: ut glycyrrhiza, uvæ passæ, ficus. quæ in aqua decoqui possunt. decocto additur oxymeli aut syr. acetosus, vel etiam oxymeli scylliticum, si fortior, opus est. Ad expurgationem per alvum faciendam in primis utilis est agaricus, deinde & turbith, & quæcunq; pituitam ducunt. Ex compos. med. pill. de hiera cū agarico, vel his fortiores, ex agarico appellatæ, conveniunt verò & diaphœnicō, elect. indum & hujuscemodi compos. turbith recipientes. Possunt verò & decocto incoqui folia senæ, & agaricus cum modico Zingiberis, & etiā turbith, aut eidem admisceri dia-

8. & Rad. fœnic. petros.
enulæ cāpanæ, glycyrrhizæ ana ℥ β hyssopi, capilli veneris, scabiosæ. m. i. marrubij. p. i. sem. anisi, sem. apij. ℥ 2. uvarum pass. ℥ i. β. ficus. N. 6. f. decoctio ad ℥. i. Colaturæ adde oxymeli simpl. ℥ 3. f. potio pro 3. aut 4. vicibus.

Topica.

9. Hic uti possumus
Mezue syr. de prassio,
ob humida, alias Pauli
præstantior est.

10. Ego nunquā eo per-
veni ut scylliticis ute-
rer & ab ijs abstinē-
dum censeo. R. Dodon.

11. 1°. Facit compos.
amaram & ingratham.
2°. Adest opocalpasum
ut Gal. ait. quod venenū
est. substituit Gal. pi-
per. hic non est opus.

phœnicon vel el. Indum.
Eclegmata utilia sunt syr.
ex hyssopo, ex capillis vene-
ris, ex succo scabiosæ, vel
his fortior syr. 9 de prassio.
quibus addi refert ad hu-
morum viscidorum incisio-
nem, syr. acet. vel oxymeli,
vel si major sit necessitas
oxymeli scylliticum. 10 Qui-
bus mixtura non placet ali-
quādo syr. aliquo: aliquādo
oxymelite vel, syr. acet. al-
ternatim uti debent. His
verò non sufficientibus
utēdum erit eclegmate sive
loch. ad asthma inscripto
Mesuæ. quod recipit scyl-
lam assatam, rad. iridis re-
siccatas, hyss. prassium, cro-
cum & 11 myrrham, (quam
tum præstat omittere) &
mellis. q. s. ad compositio-
nem. Quo fortius est ex
sola scylla cum melle com-
positum.

Pectus verò ungendum
est cum ol. liliorum, ruta-
ceo, chamœmelino addita
cera & croco.

Victus ratio calida & sic-
ca & attenuans esse debet
qualis

qualis in dolore cap. ex causa frigida. Potus sit hydromeli, vel vinum tenue cum hydromelite permixtum. Alvus si sponte non respondeat enematis, aut glandibus adjuvanda erit.

Quod si verò à crassis & vaporibus infecto aëre asthma factum fuerit, ab externo aëre, quamdiu impurus fuerit, abstinendum. Domesticus verò ad cal. & siccum mutandus, accenso ex lignis foco querno, vel juniperino. quando haberi poterit. Utendum verò ecleg. expurgantibus & lenientibus ut ex glycyrrhiza, capillis veneris, aut ex hyssopo si febris non affuerit. Illa præsentē vena secanda erit & curatio adhibenda qualem peripneumonia requirit.

Quando autem tuberculi alicujus crudi, Phyma hippos. dicti, aut duri in pulmone enati, aut itinera spiritus obsidentis, suspitio adest, & difficultas respirationis urget, vires verò

Lea. 54. Decemb. 15.

12. Quandoq; non tuberculum sed callus est ut observatum in sectis, nullum habent rem. sed lenimenta tantum.

13. *Quæ non tollet tuberculum, sed ne inflammetur prohibebit.*

14. *Alia enim tussi molestiam tantum exhibebunt, nec quicquam proderunt.*

15. *Fit quandoq; in vena arteriali, qualem in Antipatro Gal. nos in exitu arterialis venæ è corde invenimus. R. Dod. Aliq. In lobis pulmonum fiunt, suntque nonnūquam valde magna.*

ægotantis validæ sint, & sanguinis redundantis indicia, annique tempus idoneum, non incōmodè sanguis ¹³ detrahetur. Ecleg. verò exhibenda sunt dulcia ¹⁴ & lenientia ut syr. de capill. veneris, de glycyrrh. & similes. Ab acidis autem & acetosis incisivis erit abstinentum.

Nascuntur verò & in pulmone & alijs locis ¹⁵ tubercula ab Hipp. *Φύματα*. Latinis vomicæ, dicta: non juxta asperam arteriam, aut spiritus itinera. quæ idcirco & nullam respirationi difficultatem afferunt. & multo etiam tempore occulta latent, donec vel angina, vel pleuritis vel febris etiā quandoque supervenerit. quorum occasione quum ad suppurationem tendant & erumpere conentur, dolorem excitant, qui in latere aliquo pectoris frequenter sentitur, rarius in dorso aut circa spatulas. tali dolore post anginam aut pleuritidem superveniēte angina

abc

aut pleuritis in peripneumoniam ab Hipp. conversa dicitur.

Differt autem dolor iste à pleuritico, quod punctorius non sit, & subinde loco moveatur pro ratione. vid. situs ipsius pulmonis. Accidit autem non raro quando hujuscemodi vomicæ eruptionem minantur, ut & difficilis respiratio & orthopnoea accedat. Hujuscemodi autem vomicæ erumpentes mortem frequenter afferunt, aut si mors non consequatur; phthisis succedit, ut satis ostendit Hipp. aph. 10. sect. 5.

Venæ sectionem in hujuscemodi lateris dolore ex vomica eruptione minante, non videtur tutum facere, neq; etiam à veteribus, quando vel angina vel pleuritis in peripneumoniam cōversa fuit, unquam facta legitur. nam vires ex præcedente morbo fractæ sunt, & suppuratio jam facta per venæ sectionem curari nequit, fomenta potius adhi-

16. *Ut vino madefactum
lintheum patellæ, qua le-
sti calfiunt, imponatur
& sacculus vertendo
super illum calfiat.*

benda ex floribus chamæ-
meli, meliloti, anethi, & fo-
lijs althææ. addito quando-
que semine lini, quæ in sac-
culo sunt consuenda. qui
deinde in aqua coctus &
expressus loco dolenti cali-
dus adplicandus erit. Vn-
gere verò & locum dolen-
tem utile est oleo chamæ-
melino, amygd. dulcium
pinguedine caponis & si-
milibus. Quod si verò su-
spicio sit flatus quoq; simul
molestos esse, sicuti in hu-
juscemodi doloribus post
febres accidere potest: su-
pradiçtis floribus addenda
erunt sem. anisi, cumini, &
similia: & sacculus in quo
confuta rore vini 16 cale-
factus loco erit applicandus.
Prodest verò & in hoc casu
cucurbitulâ loco dolenti ci-
tra scarificationem adhibe-
re. quæ sæpenumero magnū
affert doloris lenimentum.

Quod si verò dolor per-
severet, & non intendatur,
exhibere quoq; haud inuti-
le erit ea, quæ resiccant hu-
mores in vomica contentos
quale

quale est farzæ perillæ decoctum¹⁷ cujus 4. 5. aut 6. ^{17.} Quo & cancer millarū curatur ut subsideat. Ratio est: quia, ut inquit Aëtius cap. de asthmate. Ratio curandi per desiccantia & extenuantia cōmunis omnibus internis abscessibus est.

De altera orthopnœa.

Leſt. 55. Decemb. 13.

Præter orthopnœam¹⁸ quæ cum continuo asthmate incidit, & alia superest decubentibus tantūmodo molesta. tunc enim tanta supervenit in respirando difficultas ut quasi suffocari videantur. reliquo tempore stantes erecti, sedentes, progredientes, itinera facientes nullam in respirando difficultatem percipiūt. nisi certis quibusdam temporibus; quando quædam accessiones ipsis superveniunt. adeo autem vehementer. itaque medici hanc meditationem mortis vocant, &c. Paulatim Suspirium illud, quod esse jam Anhelitus ceperat, intervalla majora fecit, & retardatum est, ac remansit. (an. remisit.) nec adhuc quamvis desierit, ex natura fuit spiritus. sentio hæsitacionem & moram. Epist. 55.

19. Aded ut vel ex minimo motu, vel in latus, prorum, supinumve inclinatione jamjam suffocandi videantur. hinc si vestiti paroxysmo corripiantur vestiri; aut si ijsdem exutos invadant, illis indui non possunt; sed latera pulvinaribus, caput fascia suffulti, in eodem situ permanere coguntur.

20. Aestate magis quam hyeme.

21. Ad triduum, aut ultra.

22. Paroxysmi vero causa, quod ab illis adhuc patet bronchiorum, porro obtinens humor de novo accedens humor catarrhalis, &c.

23. Ego in quadam ultra 25. annos durasse vidi. post annum vero ætatis 50. paulatim & frequentia, & vehementia paroxysmorum remittere cepisse. Athuris suffitu, quum virgo adhuc esset, hoc malum primum senferat.

mentes hæ sunt: ut etiam erecti & stantes angustia
 19 & magna difficultate respirandi premantur. In certis autem temporibus hæ recurrunt. subinde singulis mensibus, quandoq; ter aut 4. in anno, & per humidam aëris constitutionē, & 20 austro flante potius quam alio tempore. Durat autem accessio subinde diem totum, vel diutius effluēte interea ex ore crudo viscidoq; humore, quo expurgato cessat accessio & iterum libera relinquitur respiratio stanti, sedenti ut prius: sed haud quaquā decumbenti. Causam hujus orthopnoæ lentum & viscidum admodum humorem esse manifestum est, qui in remotioribus & abditis vijs latet, nec copiosus est. atque idcirco non stantibus (cum liberè explicari pulmo potest) sed decumbentibus tantummodo molestiam affert 21. Affectus longus ac diuturnus est 23 qui toto vitæ tempore ut plurimum perseverat.

quan-

quandē; progressu ætatis
desinit, vel in alium mor-
bum, veluti in renum calcu-
lum commutatur.

Curatio admodum diffi-
cilis est ²⁴. prodest tamen
purgatio ex agarico. quæ
veris & autumnī tempore
opportunè fieri potest. Vel
aliqua alia hujus loco, quæ
pilitam expurget. Sanguini-
nis missio temperamento,
ætate & viribus responden-
tibus admitti potest. Ecleg.
tempore accessionis expur-
gantia & incidentia, qualia
in asthmate ex viscidis
humoribus cōveniunt. reli-
quo tempore bona victus
ratio servanda & exces-
sus omnes vitandi.

²⁴. Scopis duobus intē-
dendum. 1. ut infarcti,
lenti humores expediā-
tur. 2. Vt catarrhus ac-
cessionem faciens arcea-
tur.

²⁵. Iactationem in le-
tica profuisse sibi testa-
tur Seneca. In declina-
tione, aut intervallo
fuisse necessum est.

De sanguinis sputo. Leq. 56. Januarij 2.

CAP. 26.

Sanguis varijs modis per
os excernitur: ex gula:
quidē & ventriculo, vomiti-
one; ex faucibus & gur-
gulione, screatu: ex ore
simplici expuitione: Sed
ex instrumentis respiratio-
nis per tussim expuitur, ut

1. Propter ulcus vulnus-
ve ibi consistens: aut
propter sanguisugam.
2. Gal. de loc. aff. 4.
c. 6. ex cerebro & gur-
gulione tussi rejici scri-
bit quem vide.

Gal. 4. de locis affect. c. 6.
Contingit autem hoc etiam
fieri, cū aliqua pars respira-
tioni dicata inflammatione
laborat: ut in peripneumo-
nia & pleuritide. sed de hu-
juscemodi sanguinis sputo
in præsentia non agemus.

Eruptio autem sanguinis
tripliciter accidit. 1°. per
anastomofin .i. apertionem
osculorum vasorū sangui-
nem continentium. 2°. pro-
pter unitatis solutionē ipso-
rum. 3°. per diapedesim
sive transcolationem, aut
desudationem.

3. Sic quasdam gravi-
das sanguinem exspuisse
vidimus, & curatas
fuisse.

Propter .a. apertionē os-
culorū rarissimè contingit
sanguinis cum tussi sputum,
& non nisi corpore valde
repleto, & præcipuè cessan-
tibus consuetis purgationi-
bus: ut per menses 3 aut
hæmorrhoides. tunc enim
sanguinem una cum tussi
excerni quandoq; contin-
git, frequētius tamen tunc
sanguis per nares erūpit, aut
per alias partes: ut per gin-
givas, &c. & ex latere ut
Benivenius exemplū habet.

Hic

Hic neq; propter diapedesin, sive trāscolationem, sanguis frequenter ex pectore ejicitur. in vehementi tamen & molestissima puerorum illa + tussi sanguis tenuis, qui lentæ pituitæ permiscetur, per violētiam tussis trāscolatus videtur: aut ex osculis vasorū debilitatis excidisse. quēadmodum & tabescentibus quandoq; (sed tamen rarò) accidit, à quibus lenta pituita sanguineo rubore tincta expuitur, ex sanguine tenui & acri permixto, qui per oscula vasorū acrimonia sua viam sibi patefecit. sputum autem tale falsuginem vel acrimoniam aliquā refert, & ulcus pulmonis vel nunc factum ac præsens, vel citò futurum ostendit.

Frequentissimè autem sanguinis cum tussi sputum propter unitatis solutionē cōtingit: solvitur verò unitas propter vulnerationem, contusionem, rupturam, vel erosionem: & quandoque etiam in pulmone propter

4. *Quam tinnientem vulgo, de Kinckhoeft; seu clangorosam malis dicere, vocamus.*

5. Qualem in navarcho illo fuisse necessum. qui post sanguinis sputum, vas in multos ramos divisum; dein aliud palmam longitudinē adæquans extussit, ac paulo post mortuus est.

6. Adrianus Imperator quum in venatione constam & jugulum fregisset, sanguine copiose reiecto in phthisin & hydropem incidit. quæ ipsum, & non turbæ medicorum, proculdubio perdidit. Dion. & Æl. Spartian.

7. L. Sylla animi concitatione nimia, atq; immoderate vocis impetu, convulso pectore, spiritum, cruore, ac mæris mistum evomit. Val. Maxim. l. 9. c. 2. Idem in prælio dum altiore voce suos hortaretur Antigono Macedonum regi. Polyb. l. 2. in fine. Et Valentiniano Imperatori ex ira & clamore. Synd. accidisse testantur.

sphacelum, sive syderationem alicujus ejus partis.

Ex pectore autem rarissime contingit propter vulnus aut contusionem sanguinem expui: nam vulnere etiam aliquo extrinsecus illato, quod ad interiores partes penetret, citius sanguis in cavitatem pectoris effundatur, quam cum tussi procedat.

Sed propter alicujus vasis, veluti venæ, rupturā, vel propter exulcerationē, vel sphacelū pulmonis sanguis cum tussi præcipuè expuitur. Rumpi autem venā in pulmone accidit, vel propter casum⁶ ex alto, vel à forti percussione, aut luctatione, vel propter vehementem⁷ clamorem, aut nimiam sanguinis plenitudinem: sed frequentius propter magnam aut validam tussim, præsertim siccam, cujus causa esse potest vel externum frigus excedens: vel quædam bronchijs pulmonis

monis inhærentia, ut calculi. Exulceratur .a. pulmo, vel propter humorē acrem aut falsum ex capite destillantē, vel ab huiusmodi humoribus sanguine aliunde infecto accedente. Sphacellus autem fit, quum aliqua pulmonis pars intermoriatur ac nigrescit.

8. Iuvenem vidimus qui lapillos tophaceos hordei grani magnitudine & forma, aliquandiu exspueret.

Quando igitur cum tussi ex pectore sanguis rejicitur, & adsunt aliquæ lassitudines spontaneæ, quæ plenitudinem adesse testentur, & mensis suo tempore non responderint, nec hæmorrhoides fluere solitæ aperiantur ac fluxerint, sanguis verò qui expuitur initio paucus sit & floridus, neque ulla præcesserit aut adsit vehemens tussis, aut destillatio falsi aut acris humoris, neque etiam casus ab alto, percussio, luctatio, vehemens vociferatio: existimandum sanguinis sputum factum propter anastomosis, sive apertionem osculorum vasorum, ac venarum sanguinem continentium.

Lect. 57. Ianuar. 10.
Signa.

præsertim si balnei usus præcesserit. quia balneum rarefacit sanguinem, & vias aperit, ac laxat.

Aphor. 13.5.

9. Qui sanguinem multum excreat spumofum, ijs ex pulmone educitur. Vide comm. Gal.

Spumofum à spiritu pulmonis educitur, ut satis ostendit Gal. 4. de loc. affect. cap. 6.

Ex pulmone spuma sanguinea .i. plus spumæ parum sang. ex thorace sanguis spumofus. I. Huernius.

Si autem sanguis multus confertim cum tussi expuatur, præcesseritq; vel casus ab alto, vel percussio, vel in palæstra luctatio, vel vehemens vociferatio, vel valida & magna tussis, existimandum est sanguinis sputum factum propter ruptam magnam aliquam venam, præsertim si destillatio nulla falsa, aut acris præcesserit, & neque spumofum vel purulentum aliquod exspuatur, vel aliqua bronchia sputo sint admixta.

Quod si verò sanguinis admixtum fuerit, vel spumofum quid, vel bronchij pars, vel venæ aut arteriæ tunica pars, evidentissimum est indicium ulceris in pulmone existentis. Cōsuevit autem sanguis ab ulcere pulmonis non affatim sed ex intervallis & non multus simul exspui: interdum tamen & copiosus & multus

multus erumpit. quod si non propter vehementem tussim aut aliquē casum fiat, vel similē causam fiat, magnæ alicujus erosionis, aut non exigui ulceris signum est. Sanguis verò niger, & cum eo spumosa quoque nigra, quæ adeò tenacia quandoque sunt ut in aqua non dissolvantur & spongiam quandam referre videantur, aliquam partem pulmonis sphacelo sive syderatione corruptam esse ostendit.

De sputo autem sanguinis quod erumpente accidit aneurismate, quod circa aliquam pectoris partem hæsit, non refert verba facere. illo enim erumpente mox æger deficiens ¹⁰ moritur. si aliquis sanguis defertur ad os; ille quidem paucus est. plurimus enim in vacuū pectoris spatium effunditur, ubi mortui corpore aperto reperitur.

Sanguinis sputum propter anastomosin si exiguum sit; nullam curationem requirit

10. Quod à vasis cordi proximis, & confertim in vias spirationi dicatas, irruat.

Leq. 58. Ianuarij 16.

Curatio,

mox enim cessat, succeden-
tibus vacuationibus solitis.
quæ suppressæ fuerant. sed
illis diutius cessantibus, si
copiosius fiat sanguinis spu-
tum, diversiones faciendæ
versus partem, unde san-
guis fluere debuerat.

Veluti menstruis, aut hæ-
morrhoidibus cessantibus:
ad partes inferiores. faciē-
dæ autem hæ sunt per fri-
ctiones, ligaturas & cucur-
bitulas. erit & venæ sectio
faciēda, si nec factis diver-
sionibus sputum sanguinis
cessarit. Abstinentum ve-
rò & ab omnibus quæ soli-
tas vacuationes impedire
possent, ut est usus astrin-
gentium ac frigidorum.
Si autem sputum sanguinis
diutius perseveraverit, &
salsuginem, vel similem
malam qualitatem gustu refe-
rat: timor est ne pulmo ex-
ulceretur: & tunc quidem
eclegm. erunt exhibenda
non solum dulcia, sed &
quæ lentorem aliquem
habeant, ut facilius humo-
rum acrimonia obtundi-
queat.

ii. *Ut humores incras-
centur, & meatus obli-
vantur.*

queat, ut est syr. de jujubis :
& syr. de symphyto. & reli-
qua facienda; quæ in ulcere
pulmonis requiruntur, suo
loco dicenda.

Si autem propter unitatis
solutionem & venæ alicu-
jus rupturam sanguis cum
tussi expuatur: statim & ab
initio venæ sectio faciēda,
si vires ferant. & quidem
non vacuationis ¹¹, sed di-
versionis tātōmodo causa:
atque ideo etiam non co-
piofa faciēda, & si opus
fuerit etiam reiterāda. Ad-
hibēda verò sunt & frictio-
nes ac ligaturæ diversivæ,
etiam primo die, ac dein-
ceps frequentius faciendæ,
donec cessarit sāguinis spu-
ratio. Eclegm. quoq; ex-
hibenda sanguinem suppri-
mentia: ut est syr. de rosis
aridis cui sit admixtus bo-
lus armenus ¹³ lotus cum
aqua plantag. aut equiseti:
vel lapis hæmatitis tenuissi-
mè tritus boli loco. Pro-
dest etiam conserva rosarū
rubrarū addito lapide hæ-
matite & syr. de rosis ari-

*12. Non refert quo lo-
co. potest modo in dex-
tro, modo in sinistro
brachio secari.*

*13. Qui leniter astringit
& emplasticus est:
qua ratione magis pro-
dest, quam astrictione.*

14. *Philonij mentio non fit à Gal. forte quia calida nimis habet ut piper.*

15. *Tunc enim catarrhi & sanguis quiescunt.*

16. *Quales sunt potiones vulnerariæ dictæ.*

17. *Astringunt, obli-
nunt, consolidant.*

dis. Vesperī verò ex Gal. consilio exhibendum aliquod med. opiatum veluti diaspermatum ¹⁴ quod ab ipso commendatur, utpote somnum concilians, ¹⁵ dolorem sedans, & resiccandi vim habens. Hujus loco recentiores exhibent pill. de cynoglossò Nicolai, quæ similiter somnum conciliant ac resiccant.

Habenda verò & ratio efficientis causæ: nam si propter lapsum ab alto, percussionem, vel similem rupta fuerit vena, utile etiã fuerit dari potiones partim ex ijs quæ astringunt, & partim ex consolidantibus ¹⁶ quibus addenda sunt quædam lentorem habentia ut melius queant partes uniri ac consolidari, ac etiam dulcia quædam ut concoctionem sputi adjuvent, & ne aliorum acerbitas pectori noceat. Confici igitur potio poterit ex rad. tormentillæ, rubæ, ¹⁷ consolidæ majoris, glycyrrhizæ, & ex fanicula, alchymilla,

millia, pyrola, uvis passis, Zyzyphis seu jujubis, & sem. malvæ. in aqua decoctis. quorum decocto etiâ addi potest syr. de jujubis, aut de symphyto aut uterq; ex quo mane propinandus haustus erit & ante cœnam.

Si autem ex excedente & magno frigore exorta tussis, causa fuerit rupturæ, ipsius venæ, admovenda & pectori erunt extrinsecus calfacientia talia, qualia in curatione tussis à frigore dicta sunt.

Debet autem is cui vena in pectore rupta est in quiete, tranquillitate, & quantum fieri potest in silentio se continere¹⁸, & cavere omnem occasionem tussis. Aer eligatur temperatus & ad siccum¹⁹ inclinans, & citius ad frigiditatem vergens, quam ad calorem. Cibus sit facilis concoctionis aliquantum lenti succi, ut sunt carnes musculosæ præsertim vitulorum. quorum & extrema veluti pedes & per se conveniunt

18. Quia nemo sine motu pulmonis loqui potest.

19. Quia humiditas sanguinis fluxum magis irritat.

20. Hinc Domnino Esculapius in vestibulo templi, quod ipsi apud Athenienses dicatum, erat ad captandum oraculum dormienti, ut carnibus suillis vesceretur, consuluit. Suydas.

21. *Ex quo vena aperiri
& sanguis fluere potest.*

Leet. 59. Ianuar. 19.

22. *Cujus indicium da-
re potest febris adjun-
cta.*

23. *Quod facit ad glu-
tinationem vulneris, &
reparationem virium.*

24. *Ne quid sit quod
lac in ventriculo cor-
rumpat.*

25. *Quod tenuius &
magis ad humanum ac-
cedit.*

vel cum capone vel galli-
na decocta. Potus sit ini-
tio aqua hordei passulis &
glycyrrhiza additis, vel jus
caponis cum ptisana deco-
cti, quæ & cibi loco esse
potest. Alvum mollem &
facilem esse convenit: ne
conatu ²¹ aliquo opus sit.
quod si talis non sponte
fuerit enematis mollibus
adjuvanda erit.

Sanguinis spūto utcunq;
cessate, & corpore ab om-
nibus vitiosis & excremen-
tis per elemens aliquod
med. vacuato, nulla inflam-
mationis ²² circa ruptam
venam aut pulmonem exi-
stente suspitione, ad lactis
²³ caprini usum erit deve-
niendum. quod mane jeju-
no ²⁴ stomacho exhiben-
dum erit: vel quod nonnul-
lis magis placet, ad usum ²⁵
lactis asinæ. Syr. etiam hoc
tempore exhibendi sunt le-
viter expurgātes, & conso-
lidantes: ut est syr. ex sym-
phyto, cui quandoque
admiscei potest ad majo-
rem expurgationem syr. de
glycyrr-

glycyrrhiza ²⁶ Mesues. Con-
ducit verò & vesperi sume-
re conservā ros. rubrarum
²⁷ cum syr. de papavere, aut
sem. hyoscyami, si tussis
molesta, aut somnus diffici-
lis est.

*26. Qui expurgat ma-
gis quam reliqui: quia
cum melle componitur.
quamvis & alij cum
melle componantur. ve-
rum nimis vehementes
sunt.*

Periculosum autem ad-
modum est sanguinis spu-
tum à vasis alicujus ruptu-
ra, vel enim in ipsa sangui-
nis effusione deficit æger,
vel in phthisin incidit; nisi
primo tēpore diligens ad-
hibeatur curatio. In phthi-
sin. incidisse ægrotū osten-
dit puris sputum sanguinis
spuito succedens, atq; idcir-
co Hipp. A sanguinis spu-
to puris sputum malum
esse, ait. aph. 15. lib. 7. sub-
sequens enim puris sputum
ulceris in pulmone existen-
tis signum est certissimum.
minus etenim periculi est à
vasis sive venæ ruptura, quā
ab ulcere pulmonis. Qua-
liter autem curādi sint qui-
bus ab ulcere pulmonis
sanguinis sputum procedit,
inferius dicendum, ubi de
phthisi curatione,

*27. Quibus nōnulli mag-
no cum successu utuntur.*

28. *His pulmo totus niger ac corruptus est. intectus alba membrana. totq; in eo foramina quot vicibus sanguinem expuit ager.*

29. *Quod alijs alioqui noxium foret. ad recreandas cordis vires.*

30. *Non magnum in eo periculum. nisi fortè ibi putrescens noxam daret.*

Quod autem propter pulmonis ²⁸ sphacelū accidit sanguinis sputum ut plurimum ægrum mox è vita tollit. & si id nō prima vice fiat, altera aut tertia cōtingit. nulla autem spes est vitæ, sanguinē propter sphacelum expuentibus. si verò vita aliquanto tempore intermedio producat, cibis bonis & facilis concoctionis erūt nutriendi, potestque ²⁹ ipsis vinum dulce concedi.

De sanguinis sputo ex faucibus, gurgulione ac partibus oris.

Quod si autem è faucibus, aut gurgulione sanguis expuatur, atque is sit concretus ³⁰ & ex capite delapsus veluti suppresso sanguine è naribus quandoque contingit, abstergente aliquo gargarismo uti licebit. veluti aqua hordei cum melle rosato.

Si autem propter vulnus aut ulcus sanguis fluat, gargarismis utendum astringenti-

gentibus : ut ex decocto
plantaginis , equiseti , rubi,
polygoni, calicū glandium,
corticum granatorum, gal-
larum , rosarum rubr. ba-
laustiorum , sem. myrti &
similium. cui addi potest
syr. de ros. aridis vel myrti-
nus, & si sanguis his non
sistatur : poterit simul cum
supradictis , vel aliquibus
eorum, aliquid aluminis in-
coqui. Utendum autem est
istis gargarismis actu fri-
gidis, non ³¹ calidis.

31. Calidum enim hæc
morrhagias lædit. 5.
Aph. 16.

Si autem à partibus oris
sanguis fluat , vel à lingua,
aut ex gingivis , posca os
abluendum erit, vel vinum
rubrum austerū in ore con-
tinendum , vel portulaca
manducanda ut Celsus sua-
det. Si verò per hæc san-
guis non sistatur, in ore cō-
tinendum erit decoctum
ex astringentibus quale su-
pra dictum est. Potest verò
& locus si contingi queat,
inspergi pulvere thuris,
mastiches , sanguinis dra-
conis, aut hypocystide, bo-
lo Armeno, lapide hæma-

32. Debet ad aliquot horas relinqui. nam crustam facit. qua ablata major fieret sanguinis fluxus.

33. Natura enim donec ordinate agit non est refrenanda. sin contra, inhiberi potest.

Leſt. 69. Ianuar. 20.

34. Si aſtantes ſtupidi non poſſint indicare num ſpuendo, vel vomendo ſit ejectionis: ex fecibus animadvertetur. nam ſi fuerint nigrae: ex ventriculo eromunt.

thire; roſis rubris, balauſtijs, vel aliquibus horum, addito alumine uſto, vel ſi major neceſſitas vitriolo uſto. Si verò etiam adeo copioſus è faucibus aut oris partibus erumpat, ut aegrè ſilti queat, diverſiones etiam faciendæ erunt per ligaturas & frictiones brachiorum, & per cucurbitulas ſpatulis ac collo admotas. Abſtinendum ab omnibus acerbis ac mordacibus.

Conſiderandū verò etiam eſt an huiusmodi ſanguinis fluores in aliquo morbo acciſant febrili. nam qui in morbo aliquo, qui febrem habet conjunctam, contingunt, & in die ſuperveniunt critico, non ſunt temerè reprimendi.

De Vomitu ſanguinis.

Ex ventriculo, ut dictum eſt, ſanguis vomitione re-

jicitur, rariffimè autem ab

ipſo

ipso ventriculo aut ejus aliqua parte læsa. frequentissimè enim, qui vomitione profūdatur, in ipsum aliunde prius influxit. & talis niger ac crassus esse solet, & admodum copiosus ³⁵ & cum magna vehementia vires valde dejiciens vomitur adeo: ut & multi in ipsa sanguinis vomitione deficient ac moriantur.

Influit autem sanguis in ventriculum: vel ex jecinore: vel ex liene malè affectis. aliquando ex venis, mulieribus quidem quando menses non respondent. A jecinore sanguinè effusum ³⁶ ostendunt præcedentia: ut faciei color ad luteū vergens, hypochondrij dextri tumor aut dolor, frequens sitis & calor præter naturam, præsertim si multa frequensque vini potatio accesserit. Deficiunt autem ut plurimum in ipsa vomitione qui sanguinem ab hepate profundūt, quod & in Coacis scriptum reperitur his verbis: Qui san-

35. Vnde & aliunde influere colligi potest. ipse enim ventriculus exanguis.

36. Hunc aliquando minus nigricantem, vel potius ichorosum dum circa ventriculum hæret gravissimas angustias intulisse vidimus; à quibus, illo copiosissime Vomitu profuso, statim æger liberabatur.

37. Ob crassitudinem guinē³⁷ spumofum³⁸ spuunt spumofus quodammodo hypochondrium dextrum videtur. dolentes ab hepate spuunt,

38. Abufivè, pro Vomunt. sic quum de educatione sanguinis è pulmone ageret, dixit Vomunt, pro tussiendo eji- & moriuntur.

39. Ex liene prodijffe, si tumor siniftri hypochōdrij vomitione fubfideat, conftabit. Archig. 2. A liene autem fanguinem per vomitum ejectionem proveniffe, indicat color faciei multo tempore pallens ac lividus, & in finiftro hypochondrio tumor³⁹, aut durities. Deficiunt & quandoq; hi, fed rarius in 40 prima, in altera verò, vel tertia, vel poft fequente alia, frequentius. in quarum aliqua fi non deficiant; tandem in afcitem incidunt, quod videtur & Hipp. pro-

40. Lien enim non eft pars vitæ tam neceffaria quam hepar. rhetic. lib. 2. obfervatum habuiffe: Cui multus, inquit, fanguis furfum ac deorfum eruperit, & febris 41 infuper accefferit, eum multa aqua repletum iri timor eft. atque hic hydrops breviffimi temporis eft, & ex 42 quo pauciffimi evadunt. Additur ab Hipp. fi febris accefferit; fed ex liene fanguine profufo etiam abfq; præcedenti feбри frequenter accidit Afcitē fubfe-

41. Videtur hoc tempore Hipp. eveniffe quod intestina non eluerent. fieri enim non poteft ut fanguis in intestinis putrefcat & febris non excitetur.

42. Mulier quædā, quæ ex vomitu fanguinis in Afcitem incidiffet & poftea fibi ab eo liberata videretur, in vomitum rurfus incidit, ac defecit. R. Dodon.

qui.

qui. cui nō esse remediū sæpius memini observatum.

Recurrunt autem sanguinis ex liene vomitiones incertis temporibus⁴³, subinde paucis, subinde multis mensibus intermedijs.

3. Si autem propter menstruorum suppressionem⁴⁴ sanguinis vomitus mulieribus accidat, non hypochondrij alicujus dolor aut tumor præcessit, sed quandoque faciei color pallidus & difficilis in ascendendo respiratio, & alia retentorum mensium signa. Contingit verò & quandoq; hujusmodi vomitum cum magno impetu ac violentia fieri & vires dejicere & lipothymiam ac periculum inducere. In Coacis tamen legitur. sterilibus & non parientibus sanguinis vomitum⁴⁵ ad conceptionem prodesse.

Curatio.

Quod si igitur sanguis ex vulnerato⁴⁶ aut læso ventriculo efferatur exhibenda sunt familiaria ac

43. Prout nimirum bono vel malo regimine utuntur.

44. Hipp. in epid. non videtur aliam in mulieribus causam agnovisse: Mulieri sanguinem vomenti menses substituisse necesse est. lib. tamen 1. de morb. mul. ex partu etiam fieri agnoscit.

45. Quia natura onere liberata, ad menses protrudendos est expeditior. ijs exclusis ad conceptum aptiores.

46. Ut cuidam, qui vulnus ad xiphoidem cartilaginem acceperat & tamen sanatus fuit licet. Hipp. hoc lethale pronuntiet. 6. Aph. 19. R. Dodon.

X 4

grata, quæ vomitum supprimant, cura vulneris interim non neglecta.

Sed quando is, qui aliunde influxit, vomitione refunditur: frictiones, ligaturæ crurum, brachiorum faciendæ sunt. & viribus consulendum odore aromaticum, & generosi vini exhibitione, veluti vini aromaticis, si haberi potuerit.

Ventriculi ostium ol. masticino, cydon. vel myrtino inungendum. syr. ex rosis aridis, aut myrtinus exhiberi quoq; poterit. Abstinere autem ab ijs oportet, quæ ori ingrata nauseam & vomitū⁴⁷ excitare possent, tutissimū est jusculis astringentia quædam admiscere: veluti rosas aridas. quæ cum capo, aut pullo gallinaceo coqui poterūt, primis diebus cibi ac potus loco futura. Postridie, aut ad longissimum tertio die, si alvus non spontè respōderit, enemate aliquo facili expurganda erit, ne sanguis concretus in intestinis putrescens,

47. Præstat enim istum ventriculo cōcludi, quā evomi. fluxus enim magis cōcitaretur. sanguis verò thesaurus vitæ est. descendunt tamen ad intestina cum fecibus.

cens, febrem excitet. in huiusmodi enim profusione non omnis sanguis sursum evomitur, sed pars ejus quædam ad intestina descendit.

Si autem æger enema sibi iniici non patiatur; poterit dilutum rhabarb. exhiberi, quod non solū, quod vitiosum est, expurgat, sed & roborat partes debiles astrictionem relinquēs, & præferendum est mannæ & cassiæ, quæ vomitum & nauseam excitant.

Sedato vomitu, ac repurgatis intestinis, ac viribus reparatis, si ex ⁴⁸ liene profusio facta fuerit: huic erit providendum & victus ratione idonea, tum & unctionibus, aut emplastris foris admotis: ut ol. capparorum, ung. aut empl. ex ammoniaco. Vtilissimus autem in hoc ⁴⁹ casu absinthij vulgaris usus est, quocunq; assumatur modo: vel in vino aut in cerevisia maceratum, vel in forma syr. aut conservæ.

⁴⁸. Nam qui ex jecore vomunt, plerumque moriuntur.

⁴⁹. Quo etiam servati quotcunque evasere. roborat autem viscera ac nonnihil absterget.

Si autem propter menses retentos mulieri aut virgini sanguinis vomitio facta fuerit, represso vomitu viribusq; reparatis, observata bona victus ratione, erit vena pedis interior juxta talum aperienda & abstinendum ab ijs quæ menses remorari possent. Mensibus verò suo tempore succedentibus sperandum est ab omni periculo vomitionis sanguinis deinceps tutas futuras. Contingit tamē & non suppressis mensibus mulieres quandoque sanguinem evomere. quod ipsis vel à jocinore, vel à lie- ne quoq; accidit, & ex signis supradictis, tamen ex non suppressis mensibus cognosci potest. adhibenda tunc & istis remedia prius dicta.

De Hæmorrhagia.

CAP. 27.

Lea. 61. Januar. 23.

DE sanguinis è naribus fluore, qui in febribus supervenerit, ante dictum.
nunc

nunc de eo qui ex alia causa mediocritatem excedit.

Causæ autem hujus fluxus vel externæ vel internæ sunt. Externæ ut casus, percussio, vehemens exercitium, diutina sub sole mora. Internæ, nimia sanguinis redundantia, vel ejusdem vitium. Refert autem non parum an continuus sit sanguinis fluxus, an intermittens & per vices recurrens.

Continuus ex quacunque causa, periculum evidens mortis affert: nisi sistatur. Vena media aut interna secunda erit, si vires ferant ægri, brachij quod è directo est naris sanguinẽ fundentis. Ligaturæ etiam faciendæ sunt ac frictiones brachiorum, femorum, & crurum. Cucurbitula etiam hypochondrio, si non cesset fluxus, quod è directo est, erit admovenda. utiles quoque collo sunt ac spatulis appositæ cucurbitulæ, cum scarificatione etiam, si vires ferant.

1. *Attila ob Honorie Valentiniani sororis nuptias convivium exercens, dum tantum vini quantum nunquam antea in simul bibisset, cum supinus quiesceret, eruptione sanguinis, qui ei de naribus solitus erat effluere, per fauces quod impediretur illapsi, suffocatus & extinctus est. Paul. Diacon. l. 15. Iornand. dereb. Gothicis.*

2. *Septuagenarium, triginta libris sanguinis per nares effluxis, convalescere tamen, & decem annis superstitem fuisse referebat Niger med. Patavin. anno 1587.*

Fronti imponenda spon-
gia frigida, posca madefa-
cta; vel calaplasma ex bolo
cum ovi albo, & aceto ro-
faceo, si haberi potuerit.
quod quam citò incaluerit
amovendum, substitutò al-
tero frigido. cui si addatur
succus plantag. polygoni
aut bursæ pastoritiæ, aut
herbæ ipsæ contusæ, effica-
cius erit.

Quod si nec sic sanguis
fluere desinat: linamentum
sive turunda narib. imponi
debet imbuta pulveribus
astringentibus cum ovi al-
bo permixtis: ut pul. thuris,
boli, sang. draconis, hypo-
cistidos, lap. hæmathit. cui
si addatur alumen ustum
efficacius erit, ac magis
astringet. Debet autem tu-
runda adeò longa esse ut
ad ostium venæ sangui-
næ profundentis pertingat.
deinde & fasciola liganda
ne excidat. Quod si pul-
veres supradicti non suffe-
cerint; addendū vitriolum
rubefactum. quod & ipsius
turundæ cacumini illini po-
terit.

terit, instar cauterij autem hoc crustam facit, atq; idcirco hoc admoto turunda citò eximi non debet; sed sinenda ad 3. usq; diem. si prius eximatur, periculum erit ne crusta ablata iterum sanguinis profusio major sequatur, quā antea, osculis venarum magis patentibus 3. Quæcunq; autem fluente è naribus sanguine adhibentur, siue cibi siue potus: omnia actu frigida esse debent. expedit & locum esse frigidiorum in quo æger decumbit. Caput etiam erectum hunc tenere convenit. Fugienda sunt omnia calidiora & excalfactia. Vinum etiam non dandum nisi dejectæ vires postulent.

3. Propterea quod crusta ex partium illarum adustione fiat, quæ vasis incumbunt.

Sanguinis autem per nares fluxu per vices recurrente, si adsint sanguinis redundantis signa, optimum ac præstantissimū: sanguinem detrahare. etiam sæpius, si fluere non desinat. Adhibita victus ratione quæ nec excalfaciat nec

multum sanguinem generet, ut sunt vinum, ova, carnes teneriores. à quibus idcirco abstinendum.

Quod si autem non copia in causa fuerit, sed ejusdem vitium & tenuitas, & signa adsint superabundantis bilis: corpus med. purgante bilem, expurgandum. Abstinendum verò & à vino ac omnibus calfacientibus: ut aromatis & quibuscumq; acrimoniam habentibus. Non præsentibus signis bilis, sanguine tenui & aquoso existente: mediocriter calidorum usus, & vini dulcis ut Cretici, aut rubri nō est inutilis. Cōveniunt in utroq; casu cibi lenti succi: ut pedes & carnes musculosæ animalium, & similia his.

Perseverante autem hujusmodi fluxu, metuendum ne Lienteria aut Hydrops succedat, quod & Hipp. 1^o. prout ostendit: Quibus sanguinis eruptiones plures, his temporis progressu alvi malè afficiuntur: si non urinæ concoctæ fuerint.

De

De Pleuritide.

De Pleuritide.

CAP. 28.

Lect. 62. Januarij 24.

Lateralis dolor, de quo
Lagimus, ille est qui cir-
ca partes thoracis, quæ ipsis
costis circūscribuntur, con-
sistit. Causæ circa has par-
tes doloris quædam exter-
næ esse possunt ut casus,
percussio, & similes. sed ex
talibus causis dolores ad
præsentem tractationem
non pertinent. de eo enim
lateris dolore, qui citra ta-
les causas, & potissimum ab
internis causis natus est
nunc dicendum. quem La-
tini veteres medici propriè
lateralem dolorem: Græci
verò & hæc ætas Pleuriti-
dem vocat.

1. *Telum lateris dolor
est, dictum, quod corpus
dolore instar gladij
transverberat. Isidor.
l. 4. c. 6.*

2. *Quæ tamen ab exter-
nis quandoque irritant.*

Est autem Pleuritis vel
legitima sive exquisita, vel
notha sive spuria. Exqui-
sita pleuritis inflammatio
est intra membranam in-
trinsecus costas & latera
succingentem nata.

*Sic Agron Illyriorum,
quum devictis Ætalis
perpotationibus & con-
vivij indulgeret, in
Pleuritidem sibi fune-
stam incurrit. Polyb.*

l. 2. Athen. l. 2. Ælian.

l. 10. variæ histor. 2.

Non ipsius membranæ.

Signa hujus sunt dolor
vehementer pungens, re-

3. *Non tamen in nostris corporibus hoc veritatem habet.*

4. *Quandoq; vigesimo primo die, ut in Anaxione. cuius meminit Hipp.*

5. *Non simpliciter nigrum. neq; enim ex synchra melancholia.*

spirandi difficultas, tussis aliquando initio sicca, verum non diu talis, sed cum sputo eoque etiam sæpe & citò cruento: febris acuta non intermittens: pulsus durior quam pro natura, in duris etiam corporibus: ferratilis.

Oritur autem hæc inflammatio à sanguine & ut plurimum à bono, aliquando verò & ex bilioso, rarius ex pituitoso, rarissimè autem ex melancholico sanguine. Ex sanguineo humore pleuritide facta sputum citò cruentum redditur. si ex bilioso, flavuum aut sublu-teum expuitur. tardè verò & minus sanguine tinctum procedit: si ex pituitoso sanguine nata fuerit pleuritis, tardissimè autem succedit, quando ex sanguine melancholico pleuritis originem habet, atque hoc ipsum atro ac nigricante sanguine tinctum. Refer-tur autè pleuritis ab Hipp. inter morbos qui hyeme potissimum oriuntur. non tamen

tamen incipiente hyeme,
nec vigente, sed desinente
& circa veris initium ferè
supervenit. Propensi ad
hanc sunt juvenes & mediæ
ætates multo sanguine abun-
dantes. Hi enim si post la-
bores & exercitia calfacti
se se frigido aëri exposue-
rint, facile pleuritide corri-
piuntur. qui verò natura
sunt frigidiores minus huic
morbo obnoxij sunt: veluti
acidum ructantes. quos
Hipp. in aph. 36. lib. 6. non
valde morbo laterali corri-
pi, reliquit scriptum.

Affinis autem & quo-
dammodo similis pleuritidi
jocinoris apparet esse in-
flammatiō, sed discrimen
ex eo percipi potest: quod
dolor inferius hæreat, nec
supra spurias costas exten-
datur, & non punctorius
sit, sed magis 7 gravativus,
neque respiratio multum
læditur, & tussis si quæ adsit
sicca sit & arida, absq; spu-
to. pulsus verò & minus du-
rus, faciei autem color pal-
lidior, & quandoque ex-

6. Quod forte ventus
ad thoracis cava pene-
trans cogat sanguinem
in grumos: unde inflam-
matio.

Inflammatiō Hepatis.

7. Ob partis stupidum
sensum.

8. Omnes verò thoracis
affectus benè coloratam
reddunt faciem.

Y

crementa alvi liquida ac subcruenta, ac loturæ carniū similia, quod tamen non semper accidit.

A legitima autem ac exquisita pleuritide non parum etiam Notha differt. dolor quidem circa thoracis partes consistit, sed in musculis intercostalibus externis inflammatio est, quæ & admotis digitis dolore intenso percipi ac sentiri potest. quæ ubi da supurationem venerit, inciditur ac aperitur, si non sponte eruperit. febris hanc nulla, vel parva comitatur. respirationi exiguum accedit impedimentum. tussis nulla nisi fortè exigua, arida, pauca: pulsus neque tensionem, neq; duritiem habet.

9. Quod nervosæ partes, ut Pleura, minus afficiantur.

10. Nam sæpenumerò afferunt dyspnœam, non dolorem: nisi repenti influant.

Ad pleuritidem notham refertur & ab Aëtio excrudatibus, & cibis crassos ac pituitosos humores ingenerantibus originem habens affectus. quando enim tales humores repente in vacuum spatium pectoris, atque in ipsum pulmonem sese

fese ingesserint, multitudi-
ne sua subcingentem latera
intrinsecus mēbranam di-
stendentes dolorem infe-
runt, talem quidem ut inex-
pertis pleuritidis imagina-
tio exhibeatur, & spiritus
vias intercipientes vehe-
mentem spirandi difficul-
tatē inducant. supini autem
sic affecti ferè decumbunt:
ut plurimum quoq; non fe-
bricitant " & frequenter
frigidius solito eorum cor-
pus reperitur. si feбри affi-
ciātur, debilissima hæc est,
minimè siticulosi sunt, ac
pulsus eorū parvi ac tardi.

II. *Quia materia fri-
gida est.*

Huc referri potest & ille
lateris dolor, qui quandoq;
phthificis omnino extenua-
tis molestus est: febrem hic
etiā nō intendit & propter
conceptum aliquem flatum
frigidū oritur, " ac pulmo-
nis, subcingenti membra-
næ, adhærentis, signum est.

12. *Vt in D. de l'aube-
spine cui pulmones pu-
tres costis adherentes
cum ulcerib. varijs. in
cons. Fern. consil. 20.*

Lea. 63. Ianuarij 26.

Curatio.

Exquisitæ pleuritidis cu-
ratio à sanguinis " missione
auspicanda, detrahendus

13. *Enema 1°. immitti,
ut quidam volunt, non
debet, neq; enim tamdiu
cessandum in mittendo sanguine, potest tamen post injici.*

Y 2

14. *Quam tanti fecit ut etiam naturalē fluxionem neget prodesse nisi è directo fiat. sic ledi etiam quibus tumente liene è dextra naŕe fluit.*

15. *Vt plurimum autem initio niger est.*

autem est ex vena interna aut media brachij: quod è directo¹⁴ est lateris dolentis, ut Hipp. fecit, in quo & Gal. consentit, qui pleuritici, ut ait, quæ è directo laborantis lateris adhibita fuit sanguinis missio clarissimam sæpe utilitatem attulit. quæ verò ex brachio opposito: aut omnino obscuram: aut certè post temporis intervallum.

Copiosè autem detrahendus est sanguis, & eoque auferendus, si vires patiantur, donec color ejus mutetur & rubicundior¹⁵ fluxerit: aut ut Hipp. donec pro rubicundo & puro, lividior vel nigrior factus sit.

Missio sanguine, si alvus dura non responderit, leniens aliquod enema injici ex re erit.

Quod si vires copiosam sanguinis detractionē non sustinuerint, & dolor se non remiserit, reiteranda erit venæ sectio & ex eadem vena, vel ex vena ejusdem manus. quod & faciendum etiam

etiam, si post largam sanguinis missionem non multò minor sit factus dolor. Reiterari autem & venæ sectio in magna necessitate eodem potest die. secus unam aut alteram diem intermittere præstat.

Post sanguinis missionem locus dolens sæpius ungendus erit oleo amygdal. dulcium, vel pinguedine recenti caponis, aut gallinæ, vel butyro recenti insulso, aut si illud non est præsens butyro loto cum aqua simplici, vel cum aqua decoctionis hordei, vel cum aliquibus horum permixtis; addita exigua cera, aut pinguedine vituli, ut sit instar linimenti.

Quod si causa doloris frigidior fuerit, addi poterit oleum chamæmelinum, vel anethinum, vel ung. dialthæas. addi etiam potest muccago sēm. lini & fœnugræci, aut muccago rad. althææ. Quod si verò tales unctiones non succerint, utiliter lateri dolenti

16. *Atque hæc tutissima via. non epithematis, neque fomentis, usus autem ijs Hipp. non ut curret, sed ut cognoscat. præterea quod fit per fomenta & epithemata: violentè fit. non fert hic morbus.*

17. *Rad. alth. decoct. in aqua ad mollitiē ℥ 2. farina hordei ℥ β. flor. chamem. & meliloti ana. M. β. cum aqua decoctionis rad. althææ misceantur & f. cataplas. addito ol. amygd. dulc. & chamemel. ana ℥ 1. cui adduntur in causa frig. sem. lini & fœnugr. ana ℥ β. & tantundem dialthæas.*

admovebitur ¹⁶ cataplasma, præsertim morbo in vetustatem abeunte: ut ex rad. ¹⁷ althææ in aqua decoctis addita farina hordei, & nonnihil florum chamemeli ac meliloti, & postquam coctum fuerit; ol. amygd. dulc. & chamemel. admixtis. Si causa morbi frigidior fuerit & sputum ægrè procedat: addi potest cataplasmati sem. lini & fœnugr. & ung. dialthæas.

Exhibenda quoque sunt eclegm. sputi concoctionem promoventia: ut initio syr. de violis addito syr. de capillis veneris, vel si materia omnino tenuis fuerit, syr. de jujubis. Procedente tempore syr. de glycyrrhiz. Mesue, vel solus vel cum alijs permixtus dandus. Sub finem verò syr. de hyssopo. Posset verò sputum & adeo crudum & contumax esse, ut difficulter & cū labore procederet. quo casu supradictis syrupis, vel syr. de succo limonum vel acetos.

tes. simplex, aut oxymeli
simplex admiscendum.

Vtilia quoque eclegm.
diatragacanthæ & diape-
nidion.

Purgans verò & aliquod
med. intermedio tempore
exhibere convenit, non ta-
men potens, sed familiare
ac non ¹⁸ vehemens. quod
videlicet humores circa in-
testina & primas venas hæ-
rentes tantummodo expur-
get, ut sunt manna, cassia
fistula, syr. ex frequenti in-
fusione rosarum, diacathol.
& quæ similia: quæ vel per
se dari, vel cum decocto
violarum, uvarum passar.
glycyrrhizæ, hordei, sem.
melonum misceri possint.
in quo decocto si non nihil
rhabarb. fuerit infusum,
med. futurum erit utilius.

Victus ratio initio tenuis
esse debet, ut ex cremore
ptisanæ, vel lacte amygd.
dulcium, vel pane loto .i.

¹⁹ pane cum aqua & sacca-
ro hordei. Procedēte tem-
pore paulò plenior conce-
ditur: ut pullus coctus cum

¹⁸. Non enim possibile
ut per alvum vel vomitum,
quod in pectore
est, expurgetur.

¹⁹. Vel etiam pane cum
tenui cerevisia addito
saccharo: quod nostri
bierenbroodt appellant.

ptisana. Potus sit ptisanæ decoctum cum uvis passis & glycyrrhiza.

Abstinendum ab omni frigido non modo aëre, sed & cibo ac potu, & alio quocunque, donec omnis fuerit sedatus dolor, & pectus plene expurgatum. Somnus si non successerit syr. de papavere vel diacotion dormituris exhiberi poterit.

Leß. 64. Ianuar. 27.
Prognosis.

20. Quia in morbis acutis materia turgēt; & alias alio transfertur. ut in cor Trajecto lateris miseri, capitisque dolore. Horat.

21. Aph. 7. aph. 11. quia major morbus & vicinior cordi. deinde quod debilitato super-venit.

22. In omni affectu pulmonis magis rubet facies quam in laterum, & in laterum affectu magis quam in iocinoris.

Pleuritis morb. est acutus cujus incertus* est exitus. non rarò mortē terminatur: præsertim accedente errore aliquo. quandoq; cum crisi ad salutē definit. permutatur & aliquando in peripneumoniam. succedit ei nonnunquam empyema .i. puris in thorace collectio. Pleuritidem autē in peripneumoniam transire malum esse Hipp. ait. cujus sunt signa febris, quæ remiserat, major facta, calor quā antea intensior, faciei* color rubicundior, respiratio quæ fuerat liberior iterum difficilior red-
dita,

pita, sputi retentio, & lateris doloris intensio, non tamen punctorij & sæpius alio quã antea fuerat loco.

Expectandum. a. fuerit empyema, si in 14. diebus pleuritide laborans non fuerit per sputū expurgatus. quod

tamen non semper, sed quandoque pleuritidi supervenit, & non prius quam post 14. diem. cessat tunc

dolor lateris, desinet & febris, sed non in universum. exigua enim quædam

remanet, & pus expuitur aliquando purum, aliquando fæculentum. Bonum

autem in omni pleuritide sputum citò ac facile expui.

quo enim citius prodierit: eo morbus brevior futurus

est. si tardius appareat: in longius morbus protrahitur.

Sputum autẽ optimum est, quod cruentū & valde

permixtum apparet: de- terius quod non valde per-

mixtum, quodque flavum aut ruffum, albū, viscidum

& * rotundum, ut Hipp. ait, inutile est. malum autem

23. Si enim potuisset exire liberè; non facta fuisset permutatio.

24. Vt 3^o. epid. in Anaxione. qui non est suppuratus factus.

25. Quia nulla tensio membrana, abscessu jam rupto, superest. Atq; ex hoc egri quandoq; spem bonam, sed fallacem, concipiunt.

26. Non enim fieri potest ut non una exspuatur pituita. quod si non permista sint; imperfectæ concoctionis signum est.

* Significat enim humores frigidos & calorem magnum.

Y 5

27. *Ratione expurgationis criticæ. quæ per alvum etiam fieri potest à natura.*

valdè viridè; atq; hoc etiam deterius, quod nigrū. Iam & malum est pleuritide aut peripneumonia laboranti adveniens alvi profluvium ut Hipp. ait. significat enim, ut Gal. interpretatur, hepar per consensum ita malè affici, ut præ imbecillitate non queat ad se attrahere altimentum, neq; id in sanguinem convertere. Potest tamen prodesse alvi profluvium ratione vacuationis, apparentibus signis concoctionis, & morbo non vehementissimo.

Spuria Pleuritis.

Spuria pleuritis sanguinis missionē non necessario requirit. sed tamen si adsit repletio, & vires ætasq; cōsentiant; utiliter etiā vena secatur, veluti & in omni lateris dolore ex casu, aut percussione, aut simili externa causa: præsertim si febris qualiscunq. accesserit. Eclegm. in spuria pleuritide non est opus, sed leni medicamento corpus utiliter quoq; expurgatur. Locus dolens oleis

oleis supradictis ungen-
dus. cataplasma & eidem
simile imponi potest. quod
si verò ad suppurationem
inflammatio tendat: adju-
vanda erit suppuratio cari-
eis rad. liliorum, & fer-
mento cataplasmati addi-
tis. Vbi ad suppurationem
venerit, si non sponte erupe-
rit, abscessus incidendus &
aperiendus erit. reliqua de-
inde curatio facienda, qua-
lem abscessus requirit.

Sed si à casu, aut percus-
sione dolor factus fuerit:
initio ungenda pars læsa
ol. rosato, vel myrtino, aut
utrisque simul permixtis,
addito exiguo aceti.

Si dolor magnus sit, di-
ctis ol. addendus pulvis ro-
sarum rubrarum, sem. myr-
ti, sang. draconis, acaciæ,
hypocystidos & similia, &
ceræ .q. s. ad formandum
ung. solidum instar empla-
stri. quod deinde linteo
panno inductum, loco do-
lenti calidum admoven-
dum. Procedente tempore
oleis addi poterit ol. cha-

mæmel. vel etiam nonnihil laurini.

28. *Nihil aliud quam asthma cum dolore.*

In lateris autem dolore ²⁸ de quo Aëtius scribit, non expedit sanguinem detrachere; sed calfacientia incisiva & repurgantia intrinsecus & extrinsecus offerenda. alvus enematis subducenda, aut si vires ferant med. aliquod quod pituitam expurget exhibendum: quale in asthma excrudis humoribus. Eclegm. etiam qualia in tali asthma sunt offerenda. Pectus & latera ungi refert ung. aliquo calfaciente, & dolorem leniente, ut ex ol. anethino, liliorum, rutaceo, & si maiore calfactione opus sit, laurino oleo etiam permixto. Requiritur victus ratio qualis in asthma. Vtilissimus potus est ²⁹ hydromeli; præsertim si nonnihil hyssopi in eo sit incoctum.

29. *Vt & in omni morbo frigido pectoris.*

30. *Flos anodynus. sem. cymini discutit flatum. multum profeci his. Remb. Dod.*

Lateris dolor phthisicis superveniens nullo modo sanguinis detractionem admittit. fomentis solvitur. ut ex floribus ³⁰ chamæmel. & sem.

fem. cymini permixtis & in sacculo confutis. qui rore vini calfactus dolenti loco admovetur. Vtiles quoque unctiones ex ol. liliorum & anethino. observata victus ratione, qualem phthisis requirit.

De Peripneumonia.

Lea. 65. Ianuar. 30.

CAP. 29.

Peripneumonia : quandoque ab initio & per se oritur nullo præcedente aliquo alio evidenti morbo : quandoque ex permutatione alterius morbi fit, ut quando anginæ, aut pleuritidis succedit. Quæ per se oritur, inflammatio est pulmonis, ac modo ex sanguine puriore, modo ex tenuiore & biliosiore gignitur. ex pituitoso, quod plerisque placet, peripneumoniam oriri rationi repugnâs apparet. nam ex familiari pulmonis sanguine promptissime gignitur. purus autem tenuis & vaporosus hic est, qui in dextro cordis sinu

1. Πνευμονίς, Hipp. Pulmonaria dici posset, ut colum. Pulmonarios appellat.

2. Est tunc phlegmone erysipelatodes. nec obest quod fuit, ut ait ab Althomari Anton. accedit enim obstructio ex aëre, &c. A pituita non tam ardens febris, sed potius asthma, aut similis effectus excitatur.

Causæ.

3. *Meatus pulmonis coarctando.**Aph. 23. lib. 3.*4. *Qualis, præcedente aëre fervido & superveniente subito aquilonari vento, mense Octobri cōtiguit. anno 1557.*

elaboratus per arteriam venalem in eum dimittitur. ex quo deinde alimentum sumit. Occasionem præbere potest humorum multitudo, maximè si aliqua extrinsecus causa accesserit veluti aër hybernus frigidus. nam ut in aph. hyeme pleuritides & peripneumoniæ accidunt.

Maximè autem nocivus est hybernus aër crassus, & vaporibus infectus pulmonis meatus obstruens. unde inspiratione minus libera, calore oborto, inflammatio excitatur. Destillatio autem tenuis & acris, confertim in pulmonem illapsa, ardorem inferens, inflammationis pulmonis quandoque & causa est.

Signum autem peripneumoniæ primum est: difficilis admodum respiratio. aded ut laborantes præ angustia suffocari videantur & erecti sedere conentur. adest & febris acuta. dolor verò non vehemens, ut Gal. 4°. de loc. affect. sed gravi-

gravitatis sensus. qui ad pe-
ctoris sternon & dorsi spi-
nam non raro extenditur,
ubi videlicet membranæ
pulmonem ambientes su-
spenduntur. Hipp. autem
in lib. de morb. & in lib. de
dieb. decret. sentiri quidem
gravitatem confitetur: sed
simul adesse dolorē refert
circa spatulas, claviculā, &
mammam. In lib. verò de
dolor. in homine dolorē sese
ad laterum mollitudinem
extendere scribitur. Et fre-
quenter sanè, non tamen
semper in peripneumonia
dolor aliquis lateris senti-
tur, non quidem pungens,
sed mitior; nihilominus ta-
men molestus. At Gal. pul-
monem rectè ait dolorem
non sentire, sed membrana
quæ ipsum ambit, ac cõve-
nit; sensus non est expers,
& dolorem distenta infert.
Itaque si humor non modo
venas & arterias, sed cor-
pus pulmonis totum im-
bolens, putrescat atque in-
flammationem interius ac-
cedat, gravitas illa tantum-

modo sentitur, quæ ad ster-
non & spinam dorsi sese
extendit. Quando verò ad
unam aliquam pulmonis
partem, ut exteriorem, in-
flammatiō consistit, dolor
in latere distēta membrana
sentitur. differt à pleuri-
tide: quod non sit puncto-
rius, & arteriarum pulsus
haud durus, sed mollis,
quandoq; magnus. Maxil-
læ sive genæ in peripneu-
monia magis rubentes sunt
quam in pleuritide.

Signa causarum.

A sanguine autem purio-
re ortam peripneumoniam
sputum ostendit rubrum,
cruentum, & febris mitior.
à bilioso verò sanguine spu-
tum prodit flavum, non
multo sanguini permixtū,
& febris ardentior est ma-
gisque acuta, ac lingua
asperior.

Lect. 66, Ianuar. 31.
Curatio.
I. Primaria.

Sanguinis autem detra-
ctio in peripneumonia ne-
cessario requiritur, quæ &
statim ac mox initio fa-
cienda est, & ex dextri qui-
dem brachij interna vena.
ex altero brachio iterari
poterit

poterit necessitate urgen-
te. Doloꝛe verò in aliquo
latere existente, è directo
lateris dolentis sectio fa-
cienda erit: veluti in pleuri-
tide. Pectus, verò & latera
ungenda ol. amygd. dul-
cium, pinguedine caponis,
& butyro insulso, aut loto,
addita muccagine rad. al-
thææ; & si febris valde acu-
ta, ol. violaceo. Si dolor ad-
sit alicujus lateris, cataplas-
ma etiã ad moveri utile erit,
quale in pleuritide. Ecleg-
mata in hoc morbo omni-
no sunt offerenda; habita ta-
mẽ ratione efficientis cau-
sæ. si enim tenuis & acris
destillatio peripneumoniã
excitarit; exhibendi erunt
syr. qui tenues humores in-
spissare & acrimoniam eo-
rum obtundere queant: ut
est syr. de jujubis, præsertim
syr. de papavere admixto,
qui non modo defluentem
humorem inspissare, sed &
ejusdem destillationes re-
primere valet. quib. & uti-
liter additur syr. de violis,
quando sputum biliosius &

5. Non sint frigida, li-
cet morbus calidus, ne
eductio sputi impedia-
tur: sed humida, mol-
lientia, expectorantia.

6. Eadem ratione, qua
Veteres omni composi-
tioni ad pectus, addide-
runt papaver.

Z

7. Remittente se calore,
& concoctionis signis
apparentibus.

8. Potus ex ptisanæ de-
cocto cum glycyrrhiza.

9. Periculosior quam
pleuritis: mēbrum enim
nobilius afficit.

10. Rarū quod 7. epid.
de caupone, cujus peri-
pneumonia ad 14. diem
duravit, nar-
ratur.

Prognosis.

11. Non cruori permix-
tum, ut in pleuritide,
sed cruor prorsus: ex
ipso enim pulmone pro-
ducitur. Quibus flavum,
rarissimè, imo nunquam
curatos vidi. R. Dod.

flavum apparet. Quod si
verò propter meatuum pul-
monis obstructions, veluti
à frigore hyberno, aut ab
aëre crasso & vaporib. in-
fecto, nata fuerit peripneu-
monia, exhibendi syr. qui
citra evidentem calorem
aperiendi vim habent: uti
est syr. ex adiantho, cui ini-
tio nonnihil syr. de violis,
procedente verò tempore
aliquid syr. de glycyrrhiza
admisceri utile fuerit.

Alvus quoque leniente
ac clementi aliquo medi-
camento subducenda est.
veluti in pleuritide: aut
similibus enematis expur-
gandus.

Victus ratio, qualis in
pleuritide requiritur². Om-
nia actu frig. fugienda sunt.

Morbus autem iste pe-
racutus & admodum peri-
culosus³ est. qui non raro⁴.
7. die vel prius terminatur.
Sputum citò prodire in hoc
morbo bonum est. Opti-
mum autem sputum, quod
cruentum. proximum, fla-
vum cruore admixtum. fla-

VURI

vum ac omnino biliosum, deterius. Viride aut nigrum, deterrimum. Solvitur autem hic morbus ad salutem frequētius per sanguinis è naribus copiosam eruptionem, quandoq; per alvi fluorem: quum spumosa & biliosa expurgantur, & apparentibus signis concoctionis & in die decretorio. aliter alvi fluorem in peripneumonia supervenire malum, ut aph. 16. lib. 6. apparet.

Aëtius verò & quandoque inflammationem in pus converti ait, & per vëtre, aut per urinam pus excerni, atq; tunc statim ab omni molestia laborantem liberari. Si verò sic pus non expurgetur: acervatim in pulmonem irruere, & laborantem suffocare, aut in phthisin morbum permu-
tari.

Peripneumonix autem phrenitis superveniens, malum aph. 12. lib. 7.

Mala etiam vigilix sunt & imaginationes men-

12. Quia indicio sunt
rapi materiã ad caput.
quod malum, nisi sequatur
hemorrhagia.

Z 2

tem perturbantes, & extremarum partium frigiditates. quibus enim hæc accidunt: quarto, aut septimo moriuntur, ut Aët. testatur.

Lect. 67. Februar. 2.

II. Ex permutatione.

In peripneumonia quæ non ab initio invadit, sed vel anginæ, vel pleuritidi succedit, sanguis non est mittendus: maximè si, ut Paulus ait, diu laborantes in hoc statu fuerint, & sanguis per initia detractus sit. ex priore siquidem morbo, & sanguinis detractio, vires infirmiores factæ, sanguinis detractio non sufficiunt. Eclegmata utiliter exhibentur ex ijs, quæ pulmonem & pectus expurgare possint: ut sunt syr. de capill. veneris: & de glycyrrhiza.

Alvum quoq; enemate aliquo expurgari convenit. Si dolor latus aliquod premat, fomentis & unguëtis uti licebit: ut supra dictum, ubi de anginæ in peripneumoniam permutatione. Periculosam autem, & ibidem dictum, peripneumoniã anginæ

Prognosis.

ginæ succedentem. Pleuritidi autem supervenientes securiores esse peripneumonias ijs, quæ ab initio fiunt, in Coacis legitur.

Succedit autem lateris 1.

dolori peripneumonia¹³ ut

Aët. ex Archigene refert:

quando ad animi usque de-

liquium sanguis detrahitur.

nam refrigerato corpore,

pulmo rarus & calidus, la-

terique vicinus promptè &

facile morbum, ait Aëtius,

fuscipit; atque idcirco san-

guinem in pleuritide non

ad animi defectionem du-

cendum esse ait: sed repeti-

ta sectione illum potius au-

ferendum. & propter hanc

eandem causam non è di-

recto lateris dolentis, sed

ab opposito sanguinem de-

trahi vult, in quo ab Hipp.

& Galeni doctrina recedit.

Sive autem ab eodem, si-

ve ab opposito latere san-

guis detrahatur, æquè cor-

pus refrigeratur, & pulmo

rarus & calidus humorem

fuscipere potest, ac prom-

ptius quidem quando ex

13. *Duplex modus quo peripneumonia succedit pleuritidi. nos secundo modo semper fieri vidimus. ratio tamen priori non repugnat. Videtur autē Hipp. contra quem agit Archig. non ad defectionem animi, sed mutationem sanguinis voluisse detrahi.*

14. *Quod satis confitentur, qui in eadem cum Archigene sententia sunt, nam materia venenata si pleuritica sit, nolunt oppositam fieri sectionem, ne rapiatur ad cor, vel pulmones,*

opposito sanguis ¹⁴ detrahatur, quam quum ab eodem, nam quæ ab opposito fit latere, minus cito doloris levamentum affert, quā quæ è directo. levamentum autem doloris fit vacuato humore inflammationem faciente, propter quam rationem Aëtio, aut Archigeni hac in parte nihil deferendum, sed Hipp. & Galeni doctrinæ insistendum.

Quod autem peripneumoniæ ex pleuritide in Coacis securiores scribantur, quam ab initio factæ, id quoque sanè interpretari debet. contrariari enim ijs videtur, quæ in aph. habentur. ubi legitur: à morbo laterali inflammatio pulmonis mala. aph. 11. lib. 7. Non est siquidem de ijs peripneumonijs accipiendum: quæ eo modo, quo Aëtius refert, oriuntur: sed de ijs, quæ propter affectū aliquem prius in pulmone cōsistentē, velut phyma seu abscessum succedunt. quod fit, quando humor ex inflammatione

flammatione lateris in pulmonem transfertur, & per sputum expurgari nequit. tunc enim humore in pulmone hærente partes prius malè affectæ gravius affliguntur. nam & hoc modo peripneumonia pleuritidi non minus, quam angina succedere potest. & tales minus malignæ, ac magis salutare apparent: quâ per initio ac per se invadentes. possunt siquidem hac laborantes, purulenti facti, ad temporis successum expurgari, atque sic liberari. non minus quam qui ab angina peripneumonici facti sunt.

Cōtingit vero & quandoque ut post febrem aliquam dolor unum aliquod latus, vel dorsum vel aliquam pectoris partē occupet: difficili ac rectæ cervicis spiratione accedente. & talis supervenit; quando in pulmone phyma, sive abscessus multo ante (citra tamen dolorum aut molestiæ sensum) constiterit, qui per febrem acriore factō, quod

III. Ex abscessu.

15. Nam quamdiu ab abscessu eruptionē moliente membrana non tenditur, dolor non fit.

in eo continetur, pure inflammatus, quum erumpere conatur dolorem affert. & talis quidem affectus ad peripneumoniam ex permutatione factam referendus est. Differt verò hic non parum magnitudine. quandoq; enim dolor major est, & respiratio difficilior: aliquando mitior & respiratio quidem impedita, sed minus. Major dolor fit propter abscessus magnitudinem, vel morbi, cui successit, vehementiam. & talis ut plurimum citò interficit. Minor dolor mitioribus febribus succedit, & minores abscessus comitatur.

Lea. 68. Febr. 3.

Adversus hujuscemodi dolores non alia remedia adhibenda, quàm unctiones, ecleg. fomenta, & si alvus requirit, enemata, velut in peripneumonia ab angina supra dictum. Mitiores dolores si febribus cessantibus adhuc perseverent, & per fomenta, aut unctiones non sedentur, exhiberi utile erit

erit, quæ purulentos humores aliquo discutere modo, ac resiccare queant: quale decoctū sarzæ perillæ: cui pro conditione ægrotantis addi poterunt, vel farfaræ rad. vel folia, vel hyssopus, vel, si non obsit calor, marubium. ex hoc decocto manè ʒ ʒ. aut 6. deinde sumat & totidē à prandio. In coena, aut prandio hydromeli conceditur, aut vinum cum hydromelite, aut saccharo. Quando autem peripneumonia ex permutatione facta, sive pulmonis abscessus ad suppurationem venerit, curandi tunc erunt laborantes: veluti suppurati.

De Empyemate.

CAP. 30.

SVppuratio, de qua agimus, seu empyema, collectio est humoris purulenti inter membranam costas ac latera subcingentem, ac pulmonem .i. in vacuo thoracis. comitatur hanc

Z 5

1. Nam hoc generale
theorema. Dum fit pus
febris magis fit, quam
facto.

2. Ut omnes hectici &
phthisi laborantes, no-
ctu magis affligi viden-
tur.

3. Affligitur enim tunc
sepimentum pulmonum.
unde & respiratio diffi-
cilior.

Curatio.

4. Pus enim pharmaco
expurgari non potest.
licet natura fortis ali-
quando eò depellat, ut
per alvum excernantur.

5. [Contrarium Gal.
simpl. facult. 5. c. 13.
asserit de fœniculo om-

doloris & febris vehe-
mentia remissio. manet ta-
men aliqua febris hecticae
similis, noctu : vehemen-
tior, interdiu remissior: do-
nec integrè expurgata fue-
rit suppuratio. sputū, quod
cum tussi procedit, est pu-
rulentum. Colligitur autem
istud frequentissimè in uno
thoracis laterè. in quo nem-
pe inflammatio fuit. senti-
tur autem in hoc gravitas,
& melius in illo laborans
decumbit, quam in : altero.
sentit verò & ipse, quando
ab uno latere in alterum se
convertit, subinde aliquid
diffluere: præsertim copio-
so humore purulento exi-
stente illic. atq; tunc quan-
doque latus affectum tu-
midius etiam apparet.

Sanguinis missio in sup-
puratione utilitatem nul-
lam, sed nocumentum, af-
ferre potest. nec ventrem
expurgantia : conveniunt.
Diuretica : leviora utiliter
exhibentur. nam præter
quod urinā movent etiam
ad facilem expectoratio-
nem

nem conducunt : ut sunt rad. fœniculi, rad. asparagi, brusci, hyssop. scabiosa, adianth. capill. veneris, sem. anisi, apij, fœniculi & similia. ex quibus decoctis potiones parari possunt, ad expectorandum, & urinas movendas utiles. per urinas etenim & pus in pectore contentum quandoque excerni contingit : ut Gal. 6. de loc. aff. testatur.

Eclegm. in suppuratione omnino necessaria : inter quæ diamarrhubium Pauli facile principatum tenet. quod in officinis quibusdam syr. de prassio descriptionis Pauli, nomine extat. cui addi potest syr. de glycyrrhiza, vel hyssopo : & si aliqua adsit destillatio è capite syr. de papavere. Pectus ungi refert aliquo sputi exitum promovente : ut sunt dicta in curatione pleuritidis; præsertim addito ol. irino aut pulv. rad. iridis, & aliquantulo croci.

Cibus sit concoctu facilis, ex optimis carnibus, vel

nibusq; diureticis. quod puris è thorace expuitioni adversentur. rationem addit. quod serosiorrem partem sanguinis ad renes deducunt. quod autem crassum, non ita facile expuitur.] & cap. 22. ejusdem] ob extenuandi tamen facultatem communem sub idem genus convenire ait, cap. 23.]

1, Lib. 7.

recentibus ovis. Conducunt & amygd. dulcia, nuclei nucum pinearū, & pistaciorum, & quæcunq; ex his fiunt tragemata. Potus sit aqua mulsa, vel decoctio ptisanæ, glycyrrhiza, vel saccharo addito. vinum non detur nisi tenue, & saccharo vel aqua mulsa dulcoratum.

Prognosis.

6. Multi ad annum usque supersunt. verum isti sunt jam tabidi.

7. Hipp. secari voluit aut uri. Atque etiamnum hodiè in Ægypto utrumque faciunt. & nos pus à sanguine ex vulnere in cavum pectoris defluente factum, Diatresi evacuandū curavimus. verum empyemate vero pulmonem semper corruptum inveniri se testabatur. R. Dodon. Itaque nihil sperandum esse.

Perdurare autem supurationem ultra 40. dies malum. nam, ut Hipp. ait. Nisi suppuratus in 40. diebus repurgetur à die qua fit malum: ad phthisin transit. Malum quoque est pus faeculentem, flavum, viride, & valdè foetidum. Tumor quoque apparere latus perniciosum est: multitudinem enim humorum in pectoris spatium collectorum ostendit.

De Phthisi.

CAP. 31.

Lea. 69. Febr. 20.

PHthisis, quæ latinè etiā tabès dicitur, pulmonis est exulceratio. quam committatur

mitatur lenta, & non magna febris; nō intermittens, sed tamen quæcitō ab assumpto cibo, & sub noctem magis invalescit: & intensior est, quam interdiu. accedit & universi corporis consumptio & extenuatio, sensim, paulatimq; cum virium defectione ingravescent.

1. Quia tum alimentum in corpus distribuitur.

Oritur phthisis tribus maximè de causis: vel enim propter vitiosam pulmonis constitutionem: vel propter acrem, mordacem, exedentemque humorem: quandoque etiam propter venæ alicujus non curatam rupturam.

Pulmonis mala est constitutio: quando mollis, tennella, & corruptioni parata ejus est substantia. qualem plerique ab ipso primo ortu, ac à natura à parentibus acceptam obtinent.

2. Hic avum, patrem, ac omnes liberos phthisi perijisse vidimus. Ut istud averterent pagani, illorum qui tabe, vel bydrope obijissent liberos, pedes aquæ immergere jubebant, dum ureretur cadaver. Plutarch. 2. de sera minimis vindicta.

Nam tabida stirpe geniti plurimi phthisi: quasi hæreditario jure marcescunt.

Altera causa acris, salsus, mordaxq; humor, qui sub-

3. *Vt in muliere, quæ ex icterica phthisica evaserat. cujus sputum flavum. Expurgat autem se quandoq; per pulmones natura. sic in nobili quodam melancholia laborante, ac illi sputum nigrum erat, verum non malum. quum enim non esset acre, pulmones non erodebat. cōtra, ex lie-ne ad pulmones delatis humoribus adustis, nau-tam moriētem observa-vimus. Et scudilo de-stillatione jocinoris (nisi leg. sit Ichoris) pulmo-nes vomitans, interiit. Amman. lib. 14. Signa.*

4. *Minor si à propria pulmonis imbecillitate.*

inde à capite in pulmonem fertur : quandoque à corde aut à jocinore ad pulmonē rejicitur : vel pus quod est in cavitate pectoris diutius conclusum.

Venæ autem rupturam, quæ 3. est causa, phthisis. consequitur : quando sanguis, à vena rupta non conglutinata in substantiam pulmonis dimanās, putrescit, & substantiam pulmonis inficit ac corrumpit. Et hæ quidem præcipuæ sunt exulcerationis pulmonis causæ. quibus annumerari possunt, quæcunque latente ac occulta proprietate idem faciunt : ut lepus marinus, & si quæ sunt alia.

Tussis initiò molesta est. + major verò etiā si destillatio adsit. cum qua cruenta quædam quandoque citra dolorem exspuuntur. sequitur deinde sputum purulentum. quod aquæ injectum minimè alterius sputi ritu innatat, sed in fundum descendit ac subsidet, quod etiam quandoque carbonibus

nibus injectum graveolet. aliquando verò & membranarum una, Vel bronchiorum particulæ expuuntur. quæ ipsius exulcerationis magnitudinem, & curationis difficultatem majorem ostendunt. & siquidem pus, quod exspuitur non syncerum fuerit; sed ei pituita permisceratur, adest tunc & ex capite destillatio.

Proni autem ad phthisin sunt, qui angusto sunt pectore, scapulasque alarum modo à tergo prominentes habent; & quibus defluxiones multæ à capite deferuntur, præsertim salsæ pituitæ.

5. *Quia signum debilis pulmonis. alioqui fuisset extensus thorax.*

Contingit autem phthisin frequentissimè fieri à 18. ætatis anno ad 35. ut Hipp. scribit. hoc est eo ætatis tempore, quo calor naturalis fortissimus, & bilis redundat.

Anni .a. tempus phthisis facit maximè, & noxium autumni est. deinde & ver. quum (ut inquit Hipp.) facilius folia erumpunt.

6. *Intemperies aëris. manè frigus, post calor dominatur. autumno deficiunt humores: itaque nutriri corpus non potest.*

Le&. 76. Februarij 21.

Curatio.

Phthisis curatio partim in bona vivendi ac victus ratione, partim in usu lactis, partim etiā in eclegmatum, & aliorum paucorum remediorum usu consistit.

4. Dieta.

7. Hinc usus principalis navigandi phthisi affectis. ideoque in Ægyptum navigatio. Plin. l. 3. c. 6. Sylvarum item resimiferarū. l. 24. c. 6. Averrh. in Æthiopiam, Arabiamque ablegari tabidos dicit 3. Collig. c. 17. Cels. contra, densitate prodesse Alexandrinum aërem dicit. l. 3. cap. 4.

8. Extenuat enim corpus, quod illis satis emaciatur.

9. Quia facultas debilis, & multa refectione indigent.

10. Sic neque liba aromatica. quia non fermentantur.

Aëris omnis excessus fugiendus, caloris, frigoris, & humiditatis: tum & ventosa constitutio. aër siccus, serenus, utilis est. Corpus frequenter, aut multum exercere non expedit. Abstinere in cibo & potu ab omnibus acribus, falsis, & acidis oportet, & ab omnibus ijs, quæ difficulter concoquuntur, & parum alimenti afferunt. difficulter concoquuntur carnes hædinæ, bovinæ, cervinæ & similes, & aviū palustrium. panis non benè fermentatus. caseus vetus, castaneæ, nuces juglandes & avellanæ: & similes alij fructus. parum alunt pisces, qualescunque sunt. panis furfuraceus, poma, pira, cerasa, & similes fructus.

Bonæ sunt carnes hædorum

rum lactantium¹¹, vitulorum, pullorum gallinaceorum, tum & gallinarum ac caponū juvenum, pedes ac capita¹² vitulorum, ova recentia: ex fructibus, ¹³ uvæ passæ, amygdala dulcia, nuclei nucum ¹⁴ pinearū & pistaciorum, & quæcunq; ex his confiunt bellaria, utilia sunt. Si febris vehementior fuerit, sic ut urinæ color ¹⁵ intendatur, ptisana cum cibo coquenda erit, atque ex ipsa quoque forbitiones dandæ. decoctum verò hujus & pro potu exhibendum: in quo, si calor excesserit, incoqui poterunt refrigerantes herbæ aut flores: ut violaria, cichorium, lactuca, vel etiam ¹⁶ plantago, flores rosarum, flores violarum, aut istis deficientibus conserva rosarum, vel violarū. & conf. quidem rosar. rubrarum si alvus liquidior, vel albarum vel dilutè purpurearum, aut conf. violarum si alvus durior. Vehementia febris remissa ac urina sanorum

11. Carnes agninae excrementitia superfluitate abundant. quæ in hædinis minimè est.

12. Omnium animalium extrema quum succum lentū habeant, multum nutriunt. aliorum tamen animalium difficulter coquuntur.

13. Caricæ ob humiditatem putrefactioni obnoxie.

14. In quibus plus præsidij quam in pistachijs.

15. Quod non fit donec sola hæctica laborant, sed accedente putrida.

16. Quæ à strictione sua prodest ulceribus.

17. Cujus solè usu, qui incipiēte phthisi laborarent, restitutos memini.

simili, pro potu utile erit¹⁷ hydromeli, sed dilutius, quod ad expurgationem ulcerum pulmonis multum conducit, & ad alimenti distributionem non parum facit.

II. Lactis usus.

18. Huic lacti herbidos per montium æstiva potus veteres Medici commendabant. Plin. l. 24. c. 6.

Eodem tempore etiam lac commodè probetur. eligendum asininum, si haberi potuerit, quod humano lacti, quam reliquorum animalium, similis est. & quia tenue & ferosum, non facile in vètriculo coagulatur. illud si haberi nequeat, caprinum dandum erit: & præsertim earum, quæ in siccoribus locis¹⁸ pascuntur. Ante tamen usum lactis levi aliquo medicamento corpus expurgari convenit: ut si qui sint in ventriculo vitiosi humores, vel circa primas venas hæreant, ij prius evacuentur, ne ab his adveniens lac corrumpatur.

19. Vel diaprunum non laxativum, vel sola prunella.

Ad hujusmodi autem expurgationem, utile¹⁹ est infusum rhabarbari cū manna; aut medulla cassiæ fistulæ,

læ, vel simile aliquod.

Exhibendum autem lac est mane jejuno vētriculo, recens mulctum, & adhuc tepidum, si fieri potuerit, 3. aut 6. mensura, aut amplius, si concoqui queat. cui admiscendū nonnihil sacchari, ne in ventriculo coaguletur: vel etiam aqua pura²⁰ cū saccharo decocta, quando vel lac crassius, vel febrim intendi ab usu lactis posse, metuitur. Lacte assumpto, quiescendum & ab omni alio cibo abstinendum: donec concoctū fuerit. quod 3. aut 4. horis fieri poterit. neque etiam ullus potus interea exhibendus, minimè vini. in prandio & cœna à lacte abstinendum. Quod si verò & manè ab eo aliqua de causa abstinere contingat, ejus loco exhiberi poterunt ova recentia sorbilia, vel ex carnibus contusū: cui addi vel amygdala dulcia, vel nucleos nucum pinearum, vel pistachia, utile fuerit. Sæpius phthificis offerendus cibus

20. Aut etiam aqua cichori, vel intybi.

non minus quam ter in die. medio tempore bellaria etiam dari possunt; veluti ex pineis & pistachijs morsum, vel similia alia.

Lea. 71. Febtuat. 23.

21. Quod ut plurimum evenit. quæ si non reprimantur, ulcera consolidari nequeunt.

22. Quæ tota substantia pectori utilis.

23. Quæ in omnibus artheriacis adhibet Gal. aut opium. sic quidam ad multos annos troch. de astere servati.

Eclegmata in phthisi requiruntur, quæ ulcera expurgare queunt & simul consolidandi facultatem conjunctam habeant. & si destillationes adsint²¹: quæ eas sistant ac reprimant, qualis est syr. ex symphyto. cujus hæc est compositio. \mathfrak{z} rad. symphyti .i. consolidæ majoris, \mathfrak{z} 2. rad. brusci aut asparagi, glycyrrhizæ ana \mathfrak{z} β .²² farfaræ cum rad. manip. 1. β . scabiosæ, marubij ana M. 1.²³ cap. papperis \mathfrak{z} 1. β . vel \mathfrak{z} 2. uvarum passar. mundatur. nucleorum nucum pinearum ana \mathfrak{z} 1. f. omnium decoctio in aqua .q. f. ad \mathfrak{z} 1. colato adde sacchari \mathfrak{z} 8. mellis \mathfrak{z} 4. f. syrupus. de quo sæpius in die erit lambendū. Expurgat ulcera pulmonis, eadem consolidat, ac destillationes sistit.

Quod si verò humores
destil-

destillantes adeò frequen-
tes sint, ut hic syr. ad reprimendum & sistendum fluorem non videatur sufficere: tunc eidem admiscendus erit syr. de papavere. Si verò & acrimonia non satis isto syr. retundatur; admisceri poterit ei syr. de jujubis, aut de violis. Si autem & non satis videatur expurgare; addi potest syr. de hyssopo, vel diamarrhobium, sive syr. de prassio Pauli: præsertim si febris exigua sit & nulla, aut minima adsit destillatio.

24. *Quam augent vehementer expectorantia.*

Sunt verò & alia quædam eclegm. quæ phthisicis offerri possunt: ut quod appellatur loch de pino, quod nucleos recipit nucum pinearum; & loch de pulmone vulpis, quod à plerisque valde commendatur. sed istis tamen præstat syr. de symph. supradictus.

25. *Qui tota substantia utilis habeatur: quamvis nil eximium præstare videatur.*

Pectus oleo aut ung. aliquo non est ungendum: nisi contingat sputum cum difficultate procedere, quo

26. *Frigida enim morbus postularet, quæ expectoratione impediens, molestiam augent.*

27. Alioqui calidius, dum ætate rancescit, efficitur.

28. Reprimit enim sensim sudores, & vires corroborat.

29. Potius papaveris quod vim somnificam habet, ut hyoscyami, nec ita noxium est.

30. Ad tertiam partem, adeo ut decoctionis aqua lentorem contrahat.

31. Hinc Nero, quum Senecam interficere statuisset, à muliere cum qua consuecebat Tabellam laborantem brevi aliquin etiam interiturum, dimisit. Xiphilin.

32. Si frigido sint corde. nam illis sana pulmonis pars ad refrigerium sufficit.

casu temperato aliquo ung. illiniri poterit: ut ex butyro loto, pinguedine vituli, ol. amygd. dulcium recentissimo²⁷ simul mixtis. quibus etiam, si calor major adsit, addi poterit nonnihil ol. violacei.

Vesperis hora somni sumenda est confer.²⁸ rosarum rubrarum circiter 3 β. pondere. cui, si destillatio vel vigiliæ molestæ sint, addi potest nonnihil sem.²⁹ hyoscyami, vel syr. de papavere.

Poterunt verò & tabellæ ex saccharo parari cum decocto capiti papaveris³⁰. quæ sæpius sumi, & in ore contineri, per noctem possunt. sistunt istæ destillationem, tussim sedant, & ad somnum conciliandum prosunt.

Difficilis autem morbus phthisis est, qui ut plurimum paucis mēsis³¹ hominem absumit. quandoq; tamen bona victus vivendique ratione, & remediorū usu, vita ad multos³² producit

ducitur annos. sed ad integram sanitatem ægrum perducere, vel impossibile, vel difficillimum. Quum enim pulmo in continuo sit motu, ægerrimè ulcera ejus curationem admittunt. accedit, quod eadem citra tussim expurgari nequeât: qua & ipsa rursus offenduntur. Superveniens autem phthificis alvi profluvium, lethale est³³, ut inquit Hipp. 14. aph. 5. partis. præsertim capillis à capite simul defluentibus. ut 12. ejusd.

Malum quoque pedes tumidos³⁴ fieri: veluti hydro-picis accidit. Iam & lethale esse, Hipp. refert, si spiritum injectum carbonibus graveoleat³⁵, capillis à capite defluentibus 11. quintæ particulæ.

33. Quia non solum vitalem, sed & naturalem facultatem debilem significat.

34. Fit enim ex debilitate hepatis.

35. Quia & summa putredo, & summa virium dejectio significatur.

De Palpitatione Cordis.

Leet. 72. Februar. 24.

CAP. 32.

Palpitatione cordis est motus ejus depravatus, tremori quodammodo similis,

1. Palpitatione est nervorum, cordis, & venarum agrotantium, motus.

A a 4

Nicandri scholiast. h. e. & affectio contra naturam, per quam diastole, seu dilatatio cordis impeditur. Causa. Causa palpitacionis quandoque sanguis est crassus & multus, circa cor cōsistens & ipsum coarctans: quandoque verò & vapores, ac fumi crassi, melancholici. Potest verò & palpitacionis causa esse humor multus, & copiosior quam secundum naturam in pericardio collectus, ne cor liberè attollatur impediens. Vel etiam tumor aliquis in eo consistens, ut Gal. ait.

Nicandri scholiast. h. e. & affectio contra naturam, per quam diastole, seu dilatatio cordis impeditur. Causa. Causa palpitacionis quandoque sanguis est crassus & multus, circa cor cōsistens & ipsum coarctans: quandoque verò & vapores, ac fumi crassi, melancholici. Potest verò & palpitacionis causa esse humor multus, & copiosior quam secundum naturam in pericardio collectus, ne cor liberè attollatur impediens. Vel etiam tumor aliquis in eo consistens, ut Gal. ait.

2. Humorem & callum vidimus. tumorem nunquam. R. Dodon. In Maximil. 2. Imperatore, præter hydropē pulmonis, palpitacionis causa fuit aqua in Pericardio aucta. Epist. medic. 136. Craton.

3. Aëris enim attractionem impediens, quo minus attollatur efficit.

2. Humorem & callum vidimus. tumorem nunquam. R. Dodon. In Maximil. 2. Imperatore, præter hydropē pulmonis, palpitacionis causa fuit aqua in Pericardio aucta. Epist. medic. 136. Craton.

3. Aëris enim attractionem impediens, quo minus attollatur efficit.

Sic & 3. callum in ipsa arteria juxta cor innatum, palpitacionis fuisse causam compertum. Oris ventriculi dolor, & morsus; cordis præter naturam motum quandam quandoq; etiam concitat. sed hic non propriè palpitatio est, & nec cordis, sed oris vëtriculi affectus: qui cardiogmos & cardiaca passio dicitur, de quo post agemus. Accedit his omnibus causis cordis quædam naturalis debilitas

ac imbecillis facultas, absque qua nulla fit palpitationis cordis.

Sanguis autem multus & crassus palpitationis cordis causa in adultis, ac mediæ ætatis hominibus esse potest: præsertim quando liberalius vivunt, & multis vescuntur alimentis crassioris sanguinem ingenerantibus, & copioso utuntur vino, & præsertim rubente vel admodum dulci. Sanitate isti fruuntur, sola cordis palpitatione ipsis quandoque molesta est.

A crassis autem, ac melancholicis vaporibus, ac fumis palpitatione cordis quandoque succedit, ijs qui melancholia, & præsertim hypochondriaca laborant: tum & his, qui splenis obstructionibus obnoxij sunt. Flatuosi autem spiritus palpitationem cordis ingenerant in senioribus. & tunc quidem præcipuè, quando crudiores ac flatulentos cibos ingesserunt; vel alioqui ventriculi cruditate laborant.

4. Hinc fit quod omnes ferè intra 40. aut 50. annum moriantur. Gal. de loc. affect. l. 5. c. 1.

Signa.

5. Illud enim copiosum crassumq; ingenerat sanguinem.

6. Quia gula non longè
cor transiens impleta,
explicationem impedit.

7. Contra, quam in car-
diogmo fieri solet.

8. Quia nec humor, qui
in pericardio minui,
nec callus tolli potest.
pulsus autem adeo exi-
guus est; ut quandoq; in
una manu non sentia-
tur.

ex hac causa quæ oriuntur
cordis palpitaciones, subin-
de levissima aliqua, vel cor-
dis, vel corporis immotio-
ne suscitantur. & non raro
simul accedit in 6 respiran-
do quædam difficultas, sic
ut & erecta cervice labo-
rantes spirare cogantur. in
cibo etiam ac potu deglu-
tiendo impedimentū etiam
quandoque comitatur. pul-
sus 7 parvus, rarus, tardus
& inæqualis est. Humo-
rem autem in pericardio,
urinæ colore & substantia
non admodum absimilem,
supra naturalem quantita-
tem augeri, ac colligi con-
tingit: quando affectus
sæpius per intervalla recur-
rere solitus inveterascit, &
vigor ætatis perit, corpusq;
extenuatur. Eodem tem-
pore & callum in arteriæ
principio nasci accidit. quo
præsente, vel humore co-
pioso ac multo in pericar-
dio contento, palpitatio ac-
cedens non amplius remit-
titur, sed ad vitæ finem 8 us-
que perseverat. Adest &
tunc

tunc non modo respiratio-
nis, sed & cibi potusque in
deglutiēdo difficultas. pul-
sus omnino parvus, valde
debilis, tardissimus ac rarif-
simus, ac simul inæqualis,
& quandoque etiam inter-
mittens. & si laborans diu
in hujuscemodi constitu-
tione permanferit: tandem
& pedes intumescunt, & in
pectoris spatio aquosi hu-
mores colliguntur.

Curatio palpitationis cor-
dis pro conditione labo-
rantium variat. adolescen-
tibus, & adultis sanitate
fruentibus sanguinis detra-
ctio utilis est: ut Gal. ait. &
quidē ex dextro brachio, si
plenitudo adsit. ex sinistro
verò, si sanguis non supera-
bundarit. ex quo etiam bra-
chio facienda est, quando
effumationes & vapores
melancholici palpitationem
cordis efficiunt. præsertim
si consuetæ sanguinis va-
cuationes, veluti mensium,
aut per hamorrhoides, sup-
pressæ sunt.

Accedere verò debet &

Lect. 73. Februar. 27.

Curatio.

9. Quia magis prodest, si
xαδ' iζiv fiat, ubi mag-
na plenitudo non adest.

10. Quas Gal. prævum habere succū, ait. quod forte verum in Italia: in Belgia minimè. inditium quod non crassum habent succum: quod jus non cito concreascit in gelatinam.

11. Etiam gallinæ indicæ.

12. Sic quidam leviter hoc morbo laborantes, melissa oleribus injecta, liberati sunt.

13. Potius semine quam ipso ocymo utantur. offendit enim odore caput.

idonea victus ratio, ac quidem ut Gal. ait, attenuans: & similis facultatis medicamenta. Abstinentum igitur ab omnibus crassum & frigidum succum ingenerantibus. laudantur carnes¹⁰ vervecinæ, perdices, phasiani, capones¹¹ & aves omnes in montibus & locis ab aquis remotis versantes. Vinum album, vetus, & pauciferum. ex herbis origanum, majorana, rosamarinus, thymus, hyssopus, calamintha; & quæ reliquis præferuntur¹² melissa ac¹³ ocymum. & flores dicti cordiales: ut borrag. bugl. & violæ, qui tamen magis frigidi sunt quam calidi. quæ sive cum cibis coquantur, sive aliter sumantur utilia sunt.

Quod si verò flatuosi frigidi spiritus palpitationis cordis causa fuerint: ut in senioribus ac ijs, qui cruditate laborant, sanguis non erit detrahendus; sed exhibenda, quæ flatus discutere ac concoctionem promoveret

vere queant, victus ratione, qualis ante dicta, observata. Si opus videatur purgante med. sive ex flatuoso spiritu, sive alia de causa cor palpitet: dandum erit aliquod, quod ventriculo proficit, nec cordi obsit, qualis hierapicra vel pill. alephantinæ.

Purgatio.

14. Maximè prodesse cordi fertur ab Arabibus. unde subito quibusdam vita quasi restituta.

15. Lignum Rhodi appellant officinæ, etiam lignum aloës, verum non est agollochum. Copiosum nunc ex India habemus Agollochum.

16. Valde resistit venenis. talia omnia prosunt cordi.

17. Ramenta unicornu non sœbent combusta, ut eboris: neque corticem habet ebur ut unicornu. valde prodest, sive autem ebur, sive medulla unicornu sumatur inutilis est.

18. Quæ est Zerumbet. vera Zedoaria alias antithora dicitur.

Offerenda verò, ex quacunque tandem causa cor laboret, quæ ipsum confortare ac roborare possunt: ut sunt cinnamomum, nux moschata, garyophylli, macis, ¹⁴ crocus, & similia aromata, & quæcunq; cum his & ex his componuntur. item ¹⁵ agollochum, ambra, moschus. Iam & margaritæ sive uniones, ac pleriq; alij lapides pretiosi. lapis ¹⁶ bezoar, ac ¹⁷ unicornu etiam cōmendantur, & os de corde cervi. Cōveniunt quoque galanga, ¹⁸ Zedoaria, cardamomum, cubebæ, præsertim quum ventriculus cruditate laborat. sic & semina anisi, ammios, carios, fœniculi ad flatum

discutiendos. Inter compos. principatum habent elect. de gemmis, diambra, de mosco, diamargariton cal. descriptione Nicolai, diamargar. cal. Avicennæ, si absque thapsia paretur. letificans Rhasis, gallia moschata. laudatur & à multis el. alcermes. quod quidem utile esse potuerit, si absque lapide lazuli præparatum fuerit. aliter adversus cordis palpitacionem dari absque nocumēto non potest. nisi detur ad humoris melancholici expurgationem: quo casu, iusto pōdere exhiberi debet. quod est à ℥ i. ad ℥ i. β. ut Mezues scribit. Ex elect. autem supradictis formari poterunt tabellæ cum saccharo, aut addito aliquo syr. & simul conf. alicujus floris, conditum componi: ut pro ætate vigētibus, cum syr. de violis, aut de buglossa, & conservis eorundem florum. pro senioribus verò ac cruditate laborantibus, cum syr. de corticibus

bus cytri. & conf. florum
 rosinarini, vel majoranæ,
 aut cum rad. enulæ campa-
 næ conditis. Commendan-
 tur verò & theriace An-
 dromahi, & Mithridatium:
 præsertim quando propter
 uteri consensum cor pal-
 pitat.

Lea. 74. Febr. 28.

Topica.

Adhibenda autem sunt
 cordi palpitanti localia ex-
 trinsecus: veluti sacculi, epi-
 themata & similia. Sacculi
 componi possunt ex her-
 bis, floribus, & seminibus
 antè dictis, additis specie-
 bus alicujus ex suprà allatis
 electuarijs; quæ cum gos-
 sypio in tela linea, aut po-
 tius ex serico eoq; rubente,
 ac cocco tincto, consuen-
 di, atque ad regionem cor-
 dis admovēdi, ac gestandi
 sunt. Absq; gossypio & ex
 his quoque sacculi fiunt: qui
 in vino & aqua melissæ, vel
 simili, aut vino solo deco-
 cti fomenti usum præbent.

19. Si ætas major. vel
 in hac decoctione pan-
 num intinctum cocco
 tinctum, vel sericum, vel
 spongiam, applicant.

Fomentum verò etiam
 ex aqua vitæ sola, quando
 laborans ætate proVectior,
 temperamento frigidior,

20. *More chymico. sunt enim tenuiorum ea partium, quæ si non adsint: utendū ol. de spica lav.*

& causa similis, multum subinde profuit. Sic & theriace foris emplastrum modo cordis regioni ad-mota. Prodest verò & inunctio ex ol. cinnamo-mi, maceris, nucis moscha-tæ, " arteficiosè extractis. & si majoris refrigeratio-nis signa adsint: ex ol. de spica lavendulæ. Conve-niant verò & odores grati: ut pilarum, quæ ex ladano & alijs odoratis cum am-bra & moscho componun-tur. quas sæpius naribus ad-movere convenit. Sic & suffitus suaveolentes, veluti ex alipta moschata, & simi-libus cōpositionibus, con-ducunt. Ventriculo etiam cruditate laboranti provi-dendum, ut posterius di-cetur.

Prognosis.

21. *Quia qui cor natura habent debile rix re-creari possunt. qui au-tem palpitatione labo-rant, cor tale habent.*

Difficulter autem ista af-fectio integrè curatur. " nam ubi semel quem inva-ferit, facilè sæpius recurrit. quiq; hac laborant ad mag-nam ætatem non prove-nient. magna sic affecto-rum pars ætatē agit, ut in-quit

quit Gal. inferiorem²² 50.

annis: sed quæ 40. annos 22. *Imperator Maximilianus 2. 50. anno ætatis mortuus est hoc morbo.*

excederet, rarissimum sanè aliquem ex his 50. annos superare. non omnes verò etiam ad 40. perveniunt.

Moriuntur nonnulli quum sibi sani esse videntur subitò,

²³ syncope intercepti, alij

per acutas febres, quidam 23. *Sic Regina Maria subitò interijt.*

longo & diuturno morbo conficiuntur.

De Syncope & lipothymia.

CAP. 33.

SYNCOPE & lipothymia scordis sūt affectus magnitudine differentes. major ac vehementior syncope est; minor verò minusque vehemens lipothymia. quæ & lipopsychia dicitur, & ut Gal. ait, syncopen præcedit.

Syncope autem est præceps & subitaneus virium facultatumq; vitalium lapsus, quem comitatur sensuum privatio, faciei pallor, & sudor frigidus.

1. *Quia nulli adsint spiritus.*

Bb

In lipothymia verò neq; sensus omnino cessant, neque sudor frigidus erumpit. In syncope autem, cor quandoque primario proprioque affectu laborat: quandoq; verò per consensum tantummodo. Veluti quando propter ventriculi affectum, aut uteri strangulationem, vel vehementem alicujus partis dolorem, afficitur.

Quando verò nullus alicujus partis vehemens dolor adest, neque ullius partis affectus præcessit, neque signa alicujus insigniter affectæ partis appareant, cor primario affectu laborare, ac deficere existimandum.

Lect. 75. Martij I.

Causæ,

Contingit autem fieri syncopen, sive animi deliquium, quandoque propter vehementem animi emotionem: veluti à subitaneo magno gaudio, vel repentino metu, aut ab ira & excandescētia immodica. sic & ab inspiratione corrupti ac veneposi aëris syncope fit

fit: veluti ab aëre ex fodinis nonnullis metallorum, ex barathris, aut alijs similibus locis. Quandoque & à venenis assumptis, aut ab ictu venenatorum animalium. Immodicæ etiam sanguinis vacuationes, tum & aliorum subinde humorū, siue per purgantia medicamenta, siue aliter, frequenter animi deliquium inducunt. Sic & abscessus prope cor: veluti in pulmone subito erumpentes. Ingens verò & alicujus partis dolor deliquij non rarò causa est. Quando verò & cor ab aliqua occupatur inflammatione, aut exysipelate, priusquã affectus augeri: queat, vita, ut Gal. ait, deficit. Vultus etiam cordis ad ventriculum pertingens syncope, & subitanæ mortem subito infert. A ventriculo autem per consensum syncope, siue deliquium accidit; quando vitiosi humores in corpore redundantes ventriculo, ac præcipuo ejus osculo mole-

2. In sinistra partē. in dextra tamen augeri posse testantur hodiè doctiores.

stiam inferunt. Ex utero verò & mulieribus fumi, ac vapores subindè afferuntur: qui animi deliquium inferunt.

Curatio.

In omni autem syncope sive animi deliquio (si non fiat ab utero) mox naribus admovēda sunt odorata, quæ spiritus reficere queant: ut sunt aqua rosea, cinnamomi, acetum, vinum generosum, præsertim aromatis conditum: sic & aromata, ut garyophylli & similia. Prodest verò subinde aquæ frigida³, maximè in facie, aspersio. ⁴ sic & digitorum & extremarum partium frictiones.

3. *Idque per antiperistasin. quia excitat calorem naturalem.*

4. *Quia spiritus ac vapores malos à corde revocat.*

5. *Ratione symptomaticis, non causæ. Hic enim symptoma magis urget.*

Laborante utcunque restituto, exhibendum mox erit: vinum generosissimum, ætate vetus, substantia tenue, colore fulvum, ac boni odoris. quod omnibus, ut Gal. 12. meth. ait, quos syncope male habet, utilissimum: etiamsi à flabile os vetriculi infestetur.

Tali autem vino deficiente, substitui poterit vinum

fac-

saccharo & aromatis conditum: quod vulgò hippocraticum nominant. Danda verò & electuaria, ac Condita cordialia, similiaque fomenta, aut sacculi cordis regioni admoventur: veluti in palpitatione.

Si à venenis assumptis syncope exorta fuit, reparatis utcunq; viribus ac venenis vomitione expurgatis, exhibendum mox erit aliquod alexipharmacum, ut theriace Andromachi, aut Mithridatium, vel aliud similis facultatis. Cordi verò deinde & cordialibus elect. fomentis, unctionibus erit providendum: ut si qua maligna qualitas, vel imbecillitas relicta fuerit, corrigatur. Ab ictu verò venenosæ feræ, offerenda quoq; sunt antidota: ut theriaca dicta. sed vomitione non est opus.

Quod si autem magna aliqua & confertim facta evacuationo, sive sanguinis, sive alterius humoris, causa extiterit deliquij: non solum

6. *Quæ contra venena assumpta, alexipharmaca; theriaca, quæ contra ictus animalium profunt, dicuntur. theriace Androm. utrumq; præstat.*

7. *Ut in aneurismate erumpente. Verum etiam hoc in malo humore, ut in aqua hydropicorum, vel puris in thorace contenti. fieri enim non potest, ut nō simul spiritus vitales exhauriantur.*

Bb 3

8. *Eoque liquido. facilius enim impleri. potu, quam cibo.*

9. *His ferè, ac maximè opus, post magnam sanguinis evacuationem.*

10. *Quæ quum valde subtilium partium sit, parum nutrit.*

Lea, 76. Marrij 2.

vino odoribusq; reparandæ vires sunt, sed laborandum etiam, ut alimento idoneo restituantur : 8 ut jusculis caponum, vel aliarum carniū, vel contusis ex pulpa caponum, pulli, aut perdici. quibus vel amygdala dulcia, vel nucleos nucum pinearum addi, valde expedit. Dari etiam potest succus ex carnibus non plenè assatis expressus ; vel ab ipsis, in duplici vase decoctis, resolutus 9. In valde debilibus exhibetur quandoque aqua ex carnibus caponis coctis atque ipsius jure, additis conf. rosarum, flor. cordialium 10 & aromatis nonnullis, extracta.

Dolorem verò syncope causam etiam sedare oportet, pro conditione & partis laborantis, & causæ efficientis: veluti de dolore in febribus dictum est.

Si pravi, ac vitiosi humores, os ventriculi infestantes animi deliquium effecerint, expurgandi sunt, qualescunque tandem fuerint, uti

uti etiam dictum, ubi de syncope in febribus.

Ab uteri autem strangu-
latione si animi fiat deli-
quium, ¹¹ suaveolentia nec
naribus sunt admovenda,
nec exhibenda. Frictiones,
& ligationes inferiorum
partium faciendæ. Cucurbi-
tulæ ¹² ad fœmora parte in-
teriore admotæ multū pro-
sunt. Reliqua verò & adhi-
benda, quæ affectus curatio
postulat, de quo suo loco.

Syncope autem sæpius
aliquem, citra manifestam
causam, corripit, non est
bonum, nam, ut Hipp. qui
frequenter & fortiter sine
manifesta causa exolvun-
tur, derepente moriuntur.
41. aph. 2.

De Cardiaca Passione.

CAP. 34.

CARDIACE oris ventri-
culi affectus est, qui à
stomachi: cardiogmos-
rosionis sensus in sto-
macho. quibus si accedat motus cordis celer ac vehemens,
cardiaca est: non antea. In syncope causa potest & dolor
idem esse: debilius tamen os ventriculi, quam in cardiaca.

11. Quia fumos magis
ex utero exhalare, fa-
ciunt.

12. Ad miraculum pro-
sunt, restitutæ his quan-
doque, quæ jamjam mo-
rituræ viderentur.

Prognosis.

Bb 4

2. Non mentis. ideoque Phrenitidi contrariam Cels. l. 3. c. 19. dixit; quamvis sæpè ad eam phrenitici transeāt. Terullian. hanc, & Phrenitidem æmulas somno, illam decessu; hanc verò excessu. De Anima. c. 43.
3. Et siccitas. Cels. l. 3. c. 19.
4. In palpitatione rarus. tanta autem vehementia Causa. ac velocitas in quodam visa, ut magis de dolore brachij, quàm stomachi, conquereretur. quod factum ob picinum nervum. sano illi id nondum aderat. Curatio.
5. Quæ magnam vim anodynâ habet. absinthium ad abstersionem. rose ad astrictionem. pars enim princeps usu, non prorsus resolvable.

corde nomen habet. propterea quod veteres os ventriculi καρδίαν .i. cor nuncuparint: & in hoc affectu cor per consensum laborat. Est autem vehemens oris ventriculi dolor, quem comitatur cordis imbecillitas, & quandoque jactatio, animi angor, sudores circa pectus, faciem, & caput copiosi, extremarum partium frigiditas, cordis verò vehemens, frequentissimus, ac velocissimus motus, quem palpitationi similem Gal. affirmat, & similis arteriarum pulsus.

Causa sunt acres ac mordaces humores, vel alioqui maligni, os ventriculi instantes.

In accessione hujus affectus, ori ventriculi adhibendum erit fomentum ex rosâ rubris, absinthio, floribus, & chamæmeli ac meliloti in tenui albo vino, aut vino & aqua decoctis.

Frictiones verò, ac ligaturæ crurum, ac brachiorum etiam faciendæ. Enema verò

verò & aliquod leve inji- 6. *Quæ nos non facimus,*
cere, aut glandem suppo- *quid enim sudorem ab-*
nere, etiam quandoque *stergeri à facie refert,*
conducit. Aëtius tum *ventriculo laborante?*
spongia ex posca frigida *stragula angustijs vexa-*
faciem etiã lavandam, itra- *tus ipse eger projicit.*
gula incumbentia tollen- *aër refrigerari potest.*
da, & aërem refrigerandum *vino utendum, licet*
consulit: offerendumq; pa- *causa repugnet, ratione*
nem vino intinctum. *symptomatis. in quo*

Revocato ab accessione *Plinius unicum Cardia-*
laborante, cibi offerendi, *cor. morbo spem esse di-*
qui non facile corrumpant- *cit. aliquos autem in ac-*
tur, ut qui lentum habent *cessione dedisse ut sudo-*
succum: veluti pedes suilli, *rem coërcerent. plures*
ovilli, agnini, vitulorum pe- *imminente morbo, tutius*
des & capita. Ptisana etiam *putasse. l. 23. c. 1. Sen-*
cum cibis utiliter coqui- *tius prætor Chio uteba-*
tur. Si vires dejectæ sunt, *tur. l. 14. c. 14. Hinc*
cibus offerendus, qualis in *illud Senecæ; Bibere, &*
* syncope ex nimia evacua- *sudare vita Cardiaci.*

tione. Expurgandi verò *Topica. * Nam prædi-*
sunt & vitiosi humores: *cta longiori in-*
quemadmodum & in syn- *digent concoctione.*

cope. quibus expurgatis, os *7. Vinum enim, ni soli-*
ventriculi ungendum * ol. *diori permisceatur cibo,*
masticino, vel cytoneorum, *ἐν Ἀλφὸς ῥῆλον. quod me-*
dicis in artis suæ exer-

citatione compertum. cardiacis igitur cibum aliquem fru- *mentaceum permiscet vino. πρὸς καλοχὴν τῆς διωάμεως.*
Athenæus. l. dipnosoph. 8. *Ex unctiones, vel empl. non*
sublatis humoribus, magis nocerent, quam prodesse.

vel myrtino, vel aliquot horum. addito nonnihil olei nardini. Aut admovendum empl. ex mastiche corio inducta. exhiberi quoque utile syr. de absinthio addito syr. de granat. aut agresta, si calidior sit. Potest verò & commodum esse vinum absinthites, aut ejus loco cerevisia cum absinthio.

Prognosis.

De hujuscemodi autem affectione scripsisse videtur Hipp. aph. 65. lib. 4. Quibus in febris fortis ætus & cardiogmos, malum. ubi Gal. in comment. ait; Si per Cardiogmum, Hipp. intellexerit, crebrum & velocem cordis motum, & præcipue palpitationi similem, extremum malum significari.

Lea. 75. Martij 5.

De Inappetentia.

CAP. 35.

Inappetentia, sive fastidium cibi, facultatis est appetitricis abolitæ, seu debilitatæ symptoma, ad ipsius

ipſius oris : ventriculi ſuctionis ſenſum deperditum, aut multum debilitatum, ſubſequens.

Contingit autem inappetentiam fieri, aut quia corpus non evacuatur, neque ei quicquam decedit, aut propter oris ventriculi intemperiem, aut humorum in ventriculo atque toto corpore redundantiam.

Corpus autem non evacuatur, vel propter conſueſta intermiſſa exercitia, vel quia otio ac ſomno deditum eſt. Intemperies verò oris ventriculi appetentiam dejicit calida præſertim, & maximè humiditate accedente. calor : ſiquidem corpora laxando robur eorum diſſolvit, & attractionis functionem reddit imbecillam. Humorū autem copia ſi adſit, & quidem in toto corpore, partium nulla fit naturalis appetentia, illaque ceſſante neque per venas exſuctio conſequitur, multo minus ſuctionis ſenſus in ore ventriculi per-

1. *Plurimum negotij hominibus alvus exhibet, cujus gratia major pars mortalium vivit. alias*

enim cibos non trāsmittit: alias non capit: alias non conficit. Plin. l. 26. c. 8.

1

2

2. *Hinc qui verſus Boream degunt voraciores, iſ, qui ad Austrum. ob locorum nempe frigiditatem. 26. Problem. 16.*

3

3. *Quum enim melius & paratius habent alimentum partes, externum non appetunt. Gal. 3. de facultatibus naturalibus.*

4. Illi enim caninam appetētiam, ac bu-
linum excitant. Signa.

5. Paulus oleosos vocat hos ructus. quod acci-
dant maximè ijs, qui
oleo usi sunt. R. Dodon.
Non malè. κνισσα enim
ἢ τῶ λιπαρῶ θυμιάσις,
ἢ ἀναόδοσις. At
Andern. τὸ, Curatio.
βορβορώδης, non oleo-
sum, sed oletosum red-
didit.

6. Vt digeri corpus &
ocasio appetentiæ esse.

cipi aut sentiri potest. Sic &
copioso in ventriculo, præ-
fertim circa os ejus, hæren-
te humore, suctionis sensus
impeditur. Humores isti
frequēter calidi sunt, quan-
doque verò frigidi, crassi,
ac pituitosi, sed non + acidi.
Signa autem calidorū sunt
ructus + nidorosi, aut ama-
rulenti. frequenter sitis, &
subinde nausea. Frigidis
verò, crassis, ac pituitosis
humoribus redundantibus,
ructus non acidi, sed insi-
pidi, sitis nulla.

Quando igitur intermissa
exercitia, vel nimia desidia,
vel otium, vel somnolentia,
inappetentiæ causæ extite-
rint, ad exercitia + & ad la-
bores revocandus est malè
habitus: vel ad minus, in ci-
bi parsimonia, vel inedia
continendus. Sic etiam si
humorū multitudo in cor-
pore recens collecta fuerit.
Sed si dudum repletio fa-
cta, vena secanda, aut hu-
morū purgatio adhibenda.

Si autem sola ventriculi,
aut oris ejus intemperies
calida,

calida, inappetentiam cau-
sarit, offerenda erunt refri-
gerantia: ut lactuca, & simi-
lia acetaria. item edulia
actu * frigida, præsertim ex
aceto. panis in posca imbu-
tus. aqua frigida, & potus
qualiscunque, frigidus.

Acetosam, sive ejus suc-
cum, cum cibis sumi con-
fert. sic & fructus immatu-
ros: veluti uvæ crispæ, uvæ
immaturæ, & similia frigi-
da astrictionem nonnul-
lam habentia.

Quod si verò & humo-
res adsint simul, hos expur-
gari refert: calidos quidem
vomitione, si ad hanc la-
borans facilis sit, exhibita
cum aqua tepida oxymeli-
tis ζ i. aut ζ i. β . Aut per
inferiorem vêtrem, & qui-
dem cum hiera picra addi-
to rhabarb. aut cum infu-
so rhabarb. cui addi pote-
rit aliquid syr. 7 ex cichorio.
Frigidi humores similiter
per hieram picram, aut pill.
* alephanginas expurgandi
sunt, addito agarico, vel
pill. aggregativis, aut simi-

* Hinc illud; Si stoma-
chus Domini fervet vi-
noque ciboque, Frigidior
Geticis petitur Deco-
cta pruinis. Juven. sat. 5.

7. Vel de succo rosarum.
ad refrigerandū, quum
causa sit calida.

8. Quasi Aromaticæ.
Arabicum est nomen.

Lect. 78. Mart. 6.

Topica.

℞. Rosar. rubrarum,
absinthij, origani, majoranæ,
& menthæ (cui odor non est molestus)
ana ℥ 2. Mastich. garyophyll.
ana ℥ 1. Specierum diagalangæ ℥ 2.
sem. anisi, annios, carui
ana ℥ β. f. omnium pulveris.
qui addito gossypio consuetur
in sacculum gerendum ad ostium ventriculi.

libus. prius tamen exhibitofyr. acetoso, aut oxymelite, vel eodem cum hiera dato.

Expurgatione facta, si adhuc relicta debilitas, aut frigida in ventriculo, aut ejus ore intemperies: offerenda confectio aliqua, velut aromat. rosat. vel diagalanga; & in causa valdè frigida, diacalamenthon, aut diatrionpipereon. Vngendum verò & ostium ventriculi ol. nardino, vel de mentha, vel de absinthio, vel simili. Admoveri quoque poterit emplast. aliquod: veluti quod ceratum stomachale appellatur, vel aliud ejus generis. Loco verò empl. & sacculus gestari potest, in quo rosæ rubræ, absinth. organum, majorana, & mentha aut calamentum (si odor non sit molestus) & mastiche, garyophylli, vel alia aromata, vel species diagalangæ, & sem. anisi, ac carvi cum gossypio insuta, sint.

Victus ratio, quando frig. intemperie ventriculus vel ostium

otium ejus laborat, ex optimis sit & concoctu facilibus cibis, non lentis, neq; viscosis, nec sale aut fumo dnratis, quæ aromatis condiri utile est, vel calidioribus herbis: ut origano, calamentha, hyssopo, thymo, majorana, & similibus.

Vinum generosum commendatur. Ab usu omnium refrigerantium abstinendum. Ad exercitia & deambulationes laborans ducendus, præsertim corpore jejuno. Temperandum à somno. Otium fugiendum.

Quod si calida intemperies in causa fuerit, non solum quæ ante dicta sunt lactucæ & acetaria; sed & cibi offerendi lenti succi, ut in cardiacæ curatione dictum. Vinum conceditur tenue & pauciferum.

Absinthij quoque usus probatur. & inunctio ex sol. mastichino, vel empl. ex mastiche, ut supra dictum.

10. *Quæ difficilis concoctionis. ventriculus autem hîc malè coquit.*

11. *Qui prohibet corpus difflari ac resolvi.*

12. *Ut extrema animalium, pedes, &c.*

13. *Ut in omni cal. affectione ventriculi: absterget enim bilem, & astrictione corroborat.*

De Appetentia Depravata.

CAP. 36.

TRes sunt affectus præternaturā, qui ad depravatam appetentiam referuntur, Appetentia sive fames canina, bulimos sive bulimia, & Citta sive pica. Bulimia generale nomen quibusdā videtur, omnem magnam excedentemq; famem, ac appetentiam quoque caninam sub se continens, sed Medici inter bulimiam, & appetentiam caninam distinguūt, ut in progressu fiet manifestum.

Canina fames.

Est autem Canina fames, vehemens ac insatiabile cibi desiderium, & appetentia modum excedens, sic: ut hac laborantes nimis cibis sese expleant, pluresq; ingerant quam retinere in ventriculo queant, & eodem, vel mox, vel paulo post quā assumpserint evomere: cogantur, eosque subinde omnino crudos, quan-

1. Similis affectus naturalis in Seleucidis aviculis Asiæ. 6. Loc. aff. Gal. c. 3. Appellatur & Phagedæna; In definit. & Epid. 6. sect. 3. aph. 57.

mandoque partim conco-
ctos & pituitæ permixtos.
Post quos vomitione reje-
ctos iterum cibum veluti
voracius appetunt, sicuti canes
vomitu. unde affectioni
nomen factum.

Causa est humor pitui- Causa
cosus, acidus, vel solus, vel
melancholico humori per-
mixtus, ori ventriculi im-
pactus, in ipsum refrige-
rando, pungendo, ac con-
stringendo, veluti morsum
inducit, suctioni naturali
ferè affimilem.

Curacionem breviter LeGt. 79. Mart. 8.
ostendit Hipp. Famem, in- Curatio.
quit, vini potio solvit. 21.
aph. 2. ubi per famem non
aliam quam caninam appe-
tentiam intelligendam esse
Gal. dixit. & vinum esse
debere affirmans ex gene-
re illorum, quæ sufficienter
calfaciunt. Ante cujus as-
sumptionē oportere tamen
ait primū offerri pin-
guia edulia, oleagina & ex
oleo parata. nihil verò au-
sterum, aut acre dandum.
postea vinum quale dictum

2. *Vel etiam butyro.*
quod idè Septentrio-
nalibus regionibus co-
piosius Deum Opt. Max.
largitum fuisse, vir Ex-
cell. H. Mercurial. cre-
debat, ut illarum incolæ
famē, quam clima illud
satis magnam inducit,
illius usu quotidiano le-
nire possent.

C 6

est, etiamsi nō sitiant ad potandum ipsis laborantibus exhibendum. atque sic quidem statim sedari famem. atque hac victus ratione observata cessare omnino. Potest tamen & alia ratione appetentia canina curari: attenuando videlicet & expurgando humores peccantes. Attenuari possunt humores syr. acetoso vel oxymel. simplici, vel scyllitico, si fortiori opus. Expurgari verò per hieram picram addito agarico, aut pillulis aggregativis, vel similibus. quæ non semel tantum, sed sæpius, si canina appetentia non cessaverit danda. Exhibenda verò & calfacientia ut diagalanga, diatrionpipereon, vel diacalaminthes; aut his fortiora: ut diacyminum, vel diaspoliticon. reliquaque facienda, quæ in curatione inappetentiæ ab humoribus crudis ac frigidis dicta sunt 3.

3. *Quidam appetituum rabiem, inquit Basil. cicuta domarunt. 5. Hexameri. Sensus acrimoniam obtundi narcoticorum usu posse, certum est. sed alia fortè tutius quam cicuta adhiberentur; v. g. papaver, albi semen cum melle, aut sacch. præparatum; aut syr. papaveris.*

De

De Bulimia.

CAP. 37.

Bulimia : sive bulimos magna & ingens est famēs, ut nomē ipsum ostendit: ad quam & inappetentia, & virium lapsus consequitur.

Causa est inedia & diuturna cibi indigentia. Potest & causa esse externum frigus, non modo os ventriculi, sed & universum corpus refrigerans: veluti ijs contingit, qui per loca frigida ac nivosa iter facientes, diutius famem tolerant. perit enim his tandem appetentia, vires collabuntur, extremæ partes refrigerantur, faciei color mutatur, & pulsus collabitur. Sic & ijs contingit, qui propter famē, aut inediam ex quacunque tandem causa animo linquuntur. nam & his post diu toleratam famem appetentia perit, & vires deficiunt. Ex his facile cognosci potest quid

1. Novi majestatem boum, inquit Varro, & ab his dici pleraq; magna, ut Bulimon. 2. de re rustica. Dicitur & βούλιμα. in definit. & 6. Epid. 3. aph. 37.

Causa.

2. Quæ tamen necessario non accedit. Bulimia potius in frig. aëre, & hyeme. 8. Probl. 5. Erasistrat. 1. διαίτη σελων. apud. Gellium, l. 16. c. 3.

C c 2

inter bulimiam & caninam appetentiam interfit. In appetentia canina cibus non deest, & propter nimiam ejus ingluviem vomitione laborantes infestantur. In bulimia cibi est indigentia, cui animi deliquium succedit.

Curatio.

Quando.g. aliquis propter inediam ac famē diutius toleratam jam viribus est imbecillus, & animo delinquit; primum odoris est revocandus: ut aceti, aromatum, & pistorum, malorum, vel aliorum fructuum, ut Gal. ait, odore si ad manum sint. item panis præsertim recenter cocti, & carniū aliorumq; cibariū. Panis verò & vino intinctus exhibendus, & juscula carniū, ovaque forbilia, aliaque, quæ citò alunt, veluti dicta sunt in syncope ab inanitione facta. Exigua autem quantitas initio offerenda. sed frequentius & singulis ferè horis, donec vires reparate & majorem quantita-

3. Hujus odore per Thesmophoria vitā produxit Democritus. trium videlicet dierum spatium. Diog. Laert.

4. Hoc qui post obsidionem Lugduni Batavorum immisso mari solutam, non observarunt, cibis affatim ingestis, plerique mortui sunt.

tem ac solidiorem cibum
admittant. Nihilominus ta-
men & partes extremæ
uniculis constringendæ, vel
leviter fricandæ sunt.

5. *Ut calore revocato
ad exteriora, alimen-
tum in corpus distri-
bui possit.*

Quod si verò præter ci-
bi indigentiam etiam ac-
cesserit magna refrigera-
tio, ut in itineribus per loca
nivosa contracta, non sta-
tim etiam laborans lucu-
lento aut magno igni ad-
movendus erit, sed sensim
& paulatim calfaciendus.
Frictionibus & ijs, quæ jam
dicta sunt, nō prætermis-
sis.

De Kitta seu Ma- lacia.

CAP. 38.

Citta sive malacia, quæ
Epica non rarò Latinis
dicitur, appetentia est de-
pravata: non modum in
quantitate, veluti appeten-
tia canina, excedens, sed in
qualitate aberrans. est enim
concupiscentia pravorum.
nam vel acida, vel acerba
ut immaturos fructus, ali-
quando terram, testas, car-

Lea. 80. Mart. 9.

bones extinctos, aliave similia absurda appetunt. nonnulli etiam carnes crudas, vel etiam crudos pisces desiderant.

Cause. Consequitur & ista appetentia oris vetriculi pravam affectionem, tunicis ejus vitioso aliquo humore imbutis: pro cujus varietate modo hæc, modo alia prava appetuntur.

Frequentius autem hujuscemodi appetentia mulieribus uterum gerentibus supervenit, & primis quidem mensibus ad 3. aut 4. usque, authore Gal. quum foetus videlicet adhuc parvulus est, nec multo eget alimento. & præsertim quando vitiosi humores ad os ventriculi confluentes vomitione non expurgantur. quamquam subinde & posterioribus mensibus etiam *κίτλα* gravidis accidat.

- Idem verò affectus & alijs nonnullis mulieribus, tum & viris nonnunquam supervenit, humore vitioso
ad

4. Ita ut non possit sanguinem per menses purgandum absorbere.

2. Non tamen cum vomitione.

ad ventriculi ostium delato, atque illi firmitus inhaerente. Quandoque verò & alia quædam in corpore latens est causa, quæ appetentiam pravarum rerum excitat: qua permanēte, etiam appetentia perseverat.

Gravidas autem, quando *κίτλα* ipsis accidit, in cibo parciores esse cōvenit, nec temerè quosvis ingerere, sed optimos tantummodo & boni succi. Quod si nausea adsit, & morsus aliquis sentiatur in ore ventriculi, exhibenda aqua tepida cum exiguo oxymelitis, ut vomitio succedat, atque vitiosi humores expurgentur. Mediocre corporis exercitiū convenit. deambulationes ad loca amœna, & cibi, ut Paulus refert, non nimium dulces. Vina fulva, odorata, & quinquennia .i. vetera; & moderata potio. Commendatur etiam initio sumere mensæ: olivas muria conditas, vel 6. aut 7. amygdala 6 amara. Sub finem

Curatio.

3. *¶* humores superflui melius possent concoqui. alioqui multi humores congesti corrumpuntur à malis illis succis.

4. Ita per universum distributi humores minus confluent ad ventriculum.

5. Et omnia quæ roburare stomachū possunt. Olive resiccāt, quia salis. & astringunt, quum immaturæ condiantur. unde & salivationi ventriculi conferunt.

6. Sic & absinthium. ratione abstersionis.

C c 4

7. Ut pira omnia no-
stra, ac bellaria ex his
confecta.

8. .i. Rhabarbarum per
barbariam ex regione
Chinarum ad nos dela-
tū. ratione astrictionis.

9. Ne ostium ventriculi
omnino refrigeretur,
admiscenda
calida pau-
ca astringentibus.

Vnctiones.

Laudat Aëtius pastil-
los Amazonum. verum
Gal. ex quo citat, ad
vetriculi sub-
versiones, nō
κίτλας commendat.

Cataplasma.

10. Non tantum pro-
sunt in κίτλας, sed & si
non solum manē, sed
etiam interdum vomant:

11. .ii. Rosar. rub. ba-
laust. absinthij
ana ℥ 2. sem.

Sacculi.

foeniculi, coriandri, myr-
ti ana ℥ 1. santal. lut.
rubrorum, mastich. thu-
ris, garyophyllorum ana

℥ 2. cum gossypio ℥ 3. q. s. f. f. sacculus. Pulveres plures
quam 12. & pauciores 16. ℥ debent esse. ideo absinth.
& rosas per pondera descripsi. R. Dod.

dandæ carnes cydoneorum
conditæ: vel ex his facta
alia bellaria: vel conserva
rosarum rubrarum; vel ali-
quot mali punici grana, aut
similia astringentia 7 ori
grata. Paulus verò & rha-
ponticum 8 & ante cibum,
& post, assumi posse refert.

Vnctiones verò oris ven-
triculi & faciendæ sunt ex
oleis astringentibus: ut ma-
sticino oleo, cydoneorum.
quibus aliquid ol. de 9 men-
tha, aut de absinthio admif-
ceri poterit. Laudantur &
cataplasmata ex cœnanthe
.i. immaturo uvæ fructu,
balaustijs, smyrnij semine,
pæoniæ, & foeniculi semi-
ne, cū palmulis & vino ve-
teri. Cujus loco admoveri
poterit vel ex sola 10 masti-
che emplastrum, vel sacculi
11 in quibus rosæ rubræ, ab-
sinthium, balaustia, foeni-
culi, coriandri & myrti se-
mina, santali lutei & ruben-

tus,

tes, mastiche, thus & garyophylli cum gossypio sint infusa.

Si verò mulieribus non ²
gravidis, aut viris hujusce-
modi depravata appeten-
tia accidat, purgatione vi-
ciosorum humorum curan-
di erunt. Vomitu, quidem
ad hunc prompti, alij pur-
gatione per inferna. veluti
in curatione inappetentiæ
dictum est.

Quibus verò aliqua in ³
corpore latens hujus sym-
ptomatis causa fuerit, ^{12.} *Vt à lato lumbrico.*
non prius cessat depravata *quod in viro factum.*
appetētia, quam causa sub- *Alia, cui intestinū disse-*
lata. quæ si tolli nequeat, *et plenū flatibus inven-*
affectio permanet. licet ta- *tum, quibus cōmotis co-*
men non assidue, sed per *gebatur crudos pisces*
intervalla tantummodo re- *comedere, unde vulgò*
currat, causa videlicet se *lutram eam in ventre*
moverente. *habere existimabatur.*

De Siti.

CAP. 39.

Sitis naturalis est appe- ^{Lect. 81. Matt. 12.}
tētia humidi ejus, quod
cibi ac alimenti est vehicu-
lum; sed quæ modum exce-

C c 5

dit symptoma est appeti-
tricis facultatis depravatæ.

Causæ.

1. *Vt in bima puellula,
cui ventriculus, qua fol-
liculo fellis adjacet,
non solum æruginosa
bile perfusus, sed & ab
eadem perforatus erat:
unde ingestis uno die
cerevisiæ libris sex, sep-
temvè, sitim tamen re-
stinguere, non poterat.*

2. *Quæ inditium medi-
camenti bonè operantis.*

Cujus causa esse potest
aut calida, aut sicca, vel
utraque, ventriculi & præ-
sertim ipsius oris intempe-
ries. Vel falsi & biliosi hu-
mores os ventriculi mordi-
cantes; vel etiam ejusce-
modi edulia, aut potiones.
non rarò verò etiam mera-
cissimi ac potentissimi vini
potus. In jocinore verò, ac
præsertim ejus sima ac in-
terna parte, in mesenterio,
in jejunio intestino, in imo
ventre, vel etiam in ipso
pulmone si affectio aliqua
constiterit erysipelatis aut
inflammationis naturâ re-
ferens: sitis etiam accendi-
tur, ut in febribus acutis.
Potest verò & inopia hu-
midi sitis causa esse: veluti
post copiosa sanguinis pro-
fluvia, vel post alias vacua-
tiones sive sponte, sive à
medicamētis factis. sic &
post labores ac sudores im-
modicos. Non rarò autem
& diabetes, proprius renum
affectus, ingentis sitis causa
est.

est. quem Gal. ea de causa
Dipsa cum vocat, & caninæ
appetentiæ proportionē re-
pondere ait. Iam verò &
hydropici, frequentissime
iti prænuntur.

3. In ascite, quod humo-
res sint acres. In leu-

Curatio. cophlegmatia,
quia febricula
ferè etiam adest; utpote
humoribus putrescenti-
bus.

Si itaque sitis causa fuerit
calida aliqua in ore ventri-
culi citra humorē intempe-
ries, frigida & potio condu-
cit. tum & ea profunt, quæ
adversus inappetentiam ex
hac causa supra cōmenda-
ta sunt. Sic & siccitatis fo-
idius humidū remedium est.

4. Non solum aqua, sed
etiam cerevisia.

Quod si verò falsi ac bi-
tiososi humores sitim excita-
verint: (quod ex falso vel
amaro in ore sapore, aut
juscemodi ructu cognosci
potest) tunc humorum va-
riatio facienda, ut in cura-
tione inappetentiæ ex hac
causa dictum est. Cibis ve-
rò falsis aut acribus assum-
ptis, aut nimio vino mera-
to: superdormire utile fue-
rit. concoquitur enim ut
Gal. in comment. 27. aph.

. particulæ, per somnum
quod assumptum est, ac
deorsum descendit.

5. Ac tum qualitate
amissa, sitim non fa-
ciunt amplius.

Quando verò interiorum partium aliqua inflammatio, aut erysipelatis naturam referens affectio, aut febris acuta, magnæ ac modū excedētis sitis causa extiterit: quomodo, & qua ratione eis sit succurrendum ante ostensum, ubi de siti in febribus. Ibidem quoque dictum, quid faciendum: quando post magnam vacuationem, sive sanguinis, sive alterius humoris, sitis nimia urget. Citò enim nutriri, ac refici laborantes, debent, & humido quidem alimento: nam, ut Hipp. facilius est impleri potu quam cibo. I. I. aph. 5.

Adversus diabete[m] autem, quæ semper ingentis sitis est causa; cujusmodi remedijs sit utendum, suo loco dicetur. Hydropicis sitim ferre expediens ac utile est. 6 præsertim leucophlegmatia sive hyposarca laborantibus. profuit his nonnunquā gingiberis frustum 7 in ore continere, atque ipsum subinde mādere. sali-

6. Concretis quosdam ossibus, ac sine medullis vivere accepimus. signum eorum esse nec sitim sentire, nec sudorē emitte-
tere. Quamquam & voluntate scimus sitim vitam. equitemq[ue] Romanum in pupillaribus annis aque subtercutem fuscæ morbo prohibitum humore à medicis, naturam fecisse consuetudine, atque in senectâ caruisse potu. Plin. l. 7. c. 18.

7. In ascite forte non prodesset ob humorum acrimoniam.

salivam enim provocat. per quam sitis nonnihil sedatur, & simul ad superfluae humiditatis resiccationem conducit.

Cavendum autem est urgente siti, ne multus ac copiosus potus affatim ingeratur. nam vehementi siti laborantes, si larga portione utantur. 4. accidentium periculum, ut Gal.³ ait subire solent: Vel enim ad vomitum irritantur: vel potu citò per intestina descendente fluore, alvi autlyenteria corripuntur: Vel potus in ventriculo hærens ejusdem inflationem, parit: vel celeriter per vias urinæ transiens diabeten, si ve urinæ fluorem excitat.

8. Lib. 6. de loc. aff. cap. 1. Nulla re similis est fabricitantium sitis siti sanorum. hi si bibant, non ultra sitiunt. illi verò brevi tempore se bibisse cum delectatione sentiunt, dein nau-seant, aqua in bilem vertitur, vomunt, tormina patiuntur, iterumq; validius sitiunt. Epictet. apud Arrian. l. 4. c. 9. 9. Quod multum cōtingit febricitantibus crassam cerevisiam bibentibus. quum descendere non possit. Nocet etiam lac. magis tamē ex quo butyrum extractum. cito enim concrescit in ventriculo calido. sic quidam subito pereunt

hausto tali lacte: nisi id concretum evomant.

De Nausea & Vomitu.

CAP. 40.

Lect. 82. Mart. 13.

Nausea & vomitus facultatis expultricis ventriculi motus sunt de-

1. Sic quidam difficiles ad vomendum: quod re-
 tentricem habent fir-
 mam. Loquimur autem
 de ea, quæ fit ante cibum
 assumptum. de ea, quæ
 post cibum infra age-
 mus.

pravati, accedente: reten-
 tricis debilitate. in hoc ta-
 men differentes, quod nau-
 sea conatus quidam sit ad
 vomitionem irritus, sive
 inanis irritatio ventriculum
 atque ejus ostium commo-
 vens; nullum interim hu-
 morem expellens: Vomi-
 tus verò eorum, quæ in
 ventriculo continentur, at-
 que ipsi molesta sunt, sur-
 sum per os vehemens est
 expulsio.

Contrahit autem se tunc
 ventriculus circum ea, quæ
 in ipso sunt: ac eo modo
 extrudit & expellit, quæ ex-
 cernuntur. Nausea autem
 vomitum præcedit, non ta-
 men semper, nauseam vo-
 mitus sequitur. Hæc si in
 morbis acutis in die super-
 veniat theoritico, aut de-
 cretorio apparentibus sig-
 nis concoctionis, futuræ
 per vomitum crisis & solu-
 tionis ipsius morbi spem
 facit. atque hujuscemodi
 nausea non est resisten-
 dum: veluti neque vomitio-
 ni, quæ in die fit decretorio
 quam-

quamdiu confert, & leviter
fertur.

Sed nausæ alio tempore
molestæ, per curationem
purgantium & vitiosorum
humorum curandæ sunt, ut
prius dictum.

Sic & vomitus, qui die
non decretorio, nec appa-
rentibus signis concoctio-
nis supervenit, & molestè
fertur modumque excedit,
c vires dejicit: omni si-
prehendus est modo, partim
divertentibus, partim alijs
remedijs, pro causæ tamen
efficientis conditione: nam
humores biliosi acres ac
mordaces vomitum effe-
cuerint, veluti in febribus
pneumonicis, curatio instituenda
est dictum est, ubi de cura-
tione vomitus in febribus.

Si autem frigidi ac pitui-
osi humores copia sua
stomaculum aggravent, &
vomitionem impellant,
c simul adsint graves ac
molesti dolores colicis si-
miles (facta prius sive per
purgamenta, sive per glandes
diversione) fomenta erunt

Fomenta.

2. *Incrassis corporibus ut penetret. in tenuibus magis vinū placet, quum tanta diductione non est opus.*

3. *Quia calfaciunt, atque ut fructus immaturi astringunt.*

4. *Vt si sint flatu aliqui discutiantur.*

5. *Vel sponsia horum decocto imbuta. quidam orbem ligneū calfactum applicant. apponunt etiam ligneam patellam cineribus calidis plenam, cui superinductus pannus duplex vino madefactus. Itale mulierculæ cineres calidos linteo immisos applicant. Ex ligneis orbibus nimium calidis, nimisque frequenter admotis, hepar inflammatum, suppuratum, atque ægrum mori vidimus.*

adhibenda, ventriculo ad ejus ostio calida, veluti ex crusta panis tosta & acetico deinde, vel generoso vino leviter madefacta, superasperso pulvere garyophyllorum: vel garyophyllis & ipsas crustæ impositis, quæ tam calida quam ferri potest applicanda.

Hujus loco sacculo uti licebit. in quo absinthium, rosæ, origanum, calamentum, pulegium, serpillum, thymus & similes herbæ: & sem. anisi, carvi, cymini sint insuta. qui in vino decoctus & expressus erit ventriculo admovendus. Sedato vomitū, offerenda ventriculū calfacientia ac roborantia, & unguentis, ceratis, ac sacculis cum gossypio utendum: veluti in curatione fastidij à causa frigida. observata eadem ac simili victus ratione. Si autem non vehemens pituitosorum ac crudorum humorum vomitio sit, neque cum magno dolore, & frequenter singulisque ferè diebus

ibus recurrens: hiera pi-
ra danda erit, vel pillulæ
ephanginæ, aut simile ali-
quod med. cum syr. aceto-
sæ, vel oxymelite. Syr. etiam
acetosus sive simpl. vel
etiam 6 compositus jejuno
ventriculo sumptus sæpè
plus vomitionem curavit
quam æmulem 7: humores pituitosos
incidens ac deorsum com-
pellens. Postea possunt con-
fect. dari: & unctiones si-
milis; localia adhiberi ut
ante dictum.

Contingit autem vomiti-
onem non solum propter
pituitosorum humorū in ven-
triculo collectionem ac re-
bundantiam fieri, sed &
et alijs de causis. Colicos, ac
ephriticos dolores fre-
quenter comitatur vomiti-
us, & non rarò ipsius pau-
sò antè assumpti cibi, non-
nunquam verò & crudo-
rum humorum. Huic au-
tem vomitioni non aliud
adhibendum remediū quàm
effectio, quam comitatur,
requirit. Exonerat se &
quandoque lien, aut jecur

6. Vel ipsi ex ijs, quæ
vêtriculo utilia, ut enu-
la, mentha, origano cum
aceto & saccharo com-
ponimus.

7. In exigua quanti-
tate, & ut vomitum fa-
ciat. tamen causam tol-
lit.

Prognosis.

Lect. 83, Mart. 15.

8. Quicquid fuerit in
ventriculo. non enim
per se afficitur.

9. In pulmone, vel mesenterio vomitum non movet, sed quandoque per intestina effertur pus. quod Fernel. ait, & vidi. nihil autem, mali modo ita erumpat.

10. Semper quidē adest. verum quandoq; minor. ita ut assumpta retineri queant. ac tum major spes salutis,

& copiosum sanguinem, eumque atrum ad ventriculum demittit, qui deinde cum vomitu per vim cum molestia & magna virium dejectione rejicitur, de qua prius dictum est. Ilei dolorem vomitus quoque comitatur. qui gravis, molestus & perniciosus, ut Hipp. refert 10. aph. 7. præsertim quando alvi excrementa per os redduntur, & ea quæ subtus injecta sunt sive enemata, sive glandes sursum rapiuntur. Est & malus vomitus ex phymatis, sive tuberculi interioris ruptione. quod quidem vel in ventriculo, aut sima hepatis parte, vel in liene, aut vicina aliqua constitit. Iam & malus vomitus est in omni capitis vulnere. ostendit enim cerebri meninges, vel ipsam ejus substantiā simul læsam esse. quod absque summo vitæ periculo non accidit. Pestilentes febres comitatur etiam perniciosus vomitus. qui veneni vehementiam & malignitatem

tatē ostendit. In omni. a. vomitu ex quacūq; causa fiat, singultus & oculorū rubor, Hipp. authore, mala sunt. Malæ verò & convulsiones. significāt enim superfluam ac nimia corporis inanitionem. Extant verò & nonnullæ apud Hipp. 2. prædict. de vomitu sententiæ. quas illic requirēdas reliquimus.

11. Qui vomunt faciliè laborāt oculis. nec aded malum. neque etiam in Coacis ejus fit mentio. sed solum in aph. qui forte depravati.

De imbecillitate ventriculi.

CAP. 41.

Ventriculi imbecillitas ejus dicitur affectio, per quam cibus assumptus ægrè retinetur ac difficulter tardèque conficitur, & subinde cū exigua appetentia concupiscitur sic, ut non nisi modicus assumi queat; languor nempe ventriculi & virium ejus exolutio.

1. Nescio an stomachi solutionem dicens Scribonius non hunc affectum intellexerit. Vox *ὑπὸ ἀσθενείᾳ* cessationē denotat apud Polluc. 1.3.

c. 25.
Causæ.

Hujuscemodi autem imbecillitas non rarò ex morbo convalescētibus adest, quandoque verò ex ejus intemperie humida ipsum laxante, contingit. & talem quidem affectum *ὑπὸ ἀσθενείᾳ*

2. Ore ventriculi cum alijs corporis partibus debilitato.

D d 2

veteres appellant, sive supi-
nitatem. quod videlicet re-
solutis ejus viribus quasi su-
pinus jacet.

I

Ἀνατροπή.

3. Videtur sic appella-
re, cum appetitus perdi-
tionem, cum nauseosas
dispositiones, in quibus
aliquando quidem vo-
mitus contingunt. fiunt,
si post adsumptum ci-
bum paulo ve-
hementius mo-
veant. 8. καὶ τὸ π.

Causa.

Huic proxima est ἡ ἀνα-
τροπή dicta, seu subversio
ventriculi. nauseosa affe-
ctio & conatus quidam vo-
mendi, sed ab assumpto ci-
bo. in quo à nausea differt,
nausea enim jejuno accidit
ventriculo: ἀνατροπή verò
post cibum assumptum.

Accidit hæc propter ven-
triculi facultatis retentri-
cis debilitatem: quando
videlicet plus cibi inge-
stum est, quam commodè
vētricus amplecti & con-
coquere valeat. Hoc au-
tem modo affectos, stoma-
chicos veteres nominant.

2

Lea. 84. Martij 16.

4. [Aët. cap. de vom-
itu sic appellari dicit vo-
mitus concitatiores à
serosis ac malignis hu-
moribus.]

Reperitur verò & alte-
rius ἀνατροπῆς apud Gal.
mentio lib. 8. secund. locos
qui εἰλεώδης cognomina-
tur. interpret, volvulosam
stomachi + subversionem,
vocat. hæc cum magno do-
lore contingit & à priore
differens est.

Superioribus autem duo-
bus

ous malis annumeratur
etiam ventriculi *πυελισμός*
ive salivatio. quæ est humi-
la, ipsius constitutio cum
dulcis pituitæ in eo redun-
dantia. quæ deinde sensim
ad fauces sursum fertur, ac
per frequentem sreatum
expuitur.

Curatio horum affectuum
in bona victus vivendique
ratione potissimum consi-
stit. Resiccantium, ac me-
diocriter astringentiũ usus
utilis est; Et si frigiditas ad-
sit, moderatè calfaciētium.
Exercitium non vehemens
& sudorem non movens,
jejuno corpore, conducit,
& exigui temporis à cibo
abstinentia. Post cibum
sumptum quiescendũ est:
præsertim quum ventricu-
lus subversione laboret.
ac suo tempore somnus ad-
mittendus. Cibus opor-
tet esse facilis concoctio-
nis: ut sunt ova, carnes, vi-
tulorum, & volucrum. in-
ter quæ laudantur aviculæ
silvestres & montanæ, lon-
gè à locis palustribus ver-

Salivatio.

5. Hic major humorum
copia. quæ à prioribus
differt. *πλόιδον* author
lib. qui Medic. inscribi-
tur cap. de humoribus
appellat.

Curatio.

6. Quia omne, quod vi-
res dejicit, etiam ven-
triculi robur frangit.

7. Ut concoctio melius
persici possit.

8. Quia levi motu ad
vomitus incitantur.

9. [Dicit hoc etiam Gal. 7. meth. 4. ac paucum etiam vult esse.] *πλάσθον* ventriculi resiccatur *ἐν ποφάγῳ*, & absinthij potus. In med. c. de humor.

10. Præsertim si frigidus ventriculus, ne frigidis offendatur. Pro sunt verò, & quæ bene olent. nam odores *τὸ κρύον* & *ἀπὸν* quod inter verticem atque umbilicum est [imò & quæ infra, ut Matricem] *τετραχύων*, ἢ *παραχύων*, ut scribit in Timæo Plato.

11. Sic caro salsa, harenga, & similia, jus olivarum ratione salis resiccantia.

12. R. Rosar. rubr. sem. coriandri præparati, cinnamoni ana ℥ 2. mastich. garyophyll. sem. anisi. ana ℥ β. sacchari quantum est pondus omnium.

santes. Præstat autem cibum assum, magis quam elixum edere, & astringentibus nonnullis conditum, ut uva immatura, uva crispa, baccis oxyacanthæ seu berberis, mali punici acinis. vino omphacite, quod omphacium vocant; quibus & aromata admiscenda sunt: ut gingiber, cinnamomum, garyophylli, vel etiam piper aut galanga. possunt & olivæ muria conditæ dari, tum & capreares; & quæcunq; sunt talia. quæ vel statim initio, vel cum ipso cibo statim assumere prodest. A cibo laudantur astringentia, ut sunt carnes cydoneorum, inter quas præstant aromata admixta habentes. Dantur verò & utiliter tragemata quædam post cibum: ut ex rosis rubris, sem. coriandri, cinnamomo, & alijs nonnullis cum saccharo permixta. quæ cum particula panis tosti in vino madefacti aut aliter exhibentur. Vnctiones autem

ex

ex ol. astringentibus. tum
& alia localia, qualia in
i. 11. dicta sunt, cōveniunt.

Quod si verò & adeo
multa sit ventriculi humi-
ditas ut præscripta ratione
non mox corrigatur, dan-
da erit pill. una ex hiera-
picra, vel alephang. pon-
dere 13. 3 β. bis tervè in
hebdomada, mane jejuno
ventriculo. quæ ad humidi-
tatem resiccandam, & ro-
borandum ventriculū pro-
desse poterit.

Subversio autem illa, quæ
volvulosa dicitur curatio-
nem requirit, qualem crudi
humoris cum dolore, vo-
mitio. de qua ante dictum.
Commendant ad hanc ve-
teres pastillū Amazonium
14 quam ex calidis, aliquot
mod. componitur, quibus
additur opium. hujus loco
nostra ætate diagalanga,
diacyminū, & similes com-
pos. receptæ sunt. neq; alijs
utimur, nisi magnitudo do-
loris ad opiata impellat.

13. Magnā enim quan-
tatem non fert ventri-
culus, & si non statim
purget; tempore id fa-
ciet.

14. ℞. Sem. felini 3vj.
anisi 3vj. absinthij 3
iiij. piperis 3ij. myr-
rhæ 3ij. cinnamomi
3vj. opij 3ij. castorij
3ij. fiant cum aq. tro-
chi Dosis integra 3j.
Stomachicis cum vini
protropi 3iiij. exhibe-
tur. 8. Secundum loca
Gal. ex Asclepiade.

Leq. 84. Martij 19.

De Cruditare.

I. Ventr̄is haud segne ministerium, nec magis alitur, quam alit, red- dens in omnes corporis partes hunc, quo vivi- mus, vigemusq; divisum pariter in venas matu- rum confecto cibo san- guinem. Agrippa Mo- nen. apud Liviū. dec. 1. l. 2. Hinc regem totius corporis dixere: quod hujus validus firmet te- nor omnia membra. At contra ejusdē fran- gantur cuncta dolore. Sammon. Hinc quidam omnes morbos, quod omnes ex stomacho ori- antur, uno remedio cu- rari posse scripsit. Mul- tos sanē propter erro- res in victu commissos, oriri; illosq; uno ven- trem deonerantium ge- nere curari, verum.

Cruditas facultatis cō- coctricis ipsius: ven- triculi frustratio est. Tri- plici hæc accidit mode- bus. 1. Quando cibus assum- ptus omnino nō alteratur: quæ ἀπεψία dicitur. & ex- tremā est cruditas. 2. Quā- do cibus quidem alteratur, sed tardē & difficulter ad- modum, sic ut multo tem- pore vix mutationem sus- cipiat, dicitur & hæc crudi- tas, non tamen privatio- nem, sed vitium tantum- modo significans; græci βεβδυνεψίαν .i. tardam concoctionem appellant. 3. Quando assumpta non ut oportet mutantur, sed non corrumpuntur sic ut concoqui nequeant, atque in substantiam idoneam ad corporis nutritionem con- verti non possint. & tale quidem concoctionis vi- tium cruditatis etiam no- mine comprehenditur. & nullum nomen proprium, ut Gal. ait, obtinet.

Causa

Causa autem cruditatis ^{Causa,}

duplex est: vel enim ipsius ventriculi facultas læsa, vel aliquis externus error. Læditur autem ventriculi facultas vel per intemperiem aliquam, frequentius frigidam, subinde tamen & nimis calidam; & quandoque absq; humore, quandoque cum humore: vel propter inflammationem, erysipelas aut similem instrumentalem morbum² in eo consistentem, per quem facultas ejus læditur.

Error autem extrinsecus adveniens concoctionem impediens tripliciter fieri potest. 1. propter humores vitiosos in eo contentos. 2. à cibis. 3. propter exiguum ac brevius somnum. Et frigida quidem intemperies concoctionem impedit, vel tardiores eam reddit. Similiter existentes in eo frigidi ac pituitosi humores concoctionem assumptorum remorantur. Nolumus etiam calida ven-

2. Siquidem accedat intemperies, alias novimus aliquē, cui ob aneurisma nulla ventriculi, in quo erat, actio læsa; imò ob calidum sanguinem auctū, fortè etiam melior fuit, eo tamen erumpente subitò mortuus est; quum antea benè pinguis, bona ratione victus, factus esset.

3. Sunt autem tales, vel triculi intemperies cibodis
sua natura: ut Fungi, ex facilis concoctionis cor-
quorum usu etiam non rumpit, ac in pravam sub-
medicatorum (qualem stantiam convertit, quod & boni
Claudius supserat, post biliosi, ac vitiosi humores
quē nihil amplius edit) in ventriculo existentes, fasti-
quamplurimi quotannis ciunt. Pravi item ac vi-
moriuntur: vel vitiū ex- tiosi cibi: bonam conco-
terius ex putredine, aut ctionem impediunt. licet
prava præparatione cō- nullo affectu ventriculus
traxerunt. laboret. Impeditur verò,

4. Quanta est gula que & concoctio per immodi-
sibi totos Ponit apros- cam ciborum potionisq;
Pœna tamen præfens, quantitatē, quando vide-
quum tu deponis ami- licet tanta assumptorum
ctus Turgidus & cru- est copia, ut nec commodè
dum pavonem in balnea amplecti, nec retinere eos
portas. Hinc subitæ ventriculus queat. tunc
mortes, atque intestata enim assumpta subinde vo-
senectus. Iuvenal. Sat. I. mitu rejiciuntur, vel mul-
Hinc illud. Plures necat tum temporis quietis ac
gula quam gladius. somni ad concoctionem
requirunt.

5. Ut caseum. sic quen- 4. Mala verò &
dam novi, qui ita oderat qualitas assumptorum non
vaccinā carnē ut etiam rarò causa est, ut non con-
si ex bove comedisset & coquantur: ut cibi corrup-
quis cum ex vacca co- ti, malè cocti, adusti, &
medisse diceret, omnia quos natura odit, aut ven-
eromeret. Nil autem re- tricus fastidit.

fert, an propter id iocū-
αἰσίων cibū aliquē abhorreat, an verò ἢ ἐκ τῶν ἐν-
voia illos turbet, quod Asclapiades Menedemo quondam
exprobravit.

Sic

Sic & nonnullorum substantia concoctioni rebellis est: ut sunt vinacea, & olliculi uvarum, cappares, liorumq; fructuum membranae, furfures, & plura alia, quæ non permutata cum excrementis descendunt. Ordo quoque in assumendis cibis præpositus, ut Gal. ait, quandoq; & cruditatis causa est: veluti, inquit, si quis exempli causa, aut cotonea, aut malaunica in primis ingessit, nox olera ex oleo & garo. Potest & cibus intempestivè assumptus idem efficiere: quæ videlicet ingeritur priusquam antecedens concoctus sit, aut descendat. Et totidem quidem modis per cibum concoctio impeditur.

Opus verò est ad cibi propriam concoctionem, quiete & somno. si itaque somnus impediatur, aut brevior sit, cruditatis, quoque habitum. Eodem sensu, & illud recubitus, si quid aliud, concoctionem adjurat. f. 4. c. 50.

6. Cujus loco nos oleo & aceto condimus cibos. Varietas etiam per se lædit: Neque verum est, quod ab Asclepiade dicitur, facilius concoqui cibos varios. eduntur enim facilius. ad concoctionem autem materiae genus, & modus attinent. Cels. l. 3. c. 6. At vel ob id ipsum vitando, quod non esurientem ad comedendum invitent. Varietas itaque ciborum mala; condimentorum pessima reputanda est.

7. Nam calor, cujus opera concoctio fit, intro per somnum fertur. Itaque quod Plinius dicit: Pervigilio præcipue vinci cibos. l. 11. c. 53. non aliter verum est, quam quod à ventriculo quem gravant, vel semicocti facilius descendunt; vel jam cocti facilius distribuantur ad

Aëtiæ capiendū: Erectior

causa erit, nullo in ventriculo interno vitio existente, ut Gal. confessus est.

Lect. 86, Mart. 20.

Curatio.

Curatio cruditatis propter causæ efficientis conditionem perficitur. Si frigiditas ventriculi sola concoctio nem remotetur exhibenda sunt aromata calida per se vel cum cibis permixta: vel compositiones similes. deinde & unctiones, empl. facili culi ut in curatione ex causa frigida. Conducit verò & fons cum spongia ex vino forti, fulvo, veteri, non dulci, sed austero. Iam & catellos viventes extrinsecus admoveri ventriculo non parum prodest. Gal. puellum carnosum per quietem admoveri consulit.

Quod si simul adsint frig. humores, expurgare eos oportet: veluti in appetentia canina dictum; si non usu oxymelitis aut syr. acetosi concoctio emendetur.

Intemperies verò calida absque humore eadem curatione, qua cibi inappetentia

entia à simili causa : usu vi-
elicit actu ac potentia re-
rigerantium.

Humores autem biliosi, ac
vitiosi concoctionē depra-
vantes expurgandi sunt,
eluti ante dictum.

Circa autem cibi exhibi-
tionem sollicitudo habenda
est, ut non detur nisi post
mediocre exercitium ; &
non nisi optimus ac facilis
concoctionis, qualis ante
dictus. & quies ac somnus
non impendantur. Vitiosa
verò ac corrupta alimenta
quam citissimè vel vom-
itione rejicienda sunt, vel
per alvū deducenda. Si im-
modica assumptorū quan-
titas offenderit, quies &
somnia imperanda sunt.
Eadem facienda quando
præposterè, vel intempesti-
vè cibi assumpti sunt.

Magna autem cruditas
ventriculi diu cōsistens, vel
ad lienteria, vel ad hydro-
perem laborantem perducit.
Sed quæ ex vitiosis humo-
ribus, aut ex pravis fit ciba-
rijs, facile febrem inducit.

8. Si coactus fueris in
epulis surge per medium
transiēs, vome, & quies-
ces. Ecclesiastic. c. 31.
v. 24. h. e. refrigerabit
te, & corpori tuo non
adduces infirmitatem,
ut additur in vers. vul-
gari.

9. Quæ dato medica-
mento quam citissimè
desinit. calor enim non-
dum in sanguine hæret.

De Inflatione ventriculi.

INflatio ventriculi ejus cum dolore est distensio, ex flatuoso spiritu in ipso collecto, & neque sursum, neque deorsum exitum habente.

1. *Tenuis enim pituita non facit flatus, qui diu in ventriculo hareant. tenues enim sunt; ideoque facile discutuntur.*

Causa vel alimenta sunt cruda: ut olera cruda, fructus crudi. qui suapte natura ad flatus gignendos sunt idonei: ut & legumina quædam. Alia causa, frigidi & pituitosi, crassi sunt humores à debili calore in halitus ac flatus resoluti; qui à retentrice facultate diutius quam par est retinentur. Quæ autem harum efficiens sit causa, non difficulter cognoscitur. nam crudorum olerum, fructuum, leguminumvè esus latere non potest. & hinc genita inflatio non est diuturna. Sed si cruda non fuerint assumpta, vel cibi ad flatus gignendos idonei, causam esse crudos, crassos,

crassos, viscidosq; humores
fit manifestum.

Ad inflationem autem Curatio.
ex crudis oleribus, aut simi-
libus cibis flatum ingene-
rantibus, sufficiunt excalfa-
cientia: piper, gingiber,
galanga, & ex compos. dia-
galanga, diacyminum, dia-
spolit. & similia.

Si verò inflatio fiat ex cru-
dis & crassis humoribus;
hos expurgare oportet.
nec satis est hiera picra so-
la, sed admiscenda ei for-
tiora sunt, ut sunt pill. ag-
gregativæ vel iliacæ pill.

Rhaz.³ quæ in omni dolore
ex flatu sive ventriculi, sive
intestinorum, mirificæ sunt
& singulares. harum .g. 7.
aut 8. cum pill. hiera mis-
ceri multum conducit. In
hoc casu enemata aut glan-
des⁴ parum profunt: si ta-
men omnino enemata inji-
cienda videantur, acria esse
oportet, ne diu hæreant, &
flatibus viam impediant.
præstat idcirco glandibus
uti.

Victus ratio & reliquo-

2. Non vinum, ne parte
crudi humoris ad hepar
rapta, obstructione fe-
brem faciat. Piper,
Zinzeber, & præsertim
cressiusculè contusa, aut
integra vix ultra ven-
triculum actionē suam
extendunt.

3. Recipiunt Colocynt
sagapeni ana ʒ 1. scam-
monij ʒ 1. Valide qui-
dem per se existunt,
sed in exigua quanti-
tate paucorum nempe
granorum, lenioribus
pilulis permistæ medio-
criter, ac nihilominus
tuto agunt.

4. Quia Glandes supra
Rectum; Enemata su-
pra Colum intestinum
vix adscendant.

rum med. in hoc affectu talis esse debet qualis in omni ex causa frigida ventriculi affectione. de quibus ante dictum.

De Inflammatione Ventriculi.

Lect. 87. Matt. 22.

1. *Omnis enim pars, quæ sanguinem alimentum accipit, etiam ossa ipsa, illo superfluo irrudente, inflammatione corripi potest.*

2. *Præsertim in non admodum obesis.*

Ventriculum, vel ejus ostium, inflammatione corripi posse, non est à ratione alienum; sed tamen rarè admodum contingit. Nata autem in illo inflammatio dolorem & tumorem affert, qui & admota manu sentiri potest. adest febris continua, sitis, & linguæ ariditas. quæ etiam majora sunt, si inflammatio erysipelatis naturam referat; minora, si vel ex solo sanguine, vel sanguine pituitoso originem habuerit.

Curatio.

Curatio à sanguinis missione incipere debet. secunda autem erit vena dextri brachij media, aut interna; sollicitudine adhibita, ne in animi deliquium incidat laborans. quamobrem non tantum

tantum sanguinis quantum
opus videbitur una vice,
sed potius duabus extrahē-
dum erit. Ventriculo enim
& præsertim ejus ostio-
o laborante facile animi
deliquium supervenit. De-
tracto sanguine non dan-
da purgantia medicamen-
ta, sed alvus leni aliquo ene-
mate expurganda. & qui-
dem sæpius, si opus fuerit.
ut ex decocto malvæ, bis-
malvæ, mercurialis, viola-
riæ. quibus addi potest atri-
plex, & beta, & nonnihil
florum chamœmeli. item &
furfures. hujus decocti su-
menda ℞ 1. deinde ol.
viol. ℥ 2. aut 3. si calor ve-
hemens est: sin minus ol.
chamœmel. vel chamœ-
mel. & violacei simul tan-
tumdem. & diacatholicon,
vel diacassia ℥ 6. vel ℥ 1.
sacchari rubei tantumdem,
exiguo salis addito.

Victus ratio in hoc affe-
ctu humida sit ac liquida,
ne videlicet diutius assum-
pta in ventriculo hæreant:
ut juscula caponum, galli-

3. *Ne fiat attractio ad
locum affectum.*

4. *Ac comprimendo lo-
cum affectum dolorem
augeant.*

E e

5. *Dum materia adhuc influit.*

6. *Quando non amplius influit: tum enim discutientibus, aut maturantibus utendum.*

7. *Quod inde colligemus, si morbus diutius consistit.*

8. *Dum materia peccans adhuc fluit, ut in Principio, & in initio Augmenti.*

narum, cum ptisana decoctorum. quibus initio ⁵ ad-
di potest succus malorum
punicorum acidorum, aut
cydoneorū, aut succus uvæ
immaturæ, aut ompha-
cium, vel similia astringen-
tia: à quibus tamen in pro-
gressu ⁶ morbi abstinend-
um. Potus sit ptisanæ de-
coctum cum uvis passis &
glycyrrhiza, additis etiam
ficibus, si videatur ⁷ inflam-
matio ad suppurationem
tendere.

Extrinssecus admovenda
sunt cataplasmata ² partim
ex astringentibus, partim
ex solventibus, ut ex rad.
bismalvæ decoctis, farina
hordei & fœnugræci, ab-
sinthio, rosis rubris. florib.
chamæmeli ac meliloti in
aqua simplici, vel in de-
coctione radicum deco-
ctis. quibus addendum ol.
chamæmelinum, & tantun-
dem rosacei, vel de absin-
thio: rosaceum quidem, si
ad erysipelatis naturam ac-
cedat; de absinthio, si mi-
nus calida inflammatio.

Quod

Quod si verò ad suppurationē tendat (quod cognosci poterit ex tumore non imminuto, sed molliore facto) tunc cataplasma admovendum, quod nec rosas, nec absinthium, aut horum olea, aut alia astringentia contineat; sed rad. tantummodo bismalvæ, & farinam tritici, sem. lini ac fœnugræci cum ol. chamœmelino, aut simili.

Posteaquam in abscessum conversa eruperit, potioni admiscendū erit mel rosaceum, vel aqua hordei cum melle rosaceo propinenda; vel saltem hydromeli pro potione exhibendum.

Est autē inflammatio ventriculi gravis in primis, ac periculosissimus morbus: magnam enim causam esse oportet, quæ in parte non carnosa inflammationē excitare potest. Deinde ventriculus, & præsertim ipsius ostium, pars est valde sensibilis, quæ graves affectiones diu sustinere nequeat.

9. Saltem magna quantitate: nam exiguum quid adstringentium, ob tonum ventriculi, quæ pars satis nobilis est, conservandum immisceri, absurdum non fuerit.

10. Ad ablutionem ulceris.

Prognosis.

E e 2

Lea. 88. Mart. 23.

De Cholera.

1. Alba ferè sunt quæ excernuntur.

Causæ.

2. Ut fungi & similes cibi. pinguedo assa, aut frixa &c.

3. Cholera subitò sæpè moriuntur; neq; tamè ulli morbi minori momento succurritur &c. Hic morbus & acutus est & inter

Curatio.

Intestina, Stomachūq; versatur, sic ut cujus potissimum partis sit, facile dici non possit. Cels. 4. Aquam tepidam Paulus exhiberi vult. Distinguit bene Trallianus, si prava alimenta adhuc in ventriculo sint, ac nausea ac conatus quidā sint. tunc exhibenda.

5. Gratius ægris ut singulis appositis, modo hoc, modo illo utantur.

Cholera immoderata & vehemens est ventriculi perturbatio, cum assiduo vomitu, & continuantur ferè alvi dejectione.

Causa aliquando sunt corrupti, aut vitiosi cibi assumpti. Sæpenumerò autem pravi humores: velut biliosi, ventriculum ad dejectiones & per superiorem, & per inferiorem partem irritantes.

Qualiscunq; autem tandem causa fuerit, posteaquam prava & alimenta ventriculo molesta rejecta fuerint, offerenda & adhibenda sunt, quæ ventriculum roborare queant: ut syr. de granatis acidis, de agresta, de cydoneis, de mentha, diaribes. quorum singuli vel seorsim vel inter se permixti, sæpius in exigua quantitate offerendi sunt. Ventriculus verò & totus venter inungendus ol. mastichino, vel cydoneorum addito

lito ol. de mentha, vel de
absinthio; nisi obstat calor.
Fotus ex vino austero
cum spongia subinde etiam
profuit.

Alimentum, veluti sorbitio aliqua, in exigua quantitate, & sæpius per intervalla exhiberi debet: ut lac ex amygdalis dulcibus, vel sorbitio ex aqua & vino cum ovi luteo, vel ³ similis, quæ alvum lubricam non reddat. Iurulenta fugienda sunt, & olera: donec ventriculus robustior factus solidiorem cibum admittere potuerit.

Posteaquam autem cholera repressa vomitus, & alvi dejectio cessaverint: si linguam & palatum albis sordibus gravari contigerit, utile erit pulverem specierum hieræ picræ cum syr. aliquo, veluti de limonibus permixtum exhibere, vel pill. ex hiera picra dare, ut reliquæ sordium ventriculo inhærentes expurgentur.

Os verò aqua hordei, in

6. Non obstat calor ubi ex vitiosis est humoribus: quod plerumque fit.

7. Sanitatis pars est vomitum esse suppressum. Cels. 4. c. 11.

8. Ut conserva rosarum in aqua dissoluta, inde panis intinctus sumendus.

9. Quod vocant die sprouvv. non sunt autem æquæ Veterum. in quo valde errant neoterici. nam illæ sunt ulcera maligna cum quibus etiam partes maxillæ cum dentibus exciderunt: cujus remed. aqua in qua viride aris, seu erugo, & alumen solutum. Sordes autem hæc etiam in tertiana, post nimium usum frigidorum, contingunt.

E e 3

10. Aut sequitur mors, qua sit decoctum nonnihil
aut convulsio, quam cu- herbæ morsus diaboli, &
rato morbo tamē cessare additum aliquid mellis ro-
vidimus. Magna reme- facei, sapius colluendum.
dia non fert ^{Prognosis.} Acutissimus autem affe-
ventriculus. ctus cholera est, citò labo-
Convelluntur autem su- rantem in vitæ periculum
ra &c. eo affectu, quem adducens 10, celerrimam
de Cramp vocamus; alij idcirco curationem postu-
Spasimum flatulentum. lans.

De Diarhœa.

Lea. 89. Aprilis 9.

1. Libr. 4. c. 12. Sed
nescio an non virum
eruditum quidem, sed
qui animū nunc ad rem
rusticam, ac militare,
nunc ad Philosophiam,
& jus civile divideret,
affinitas nominum Cœ-
liaci, & Colici morbo-
rum, deceperit; ut de
eodem affectu hoc 12.
& 14. cap. bis ageret;
sic tamen ut huic cap.
quedam ad Cœliacum,
quedam ad Colicum
morbum pertinentia in-
sereret.

Diarhœam Græci vo-
cant alvi illud proflu-
vium, per quod liquida de-
fluunt excrementa citra ta-
mē crudorum & non con-
coctorum ciborū, vel san-
guinis alicujus permixtio-
nem. in quibus à lienteria,
& dysenteria differt. Paulus
hujusmodi affectum, Cœ-
liacum vocat. contra Cel-
so. Cœliacus affectus talis
est astrictio, ut nec flatus
erumpere, nec excremen-
ta descendere, nec excerni
queant.

Contingit autem alvi
profluviū, vel universo cor-
pore, vel una aliqua, vel plu-
ribus partibus malè se ha-
ben-

entibus, à quibus humores ad intestinum transfusi diarrhoeam excitant. quandoque & ventriculus & jejunum intestinum magis affecta sunt, reliquo corpore bene se habente. Ab universo autem corpore alvi profluvium non uno incidit modo: aut enim in febribus, aut in alijs acutis supervenit morbis. in quibus quando fit, si posteaquam bona & concoctionis apparuerint signa, & in die critico contingat, bonum est: nam confert, & morbum solvit. tale etiam leviter fertur, nec stridorem facit, aut tormina infert: neque reprimendum est, nisi superfluat & vires dejiciat. quo casu adhibenda erunt remedia, qualia infra dicentur. Accedit verò & quandoque alvi profluvium in morbis acutis, aut febribus diuturnioribus, non apparentibus signis concoctionis. quod diuturnitate sua molestum est, & propter corporis fit col-

E c 4

liquationem. excrementa autem in hujusmodi profluvio liquidiora quidem sunt, non tamen omnino aquosa, sed glutinosa & pinguis, & ad hæc admodum graveolentia, & frequenter colore flava ac biliosa apparent. Quomodo autem huic sit occurrendum, inter accidentia in febribus, ubi de Syntexi, dictum est.

Fit verò & quandoque alvi profluvium à toto corpore citra febrem, quando humorum in toto corpore est redundantia. quam consuetorum exercitiorum intermissio, & otiosa vita frequenter præcedit, vel consuetæ alicujus vacuationis suppressio, aut ciborum potuumque immodica repletio. Tale autem alvi profluvium si absque torminibus & doloribus fiat, & leviter feratur, confert. nec prius cohibendū est, quam superfluere videatur, vel tormina ac dolores accesserint, ac vires dejiciantur. Interim observanda bona victus

2. Vna die fluere alvum interdum pro valetudine est, atque etiam pluribus dum febris absit, atq; intra septimū diem conquiescat. purgatur enim corpus, & quod intus læsurum erat, utiliter effunditur. Verum spatium periculosum est. Cels.

victus ratio, & abstinendum ab ijs, quæ alvum lubricare, vel irritare queant: ut sunt jura carniū, olera pleraque & fructus: veluti poma, pruna, cerasa+. Exhibenda verò initio non ea, quæ valenter astringunt, sed quæ ad ciborum distributionem faciunt: ut vinum album tenue, & ex hoc factæ cum aqua sorbitiones; vel aqua decoctionis sem. anisi addito aliquantulū cinnamomi. Carnes potius sint assæ quam elixæ. Panis absque fufuribus, sed benè fermentatus. Perseverante autem fluxu, & molestiam afferente, præter ea quæ dicta sunt, exhiberi poterunt, quæ magis astringunt ac ventrem retinent: ut conserva rosarum rubrarum antiqua, syr. de rosis aridis, syr. de cydonijs; & in causa calida, syr. de mentha. carnes etiam cydoniorum conditæ ante cibum dandæ.

Vngendus verò ventriculus, tum & ipse venter

3. *Ut sunt spinachia, malva, beta, decoctio brassicæ, &c.*

4. *Potui etiam quantum fieri potest, demendum: exemplo Corvorum, qui quod æstate alvi fluxu laborent, etiam nitidissimis Arethusæ, Danubij, Nili, aut alicujus alterius fontis, aut fluminis aquis, ut bibant irritari se non sinunt; ne morbum augeant; sed quasi Tantalij alij sitim perferunt; non ab Hippocr. Machaone, aut Centauro Chirone, sed à natura sola docti. Theophrast. Simocatus in physicis.*

E c 5

oleo mastichino, rosarum, cydon. myrtino, aut de mentha, vel cum aliquot horum inter se permittis.

Adhiberi verò poterunt & emplastra, tum & facculi, & fomenta, ut in curatione diarrhoeæ provenientis ex mala affectione ventriculi, & jejuni intestini; ut infra dicetur.

A toto autem alvi profluviū etiam accidit phthificis, ac tabescentibus, sed non propter humorum copiam, sed propter virium naturalium imbecillitatem, & retentricis debilitatem. quale alvi profluvium lethale Hippocrates aph. 12. & 14. lib. 5. refert. Sic & quandoque hydropticis alvi profluvium accidit, viribus plane dejectis, & intestinis à copia humorum ita pressis, ut diu retineri nequeant. atque his, non minus quam phthificis, lethale est alvi profluvium.

A jecinore autem fit alvi profluvium: quando in dextro hypochondrio gravitatis

s. Hoc alvi profluvium observavi aliquādo. nullus autem præter Rondeletium ejus meminit, qui omnes mori scribit.

Lecl. 90. April. 10.

statis sensus cum tensione
liqua sentitur, & excre-
menta chylosa fuerint, hoc
est, concocta quidem, sed
liquida & instar glutinosi
umoris lenta, & subinde
nonnihil flava, à bile per-
mixta, vel etiam varij co-
loris, odore nonnihil gra-
veolentia, non tamen ita
fœtida, sicuti quādo febris
adeſt, vel inflammatio je-
coris, aut alterius partis.
descendunt autem hæc fre-
quentius per noctem, quam
per diem. Accidit hujus-
modi alvi profluvium pro-
pter jocinoris, aut venarum
meseraicarum obstructio-
nem, & propter ipsius vis-
ceris imbecillitatem.

In curatione autem hu-
jusmodi fluxus, præsertim
iniſiō, abstinendum ab om-
nibus, quæ obstruunt & va-
lidè astringunt. exhibenda
verò, quæ aperiunt, & ad
alimēti distributionem fa-
ciunt. & præter hæc etiam,
quæ jocinori prodesse pos-
sunt, qualia sunt non ve-
hementer astringentia, quæ

6. Quia folliculus fel-
lis plerumque, quando
hepar debile est, & ipse
simul debilitatur.

7. Pro ratione ciborum
assumptorum.

8. Quando calor exter-
nus, atque motus distri-
butionem chyli promo-
vent.

9. Vias enim distribu-
tioni chyli dicatas coar-
ctare non debent, sed
tantum robur partis
nobilis conservare.

aperiētibus admisceri que-
unt. Ad aperiendum uti-
les sunt rad. apij, petroseli-
ni, rusci, foeniculi & grami-
nis. Ex herbis commen-
dantur cuscuta, cichorium,
& si affectus frigidior, vul-
gare hepatorium. Ex se-
minibus, quum affectus fri-
gidior est, sem. anisi, apij,
foeniculi; quum verò affe-
ctus calidior est, sem. ci-
trulli, cucumeris, melo-
num, cucurbitæ. ex quibus
decoctum parari poterit,
agrimonia, radi. plantagi-
nis, & sem. coriandri ad-
ditis: quæ ad jocinoris con-
fortationem faciunt. In de-
cocto illo dissolvi potest
syr. aliquis leniter astrin-
gens & roborans: veluti
syr. ex rosis aridis, aut de
granatis acidis, aut ex suc-
co cydoneorum, vel oxy-
sacchara; quæ ad aperi-
endum, & ad nonnullā atri-
ctionem conducit. Sic &
syrupi dari possunt, si affe-
ctio calidior, de cichorio
vel de endivia; si frigidior,
syr. de Bizantijs, quibus ali-
quid

Quid supradictorum addi
 poterit. Conveniunt & ele-
 ctuaria: ut diatrion santalon
 & diarhodon Abbatis : &
 in morbo frigidiore aro-
 maticum rosatū, vel etiam
 diagalanga. ex quorū spe-
 ciebus, additis corticibus
 myrobalanorum, præser-
 tim citrinarum, & cinna-
 monomo, cum vino albo cla-
 ratum factum, utile.

Conducit verò & the-
 riaca * quandoq; cum vi-
 no albo à jejuno sumpta.
 Profunt & brachiorum,
 crurum ac dorsi satis fortes
 frictiones, & mediocre
 corporis exercitium, si vi-
 res admittant. Perseveran-
 te diutius fluxu, vitiosos hu-
 mores etiā expurgare con-
 venit. ad quod maximè
 conducit rhabarbarū, ma-
 ximè tostum, cujus plus mi-
 nus ʒ i. cum vino albo ex-
 hibenda.

Localia etiam remedia
 in hoc fluxu non sunt præ-
 termittenda. ungendum est
 dextrum hypochondrion
 * oleo mastichino, myrti-

10. *Quod motum ad
 centrum, seu primam
 corporis regionem, con-
 trarium motum versus
 peripheriam inducen-
 do, si stat.*

* *Vt tonus, seu robur
 hepatis addatur. cujus
 virium rationem, utpote
 nobilissime partis, Me-
 dicum semper habere
 convenit.*

no, vel de absinthio ; & si calor adsit, addito rosaceo quibus addi potest ceratum fantalinum, aut unguentum comitissæ.

Potest verò adhiberi foliamentum ex decocto rosarum rubrarum, absinthij agrimonix, seminis anisi coriandri, & myrti in aqua & vino decoctis.

Victus ratio non dissimilis esse debet ab ea, quæ in profusio ex humorum in toto corpore redundantia convenire suprâ dicta est.

Alvi profluvium malè affecto liene.

Le 2. 91. April. 12.

A liene autem si diarrhœa fiat, adest vel tumor vel durities, vel gravitatis sensus aliquis in sinistro hypochondrio. excrementa etiam quandoq; nigricant. Talis fluxus, si fiat initio quartanarum, non est statim reprimendus: etiam si cruenta admisceantur. terminantur siquidem per huiusmodi fluxum quartanæ. & Hipp. dysenteriam lieno-

lienosus supervenire bonum esse¹² ait 48. aph. 6. quod si tamen diuturnior alius fuerit fluxus, ei occurrendum: nam & lienosis longa difficultas intestinorum, vel¹³ hydropem, vel lenteriam & mortis periculum, affert 43. aph. 6. Sic & fluxus ventris, qui in fine quartanarum supervenit, non statim est reprimendus: nam majori periculo liberat. si tamē diuturnior fuerit, ei erit resistendum; non tamē cum astringentibus: sed per excalfactientia, & concoctionem promoventia. dandum el. diagalanga, diatrionpipe-reon aut simile. Venter un-gendus oleo de mentha, & de absinthio. Possunt & fo-menta adhiberi ex floribus chamœmeli, rosis rubris, origano, pulegio in faccu-lo confutis; vel ex milio, vel etiam malto torrefacto.

Victus ratio sicca esse debet. vinum laudatur ge-nerosissimum, ac potens; non tamen rubrum.

11. Quibus longo tem-pore lien obduruit.

12. Ratione translatio-nis, & evacuationis ma-teriæ, quæ lieni infarcta erat.

13. Lienteriam, debili-tatis diuturno pravo-rum humorum transitu Intestinis; Hydropem hepate, liene, & toto venoso genere consen-tiente.

Quod si absque febre, neque post quartanam febre, diarrhœa superveniat, excrementaq; nigra fuerint: citò remedium adhibendum, priusquam in dysenteriam transeat.

Observanda bona victus ratio, qualis supra dicta. Absinthij usus quovis convenit modo. Vtiles sunt cum cibo assumpti cappares. empl. ex ammoniaco commodè lienis regioni admovetur. vel ex ol. capparorum & de absinthio unguentum. Exhibenda quæ astringunt, etiam initio, calidis tamē permixtis: ut est diacydonion cū speciebus; vel quale à Gal. in fine lib. 6. de sanit. tuend. describitur. Sic & conserva rosarum rubrarum, & trochisci de spodio conveniunt, additis speciebus diagalangæ, & diatriõpipereon; aut diatriõpipereon, & syr. de mentha. quibus si addatur sem. nasturtij modicè torrefacti med. fiet utilius. Fomenta verò

14. *Vt etiam cochlearia & quæcunque nasturtio similia sapore.*

erò & paulò antè dicta in
hoc casu etiam cōveniunt.

Ex capite autē destillan-
tes humores si causa diar-
rhœæ fuerint, adest do-
lor vel gravitas capitis, &
excremēta spumosa sunt, ut
Hipp. 30. aph. 7. ait. Cōtin-
git autē hujuscemodi diar-
rhœam citius fieri sub au-
trina & pluviosa cæli con-
stitutione, quam sub alia, ut
aph. 16. lib. 3. Capiuntur
maximè hoc fluxu balbi, ut
aph. 32. lib. 6. Victus autem
ratio in hac fluxus specie
sicca esse debet, & cœnæ
tempore admodum parca.

Ex Catarrho
diathosa.

à vino abstinendum^{us}; tum
& à crassa, & potentiore
cerevisia. Potus sit tenuis
cerevisia, vel decoctum pti-
fanæ cum cinnamomo; vel
decoctum sem. anisi; vel
decoctum cinnamomi; vel
similis aliqua potio.

Capiti admovenda etiam
localia: qualia in curatione
destillationis dicta sunt.
profunt & apophlegmatif-
mi, seu masticatoria: ex cu-
bebis, mastiche, aut ex py-

15. Quia vaporibus ce-
rebrum copiosiorib. re-
plent; qui ejus frigore
densati in catarrhos
vertuntur.

16. *Tale quod astringentem post se relinquat.*

17. *Faciunt enim ad corroboracionem. & resiccacionem cerebri. ut etiam cardamomum & cubebæ, quæ singularia.*

18. *Non utendum nullis med. nisi quis aliquid conservæ rosacæ, vel viol. dare velit.*

Lect. 92. April. 16.

retri, vel pimpinellæ saxifragæ radice. Perseverante fluxu etiã purgans med. dandum ¹⁶: ut sunt pill. ex mastiche dictæ. quæ componuntur ex agarico, mastiche & aloë. vel pill. assa-jereth Avicennæ. quæ mastichen & myrobalanos recipiunt. quibus si nonnihil addatur rhabarbari tostati, præstantiores erunt.

Post purgationem mithridatium ¹⁷, vel theriacale dari potest, vel ex his conditum additis cubebis, cardamomo, speciebus pleris archontici cum syr. de stœchade.

Huc pertinet & fluor ille ventris, qui pueris quum dentinunt supervenit. qui bona victus ratione non difficulter curatur ¹⁸, & inunctione ventris cum ol. mastichino si perseveret.

Ventriculum autẽ & jejunum intestinum, quum alvus fluida est, malè affici existimandum est; quando nec plenitudinis, neq; universi corporis, aut alicujus partis laboran-

torantis signa adfunt. alimen-
ta tunc satis concocta
apparent, sed humidæ, li-
quidæ & aquosæ sunt deje-
ctiones. adest verò & quan-
doque nausea; præsertim
ventriculo malè habente.
In hoc fluxu ventriculus
quandoque nonnulla imbe-
cillitate laborat, sed præci-
pue ora venarum meserai-
carum ad intestinum jeju-
num pertinentia obstructa,
impedimento sunt, quo mi-
nus alimentum distribui
queat. Afficiuntur autem
hæ partes non rarò propter
frigidorū, præsertim astrin-
gentium, usum: ut sunt fru-
ctus immaturi, vel alij
astringentes, ut sorba, me-
spila, corna, vaccinia, & vi-
num rubrum austerum im-
maturum. quandoque &
fructus nullam astrictio-
nem habentes, sed frigidi
alvum perturbant: ut sunt
persica, pruna, uvæ, melo-
pepones, cucumeres: &
tunc quidē præcipue, quan-
do in ventriculo corrum-
puntur. Provocant & alvi

19. Sic usu uvæ crispæ
multos in diarrhœam
incidisse novi.

Ef 2

20. In omni fluore ventris necessarium est, non quoties libet desiderare, sed quoties necessum est; ut hac ipsa mora in consuetudinem ferendi oneris intestina deducat. Cels. l. 4. c. 16.

profluvium cibi acres, salis aut alioqui corrupti, v. corruptioni obnoxij: sunt pisces, & lac quando post alium cibū sumptum ab his abstinere oportet, cum, qui profluvio ventris laborat: aut alioqui facilius illo corripuntur, cujusmodi sunt quibus ventriculus natura debilis est. Victus autē ratio in hoc alvi profluvio talis esse debet, qualis in profluvio à corporis repletionem; non astringens videlicet, sed aperiens & ad alimēti distributionem faciens. Si verò cibi pravi, aut corrupti causam dederint; rhabarb. tostum utiliter exhibetur modo, quo supra dictum est. Prodest verò & exercitium corporis, & fœmorum, & dorsi frictiones. Perseverante verò hoc profluvio, tandem & astringētia danda erunt; veluti primo loco dicta sunt. & ventriculus unguendus ol. mastich. cydon. myrtino, vel etiam de mentha. Fomentum ex milio vel

el malto, vel ex herbis &
coribus, ut antè dictum est,
etiam conveniunt.

Possunt verò & in isto
profluvio diuturno enema-
injici astringendi vim
habentia: ut ex hordei
mundati, rosarum rubra-
um, fol. thapsi barbati, fol.
sumach. cortic. granato-
um, calicum glandium, aut
similium decocto. cui adji-
ciendū vel mel rosaceum,
absterfione opus sit, vel
syr. de rosis aridis, vel myr-
tinus, vel ex succo cydo-
neorum, (nullo addito ol.
aut pingui.) & si adsit do-
lor, etiam unum aut duo
ovi lutea.

In alvi autem profluvij
excrementorum mutatio-
nes juvant; ut Hipp. ait 14.
aph. 2. veluti si prius flava
ac biliosa excernantur, de-
in pituitosa: significat enim
hujusmodi mutatio corpus
à varijs humoribus expur-
gari. sed si viridia, nigra, aut
livida, & pingua, atq; gra-
veolentia fiant excremēta;
mutatio mala: vel enim na-

21. ℞. Hordei mundati
℥ β. fol. thapsi barbati.
M. 1. rosar. rubrar. fol.
sumach. ana M. β. cor-
tic. granatorum, aut ca-
licum glandium ℥ 2.
sem. coriandri, sem. anisi
ana ℥ 1. f. decoctio in
cujus ℞. dissolve mellis
rosacei ℥ 1. β. vel syr.
myrtini & de rosis ari-
dis ana ℥ 1. f. enema.

Prognosis.

turalis caloris defectū, vel maximam putredinem, vel corporis colliquationem ostendit. Vomitus autem spontaneus in lōga, ac diuturna diarhœa superveniens bonus est. ut Hipp. 15. aphor. lib. 6. prodest siquidem vomitus ratione revulsionis, & tunc quidē, quando humor aliūde in ventriculum influit, veluti quando ex capite. sed tamen idcirco non est vomitus provocandus, nisi in longis alvi profluvijs, & quidem viribus constantibus, & his qui vomitioni assueverunt, ut diligenter Hollerius annotavit.

De Lienteria.

Diarrhœæ diuturniori Lienteria .i. intestinorum levitas succedit. quandoque verò & dysenteria, ut Paulus tradit. Est autē lienteria velox assumptorū ciborum, ac potuum per alvū descensus, eorundemque crudorum & nondum concoctorum. idque præcipuè propter imbecillitatē retentricis ven-

Lect. 93. April. 17.

1. Nonnunquam enim per se supervenit quum facultatis tanta imbecillitas non sit initio.
2. Ut quum ob cicatrices lævia sunt intestina. quam Galenus sentētiā rejicit; quum semper lævia sint intestina, & tamen cibum retineant.
3. Hæc causa propriissimè dictam, atque ab alijs morbis distinctam Lienteriam facit, intensissima accedente cruditate. nam à Cœliace, cui maxime complicari il-

culi, & superiorū intesti-
 orum. ad quam & conco-
 tricis debilitas accedit. in-
 erdum etiam + expultricis
 notus depravatus. atque in
 oc à diarrhœa differt. nam
 diarrhœa excrementa
 uidē liquida descendunt,
 ed concocta. in lienteria
 & liquida, sed vel parā,
 vel omnino nihil mutata.
 ic ut assumpti alimenti ge-
 nus manifestē agnoscatur,
 vel omnino tale, quale as-
 sumptum est, dejiciatur.

Curatio non dissimilis
 curationi inveteratæ diar-
 rhœæ, quæ vel à toto cor-
 pore, vel ventriculi & inte-
 stinorum vitio nata est.

Astringentia s. assumen-
 da sunt, & foris admo-
 da calfacientibus permix-
 tis. Abstinendum ab ole-
 ribus & fructibus, quæ al-

lam Paulus existimavit,
 distinguitur; quod cibi
 in ventriculosa affectio-
 ne liquidi, crudi ta-
 men; in lienteria ne-
 que in consistentia, ne-
 que in colore, odore, aut
 ulla alia qualitate mu-
 tati, sed quales adsumpti
 sunt, veluti per cana-
 lem (unde vulgus σολῆ-
 να vocat. Steph.) deji-
 ciantur. Potest autē hæc
 debilitas post Ileum,
 hydropis per alvum so-
 lutionē, diurnas Dia-
 rhœas, aut Dysenterias
 relinqui. A Rheumatif-
 mo autem ac Diarrhœa
 secernitur; quod nulli
 humores cum cibis non
 concoctis descendant.
 A Dysenterijs tum per
 jam dicta; tum quod
 Tormina nulla conjun-
 gantur.

4. Ut quum cibi non concocti pondere; vel ubi superficia-
 ria excoariatio est acrimonia quasi Expultricem irritant.
 sed illud ad Celiacem; hoc ad Dysenteriam potius refe-
 rendum. Occludi cicatrice Meseraicas, & agrum vivere
 posse, imaginariū est. 5. Ad retentricē corroborandam,
 Calida verò ad roborandam concoctricem adduntur.

F f 4

6. Robur & tonus nervorum & fibrarum in mediocri siccitate consistit.

7. Aut albis; non nigris. Ante alios autem cibos hæc dentur.

8. Ut serosæ partes abstergetes absumi queant. Albi autem, propter munditiem fortè, præferuntur.

9. Ut possit concoctio promoveri.

10. Moderatè tinctum. Potus verò parcissimus esse debet. Sic Corvi, quod æstate ventris fluxu laborare consueverint, fontium, fluviorum, aut stagnorum aquas illo tempore haudquam attingunt; nec Arethusæ splēdidis, Istri frigidissimis, aut Nili latè stagnantibus lymphis, ut malum suum bibendo majus faciant, impelli se sinunt: non quod ab Hippocr. Machaone, vel Chirone Dieteticen didicerint, aut ratione utantur, sed à Natura docti, ductique, Theophil. Simocat, in Physicis.

vum⁶. humectant. brassica bis cocta, si cōcoqui queat, non improbatur. Fructus astringentes utiles sunt: ut mala cydonia quovis appa- rata modo, pira cocta, castaneæ, amygdala dulcia, ex mespilis, sorbis, ribesijs⁷ rubentibus, cornis cum saccharo bellaria confe- cta. Cibus siccior: ut ex carnibus vitulorū, aut pul- lis assis utilior est, quam li- quidior. si tamen laborans assumere recuset; dandæ erūt sorbitiones: ut ex vino & aqua: vel lac amygdala- rum dulcium: vel lac vac- cinum, in quo ferrum can- dens, aut calculi⁸ igniti ex- tincti sint: aut ex lacte puls cum oryza, milio, vel pani- co cocta. Ova recentia etiam conveniunt. Potus sit vinum generosum⁹ ac potens, vel rubrum¹⁰, ver- miculum si maturū sit, quod dilui potuerit aqua deco-

etio-

Etionis sem. coriandri, vel
cinnamomi, vel etiam ma-
stiches.

Ex medicamentosis, uti-
le diacydonion cum specie-
bus, tum & alia in curatio-
ne diuturnioris diarrhœæ
dicta. Vngendus verò
& ventriculus ol. aliquo
astringente: ut ol. mastichi-
no, vel de cydoneis, vel de
mentha, vel myrtino, vel
de absinthio, aut aliquot
horum permixtis, addita
cera & pulveribus garyo-
phyllorū, cyperi, galangæ,
mastiches, & similiū. vel
empl. ventriculo imponen-
dum, quale est ceratum sto-
machale: præsertim si loco
ol. rosacei, quod compo-
sitio apud Cordum habet,
sumatur ol. mastichinum,
aut de mentha. Vel potest
componi empl. isto præ-
stantius, ex ladano, cera, &
oleo mastichino, de men-
tha, & de absinthio, cum
garyophyllis, galanga, thu-
re, mastiche, rosis rubris, &
lauri baccis, in pulvere tri-
tis. Vel hujus loco appli-

II. Quod ut frigidum,
concoctricis defectum
augere posset. Ideoque
nec lotio ol. & ceræ per
aquam rosaceam, præ-
sertim sæpius repetita,
hic requiritur: & pro
rosis non malè, vel sal-
via, vel mentha substi-
tueretur.

F f 5

12. *Vel ipsius Gal. 8. secundum loca, & 8. Methodi descriptum.*

Prognosis.

13. *Quum causam habeat intemperiem factam, seu hecticam & quidem intensissimam. Atque egros interdum trahit, interdum precipitat.*

14. *Quando calidū nativum debile est; ut hyemis condensante frigore restinguatur potius quam excitetur.*

Lea. 94. April. 19.

Dysenteriae
differentia.

1. *Vide Gal. 4. de artic. comm. 38. & 39.*

1. *Hepaticus Huxus,*

cari potest, quod apud Nicolaum titulo cœrati Gal. extat ¹².

Difficilis autem morbus lienteria est ¹³, præsertim si autumno ¹⁴ incipiens in hyemē pertrahatur, ut Aëtius ait. Consequitur hunc atrophia, seu universi corporis extenuatio. In longis autem lienterijs, si ructus acidus, qui prius non fuit, superveniat, signum esse bonum Hipp. refert aph. 1. lib. 6. significat enim, ut Gal. ait, cibum aliquandiu in ventriculo retineri, mutationisque principium accipere.

De Dysenteria.

Dysenteriae nomen aliquando generaliter sumitur: pro quavis sanguinis per alvum & intestina excretionem. aliquando verò magis propriè, pro illa tantūmodo affectione, per quam sanguis cum torminibus, ramentis quibusdam & excrementis permixtus rejicitur. Ad generaliore[m] appel-

appellationem pertinet ille alvi fluor, per quem tenuis sanguis loturæ recēter matatarum carniū² similis excernitur: deinde aucto malo, ut Gal. 6. de loc. aff. ait, crassus humor fecibus vini, rubri videlicet, aut limo sanguinis³, haud absimilis. Fit autem hic fluor propter retentricis, sed potissimum alteratricis jecinoris facultatum imbecillitatem, & frequentissimè citra inflammationē: quandoque verò & inflammatione accedente. hunc fluxum hepaticum, & jecorariam dysenteriam Paulus vocat.

Huc verò facit & ille sanguinis per alvum fluxus, quando natura gravata sese exonerat⁴: veluti his contingit, quibus præcisa magna aliqua corporis est pars, veluti crus ablatum, aut brachium. Vel qui priori tempore laboribus ac validis exercitijs assueti derepēte hæc deseruerunt, non imminuta interim ali-

2. *Quamdiu propter atoniam semicoctus, seu crudus solummodo.*

3. *Quando succedente putredine, atque ex illa, calore humor qui effluit tostus, seu superassatus est, ac in melancoliam mutatus.*

2. *Dysent. cruenta.*

4. *Ideoque valentis, non debilis facultatis ut fluxus hepaticus, indicium est.*

5. *Etiam in Recto, longè tamen supra Anum: quo solo ab Hæmorrhoidibus differt. Gal.*

6. *Ex Gal. 5. de locis affectis circa finem.*

3. *Cum Vomitione atrorum etc.*

7. *Fit hoc aliquando per multos menses, vel annum etiam à percussione. oportet autem illum sanguinem in* 4. *A Casu, venis loci cõ-* 1. *Idu etc.*
tusi hæsisse, alioqui pueruisset.

mentorū quantitate, quā uti solebant. tunc enim sanguis, qui per validas exercitationes ac labores digeri solet, vel qui prius ad partem præcisam deferebatur celeriter, in venis colligitur, & copia nimium adaugetur. auctus autem supra modum sanguis, sæpius per nares, vel per hæmorrhoides, aut mulieribus per menses, aliquando verò & per ora venarum in intestinis, aperta excernitur, ut Gal. comment. 4. in lib. Hipp. de articul. vidisse se refert. Hujusmodi autem sanguinis fluorem, cruentam dysenteriam Paulus nominat. Exonerat verò se & quandoque hepar, sed frequentius lien à sanguine crasso, qui plurima parte vomitione rejicitur: partim verò etiam per intestina descendit. de quo supra ubi de sanguinis vomitu.

Contingit & quandoque sanguinem per intestina expurgari ab his, qui aliquando vel ex alto ceciderunt,

derunt, vel circa hypochondria, vel lumbos gravem aliquem ictum sustinuerunt. & talis quidem sanguis quandoque nigricans est, interdum verò & graveolens existit.

Per hujuscemodi autem excretiones, & multa excrementa, & affatim excerni solent*, ut Gal. testatur.

At in dysenteria propriè dicta non copiosè, sed paulatim, & per brevissima intervalla dejectiones fiunt. nec purus sanguis statim initio, sed in morbi progressu excernitur. initio enim quidam mordaces, & acres humores cum liquidioribus excrementis descendunt. mucosa deinde quædam ab intestinis abrasa, & subinde adiposa, ac pinguis succedunt. postea sanguinis nonnihil admiscetur: & tunc propriè dysenteria dicitur. quum videlicet non solum abrasa sunt intestina, sed & læsa, ac exulcerata ¹⁰ eorum substantia apparet. Adsunt

8. Præsertim in 2. & 3.

5. Propriè *specie*.

dicta, quæ
rursum va-
ria pro.

9. Nomen hoc
locum affe-

ctum, & Symptoma,
Dolorem nempe, simul
definit. unde Fluxui, qui
cum Torminibus, so-
lummodo propriè tribui
potest.

10. Aded ut interior
tunica, soluta connexio-
ne, secundum longitudi-
nem abscedat, egredia-
turq; Aret. lib. 4. cap. 9.
Exulceratio autem in
Dysenteria duplex; aut
enim nuda Intestinorum
exulceratio est; aut cum
putrefactione, quæ No-
men Medici appellant.
Gal. 9. sec. loca.

Causarum,

* *Vel Lap. lazuli, & illorum quæ ex metallicis conficiuntur.*

II. Sic *Ranunculus flammula* Dysent. facit. Arboris cujusdam in India fructus quamvis dulcis, esum *Alexander Magnus*, quod dysenteriam faceret, prohibuit. *Theophrast.* 4. *histor. plant.* c. 5.

tunc dolores, & tormina ventris & intestinorum. accedit subinde & sitis, & febricula quædam. interdum verò & affectio eousq; intenditur, ut & membranosa quædam intestinorum particula simul expurgentur, quæ subinde tam magnæ, ut carunculæ quædam videantur & dicantur. Humores autem acres & mordaces, dysenteria effectrices causæ frequentissimæ, biliosi sunt: subinde pituitosi, falsi ac corrupti: rarò melancholici ex adustione nati. qui ab ipsorum excrementorum colore cognosci, ac discerni possunt. Quandoque verò & vehementissimorum medicamentorum immodicus usus dysenteria causa est, ut scammonij, vel colocynthidis*, vel aliorum venenosorum¹¹. Dysenteria autem à biliosis humoribus promptissimè accidunt, quando aëris constitutio calida ac diutinè sicca permanet. nam ut Hipp. 16. aph. 2. in
sicci-

siccitatibus dysenteriae fiūt. 12. *Exercitus Frācorum*
 sic & per aëris constitutio- *pars tertia ex carniū*
 nem humidam, præsertim *bovillar. & aq. Padanæ*
 pestilētem, dysenteriae fiunt *nimia ingestione dysē-*
 ex 12 humore pituitoso cor- *teria facta, interiit. Pro-*
 rupto 13. *co. de bello Gothor. l. 2.*

Lect. 95. 13. *Tachus*
 April. 20. *quum fruga-*
 Intestino- *lē Ægyptio-*
 rum affe- *rum vivendi*
 ctu vā- *rationē Per-*
 rietate. *sarum delicijs permu-*
tasset, Dysenteria inte-
riit; delitijs mortem si-
bi lucratus. Ælian. l. 5.
var. histor.

Afficiuntur autem in dy-
 senteria propriè dicta quā-
 doque crassa ac inferiora
 intestina, alias tenuia & su-
 periora. inferiora potissi-
 mum laborare atque exul-
 cerari, adiposa ac pingua
 simul cum excrementis ex-
 purgata ostendunt: sic &
 sanguis ipsis non exquisitè
 permixtus. tum & dolores
 circa inferiorem ventrem.
 Superiora verò magis affi-
 ci existimandum, quando
 nulla pingua exeunt 14, &
 sanguis excrementis per-
 miscetur, & dolor circa
 umbilicum magis existit *.

14. Particulæ nimirum
seu grumi. nā supernatas
quandoq; pingue quid-
dā, ut in colliquatione.
** Amphiretus à piratis,*
ut magnum ab ipso li-
trum extorquerent, in
Lemno detinebatur. at
ille à cibo abstinens ru-
bricam marinæ permistam aquæ bibebat. itaque cum san-
guinis fluxu laborare illum crederent, ne moreretur, vin-
culis illum liberarunt: atque ita clanculum elapsus Acan-
thum fuga devenit. Polybius l. 6. stratagem. Hic fluxus
sanguineum mentiens ad Medecinam quidem propriè non
pertinet. est tamen ubi technas hasce nosse, & Magistra-
tus de ijs monere, necessum est.

Curatio. Fluxus hepaticus, jeco-

1 raria quæ dysenteria vocatur, quomodo sit curandus, dicetur ubi de imbecillitate jecinoris.

2 At cruenta dysenteria initio sanguinis missionem

15. Quum enim ex sanguinis naturam onerante copia proveniat, sine illius imminutione, frustra omnia, quæ sanguinis fluxum sistunt, adhiberentur, aut exhiberentur.

15 requirit. quæ ex communi brachij vena facta, ac etiam repetita, si repletio corporis magna fuerit, si non cesset, & superfluere videatur; adhibenda erunt remedia, quæ adversus sanguinis immodica profluvia commendantur: ut sunt rosæ rubræ, balauſtia, berberis fructus, semen myrti, sem. acetosæ, acacia, hypocistis, sanguis draconis, gummi arabicum, gummi tragacanthæ, rad. tormentillæ, bistortæ, pimpinellæ sanguisorbæ, mastix, thus, bolus armenus, terra lœmnia, lapis hæmathites, corallium, succinum, cornu cervi uſtum, ebur uſtum

16. Nam Spodium Græcorum metallicum est; quod foris admoveri, non intus dari, debet.

quo pro spodio 16 Officinæ utuntur. Ex his possunt variæ med. formæ componi. ex nonnullis possunt fieri pul-

pulveres qui cum astringentium herbarum decocto aut aquis destillatis exhiberi queant, veluti plantaginis, polygoni, pyrolæ, equiseti, bursæ pastoris, & similium. Si verò & pulveribus addatur conf. rosarum rubr. vel syr. de rosis aridis, vel myrtinus fiet utilis mixtura sive conditum.

Ad eundem modum licebit uti troch. de carabe¹², & de berberis, & de spodio nuncupatis. Sic & aquæ destillatæ supra memoratarum herbarum commendantur, præsertim addito aliquo dictorum syruporum. Magis tamen prosunt eorundem decocta¹³ additis supradictis rad. vel aliquibus illarum, quibus si accesserint consolidæ majoris rad. decoctum erit præstantius. licet enim astringentem non habeant manifestam, tamē ad omnem sanguinis fluorem reprimendum lentore suo conducunt. Conducit & fructuum astringentium usus,

17. *Vt liquorib. hisce veluti vehiculis pulverum vires ad loca affecta deducantur.*

18. *Troch. de Charabe, & de Spodio, ijs qui de Berberis dicuntur magis adstringunt; de Carabe propter papav. nigrum, & opium, etiam leviter narcotici sua vi dolores minuunt: de Berber. verò calidiores, & cordis dejectas vires magis refocillantes existunt propter spicam, & Galiam muschatam, quæ recipiunt.*

19. *Quia adstringentes partes, quod terrestres sint, in destillationibus vix adscendunt.*

G g

20. Qua vino permixta, quidam à fluore sanguinis curati fuere. Sub ferri verò nomine etiam chalybs intelligendus. Itaque & aquæ per ferri fodinas labentes, quales Spadanæ creduntur esse, cum fructu ægrorum exhiberi possent.

21. Quod calore & tenuitate sua fluxiles humores faciat.

atque ex ipsis paratorum syruporum, conditorum &c. de quibus in curatione Dienteriæ dictum est. Prodest verò & aqua in qua ferrum candens sæpius extinctum: quam sorbitionibus & potionibus admisceri in omni sanguinis per alvum fluore, utile habetur.

Victus autem rationem oportet esse solito tenuiorem, ne sanguinis copia iterum augeatur. à vino abstinendum, & in quiete tantisper manendum donec fluxus sanguinis cessarit. quo cessante si suspicio sit aliquem in intestinis concretum sanguinem hære, leviter abstergente enemate alvus diluenda: veluti ex hordei non purgati, vel furfurum ℞ 1. vel juris carnis ovillæ tantundem; additis ol. amygd. dul. vel chamæmelini ℥ 2. & tantundem mellis rosacei, sacchari rubri ℥ 1. diacathol. ℥ β. aut ℥ 6. & salis nonnihil. Vel si laborans recipere recusset enema; dandum rhab-

barbari infusum cum syr.
ex infusione rosarum, vel
diacatholicon, vel simile
leve medicamentum.

22. Quæ sine acrimonia,
aut vellicatione id quod
in Intestinis continetur,
educunt, & levem post
se adstrictionem relin-
quere solent.

23. Ne sanguinis impe-
tus ad loca casu, vel
percussione læsa, fiat.

24. Foris, quæ phleg-
monem repellendo inhi-
beant, & dolorem se-
dent. Intus quæ sangui-
nis fervorem minuant,
ne ex venis effluat pro-
hibeant, atque oscula
venarum firment: quæ-
que, si forte quid jam
è venis exciderit, ne in
grumos concreascit im-
pediant; aut si jam gru-
mosus factus sit inciden-
do &c. dissolvant.

25. Vires enim non ul-
tra jam constant; nec
sanguinem istum retra-
here in venas, aut possi-
bile, aut utile est.

Gg 2

26. Vbi corruptus sanguis jam eductus fuerit.

27. Dum vires adhuc sinunt. verum paucus, detrahendus. Et hoc bene successisse R. Dodon. testari solebat. Laudat & Aëtius ubi vehemens sanguinis impetus, inflammatio magna, & corpus sanguine plenum, ut ijs, quib. consueta evacuationes sup-

pressa sunt &c. Lect. 96.
April. 24.

inflammationem namque & innatum calorem refrigerat; succeditq; somnus, optimum Dysentericis remedium. Archius apud Aët. Alijs partib. exulceratis venam secamus: quidni & intestinis? faciunt id & Turce. Prosper Alpin. Vide Botallum, Trallian. Althom. Ammatum. Massar. &c.

28. Vires enim jam predebilitatas esse necesse est.

tempore simul coquentur quædam astringentia: ut rase aridæ, vel fructus berberis, vel myrti semen, vel oxalis herba, aut plantago, aut pyrola, vel alia similium, aut addi omphacium, vel succus malorum puniceorum, vel cydoneorum. Excedente verò & eodem bofluore, & sanguine florido profluente; facienda & adhibenda erunt omnia, quæ in dysenteria cruenta mondicta.

In dysenteria autem propriè dicta siquidem à bile facta sit, & ab initio invaserit, & febris adsit, viresque constent; sanguinem detrahare mox primis diebus etiam convenit. Sed si alteri morbo successerit à sanguinis missione abstinendum; præsertim si is antea detractus fuerit. Sic etiam si ab atra bile, vel à falsa pituita originem habuerit; sanguinis quoque detractioni parcendum erit.

Initiò verò & purgans aliquod exhibendum, à bilioso

ioso nempe humore, acri-
 ac mordaci dysenteria ori-
 ginem habente. quod tale
 esse debet ut astrictionem
 post se relinquat, quale est
 habarbarum, & præcipue
 nonnihil tostum²⁹. torreri
 autem non eousque debet
 ut aliqua ejus pars adura-
 tur, sed ad ignem tantum-
 modo tantisper resiccand-
 um ut friabile reddatur,
 & facile in pulverem atteri
 queat.

Vtendum deinde astrin-
 gentibus & fluxum repri-
 mentibus³⁰, ut in dysente-
 ria cruenta. quibus tamen
 misceri refert lentam ha-
 bentia substantiam, qua &
 acrimonia humorum ob-
 tundi, & intestina obliniri
 queant. exempli gratia.
 acc. conf. rosarum rubr. &
 carnes jujubarum, & car-
 nes cydoneorum, aut po-
 tius gelatina eorundem. ijs-
 que admisceantur troch.
 de spodio. aut de berberis
 vel utrique, & alia astrin-
 gentia. ex quibus cum syr.
 myrtino, vel de rosis aridis

*29. Potius resiccari de-
 bet, ut aliquid purga-
 tricis facultatis pereat.
 Rondeletius torreri ve-
 tat. intelligit autem, ne
 aduratur. Massaria nun-
 quam, & nusquam med.
 danda putat, quæ quo-
 modocunque possint al-
 rum ducere.*

*30. Quod faciunt, va-
 sa per quæ mittuntur
 humores ad Intestina
 coarctando; & Partem
 ad quam feruntur, Inte-
 stina nempe, corrobo-
 rando.*

fiat conditum. Sic & pulvis trochif. vel aliorum astringentium exhiberi potest cum syr. de jujubis, aut cum decocto rad. althææ, aut sem. malvæ. Possunt & decoqui rad. tormentillæ, bistortæ, & alia astringentia. additis rad. althææ, vel consolidæ majoris cū aqua simpl. aut quod melius, cum aqua in qua ferrum candens sæpius extinctum. atque hujuscemodi decoctum condiri potest cinnamomo, & addita glychyrida, vel uvis passis dulcius reddi, ut palato sit gratius.

Enemata,

31. Quia enemata inferioriorem Coli partem; aut saltem Colum rarissimè transcendunt.

Exhibenda verò non modo talia sunt, sed enemata injicienda ex hujuscemodi med. composita; quorum præcipuè usus requiritur quando magna & inferiora ³¹ intestina exulcerata sunt. quum enim assumpta eo pervenire nequeant nisi multū permutata, per enemata ipsis magis venit succurrendum, quam per assumpta; quæ tamen negligi non debent. Tenuibus intestinis

testinis quæ assumuntur plus profunt: minus utilitatis enemata conferunt. Gal. 6. de loc. aff. Enemata autem initio refert esse abstergentia³², ut ex decocto hordei non purgati addito melle refac. & nonnihil sacchari rubri, & uno aut altero ovi luteo, ad doloris lenitionem. Post hujusmodi enemata, injicienda alia astringendi vim habentia ac simul intestina oblinentia, & dolores³³ lenientia: qualia componuntur ex ptisanæ³⁴, tapsi barbati, plantag. rosarum rubrarum, balauftiorum, calicum glandium, sem. myrti, & similium decocto; addito sem. cydoneorum, aut sem. malvæ, lentorem ipsis communicante. deinde & sem.³⁵ lini urgente dolore: nam & ad dolores mitigandos istud plurimum, teste Aëtio, confert. adduntur ovi lutea, eadem de causa. ad hujusmodi decocti ¶ 1. adduntur syr. myrtini, vel de rosis aridis,

32. Ne acres & corrupti humores, per subsequente adstringentium usum retenti, majorem erosionem faciant.

33. Qui instar cucurbitæ ad locum affectum aliquin trahunt humores magis fluxiles, quales præsertim biliosi.

34. Qui resiccandi vim habet, & dolorem sedare potest.

35. Quod expertum se feliciter R. Dodon. testabatur.

36. *Vox ne Italarum, sed peregrina potius videtur. expertam interpretantur. satis adstringens est.*

37. *Quia diu retineri non solent quamdiu malum non remittit.*

Lect. 97. Aprilis 27.

Vicius ratio.

aut de jujubis ad intestina oblinenda § 2. & si opus est majore astringitione additur & ³⁶ michletæ Nicol. plus minus § 1. vel aliud simile. quandoque verò & bolus armenus lotus in aqua plantaginis. Olea autem, vel alia pingua consultò omittuntur. quia ulcera reddunt sordidiora, & intestina humectant, quæ fieri non expedit. Reiteranda autem sæpius ³⁷ hujusmodi sunt enemata, & diutinè retinēda, quo enim diutius retinentur, hoc plus utilitatis ab ijs laborans consequitur.

Vicius ratio in dysenteria à bilioso humore talis esse debet, ut bilis acrimonia retundatur & alvus simul astringatur. Ptisanæ cremor, vulgò hordeatum vocant, cōmendatur, præsertim aliquot amygdalis dulcibus una admixtis. Cōveniunt cydonea quovis modo appatata, & pira cocta, tum quæ ex fructibus astringentibus componuntur.

tur. Carnium usus non ad-
modum³⁸ utilis est. in lon-
giori tamen morbo dandæ
sunt caponum, aut³⁹ perdi-
cum carnes cum amygda-
lis dulcibus contusæ. & cum
aqua chalibeata decoctæ,
addita etiam ptisana. Dan-
dus autem cibus non mul-
tus est una vice, sed potius
sæpius offerendus. Lauda-
tur & ab Aëtio ac Alexan-
dro⁴⁰ lactis usus post 3.
aut 4. priores dies, si febris
permittat; cui utile fuerit
aliquid sacchari, & aquæ
chalibeatæ admiscere. Sic
& ex lacte cum oryza, pa-
nico, milio, amylo, aut
etiam cum pane puro pul-
tes factæ utiles habentur.
Potus sit ptisanæ decoctum
additis passulis & conserva
rosarum rubrarum, aut ali-
quo alio astringente. Vi-
num non dandum, nisi te-
nue⁴¹ & multa aqua, cha-
biata potius quam alia, di-
lutum. In quiete æger con-
tinendus. Corporis enim
exercitium & qualiscunque
motus, exulcerationes ex-

38. Ne febrem augeant,
auctis humoribus putre-
dini obnoxijis.

39. Quæ reliquis siccio-
res existunt.

40. Quod acrimoniam
humorum obtundat, in-
testina muniat, ac non-
nihil roboret.

Potus.

41. Ob febrem quæ ple-
rumque conjungitur.

asperat, & humores reddit acriores. Somnus omnino admittendus, & si non succedat, etiam provocandus: nam ut Aëtius ait, optimum dysentericis somnus est remedium.

42. *Intestinorum enim veluti cancerosam exulcerationem conjunctam habere solet.*

Quod si verò dysenteria ab atra bile inceperit, tamen si talē Hipp. lethalem⁴² affirmet 24. aph. 4. nihilominus tamen huic quoque occurrendum est; & ijsdem quidem medicamentis, tum & simili victus ratione, quibus dysenteriae à flava bile.

illa.

Differt autem hæc non parum ab illa dysenteria, quam lienosis supervenire bonum judicavit Hipp. 48. aph. 6. talis enim non ab atra bile per adustionem genita, sed à melancholico succo originem sumit, à quo se lien exonerat. Nec hanc dysenteriam mox lethalem esse pronuntiavit; sed postquam longiori ac diuturniori factæ hydrops successerit, aut lienteria: tum demum laborantem mori scripsit.

Huic

Huic autem primo tempore non esse occurrēdum

⁴³ satis ab Hipp. monemur, sed hydrope, aut lienteria succedente; remedia haud dubiè talia adhibenda, qualia affectus qui successit requirit.

Ab humore autem pituitoso contingit & dysenteriam, licet rarius, excitari, nam & falsa mordax & corrupta pituita intestina vellicare, atque exulcerare potest. Comitantur quandoq; flatuum multitudo, & procedente tempore etiam crassa non rarò pituita simul cum sanguinis grumis descendit. Initio expurgari etiam ventrem in hac cōvenit. Rhabarb. tostum, licet præcipuè cholagogum, tamen & in hoc affectu utile est: nam intestinis & proximis venis inhærentia, qualiacunq; ea sint, educit. Post purgationem uno aut altero die ⁴⁴ theriaces ʒ β. aut ʒ 2. dedisse cum aqua tormentillæ & ʒ β. syr. de limonibus, non

43. Motus enim Naturæ, quo peccans humor à nobiliori ad minùs nobilem partem expellitur, nequaquam à ministro Naturæ medico imped-

^{Dysenteria.} diēdus est. Quædam fit soluto morbo aliquo, quam curare non oportet, ne majus aliquod malum retento humore fiat. Autor libri qui Medicus inscribitur ex Hyppocr. sentētia, cap. de humoribus.

44. Nam dolores sedat, cruditates minuit, & fluxus omnes moderatur, ac minuit.

parum profuerit. Reliqua med. non refrigerantia sed calidiora, nec fortiter astringentia esse refert. Aromaticum rosatum, diagalanga & similes compos. conveniunt; cū quibus non nihil conserva rosarū rubr. admisceri poterit, addito syr. myrtino, vel de rosis aridis. Vtile & in hoc affectu diacydonion cum speciebus, vel illud Gal. de quo prius dictum. & maximè morbo jam inveterato. Enemata in hoc fluxu parū profunt, & minimè conducunt astringentia. subinde verò etiam nocent, dum crudos humores retineri efficiunt, & flatus remorantur. Victus ratio temperata esse debet. lac ex amygdalis dulc. convenit. ex lacte pultes antè dictæ etiam utiles sunt, & carnes pullorum gallinaceorū, ac perdicum assæ, vel cum amygdalis contusæ. Potus sit decoctum sem. anisi cum cinnamomo & cons. rosar. rubr. aut vinum tenue decocto sem.

sem. anisi dilutum. Ventrem ung. aut ol.⁴⁵ astringente inugi non admodum prodest. Fomenta erunt potius adhibenda ex absinthio, rosis rubr. florib. chamæmeli in sacculo confutis: qualia, præter quod concoctionem adjuvant, flatus etiam discutunt & dolores leniunt.

45. Propter rationem jam de Clysteribus attam.

Quando vehemens med.

Lea. 98. Maij. 7.

purgans veluti scammonium, aut colocynthis dysenteriae causa fuerit,⁴⁶ theriacales usus imprimis utilis est. Si verò nec sic fluxus cesset; offerenda sunt, quæ singulorū sunt, remedia, veluti contra noxā à scammonio danda sunt lentam sive lubricam habentia substantiam: ut sunt mucago sem. cytoneorū, aut sem. psyllij, aut sem. malvæ, vel etiā rad. altheæ, & caro prunorum aut jujubarum. quorum uni aut pluribus cum mastiche, vel caro cydoneorum admiscenda. atq; sic exhibenda, & quidē sæpius, donec fluxus cessarit. Vnctio verò

46. Non solum quod quatenus Narcoticoam ex opio vim habet, omnes actiones in excessu peccantes inhibeat; quodque contrarium humoribus motum, à centro nimirum ad circumferentiam inducat; sed potissimum quod quatenus Antidotum est, Purgantib. validiorib. quæ proprie Pharmaca dicuntur & ad venenorum naturā aliquatenus accedunt, adversetur, eorumque Alexipharmacum sit. Vide Gal. 12. Meth. c. 7.

47. Adeo ut historicus
de dysenteria Leonis
Cæsaris, qua in tantam
extenuatio-

nem devene-

Prognosis.

rat ut corpus ejus unde-
quaque lumen transmit-
teret, dicat; Η' λεγέ-
το πάλιν ὅτι τὴν Ιάτρει-
κὴν τέχνην ἐν κινδύνοις
ἀπεικλον ὑπάρχειν Ca-
dren. Debuisset dicere;
In quibusdam periculis
Medicinam nihil posse.

48. Quando putredinis
humorum gradus valdè
intensus. Talis sæpè in
castris uno in loco diu-
tius hærentibus, grassa-
ri solet. Plato Theate-
tum Corintho ex ca-
stris Athenas ob dysen-
teriam & vulnere re-
versum narrat.

ventris cum oleo mastichi-
no etiā conducit, aut ex cy-
doneis coctis catapl. cum
oleo mastichino. Sic & no-
xa à colocyntide, corrigi-
tur aqua mulsa, uvarū pas-
sarū decocto & ol. amygd.
dulcium, ut refert Mezues.

Prodest & lactis tepentis
potio. quod dolores lenit
& intestina abrafa curat.

Omnis autem dysenteria
gravis ac difficilis 47 est
morbis, & frequenter 48 con-
tagiosus. quæ si ab atra bile
inceperit, deterior est, & ut
Hipp. ait lethalis 24. aph. 4.
nam ab atra bile ulcera
omnia incurabilia habentur.
veluti cancer ulceratus,
qui ullo remedio nunquam
curari potuit. Lethale au-
tem & in dysenteria ab
Hipp. judicatur, si cum ex-
crementis veluti carunculæ
exeant. 26. aph. 4. carun-
culæ verò Hipp. dicuntur,
majusculæ partes interio-
ris tunicæ intestinorum. ta-
les si cum excrementis per-
misceantur, magnitudinem
& profunditatem ulcerum
osten-

ostendunt: qualia carne iterum impleri ac cicatrice obduci posse, pro impossibili habetur; ⁴⁹ atque idcirco dysenteria, per quam tales excernuntur, exitialis judicatur.

Malum quoque in dysenterijs longis cibi fastidium esse Hipp. affirmat. aph. 3. lib. 6. & cum febris pejus. Quando videlicet is, qui diu dysenteria laboraverit & antea mediocriter cibum appetiverit ac sumpserit, postea eundem fastidit. Signum est enim, vel pravorum humores ventriculo ac obstitio ejus communicari; vel per consensum ipsis laborantibus appetentiam perire, quæ ad vitam est necessaria. Si verò & febris accesserit, quæ antea non affuerat, aut si, quæ exigua fuit, intendatur, ostendit vel putredinem circa ulcerem majorem factam, vel inflammationem aliquam effluviu dignam supervenisse: quorum utrumque etiam pejus. Quamobrem si ad

⁴⁹. Aretæus quidem inferioris intestini (Colon credo intelligit) internam tunicam connexionem solutam, foras exire; reliquam cicatrice solidari, ac hominem id passum sine noxa vivere posse credidit. l. 4. c. 5. Gal. itidem id factum sæpè se vidisse testatur, ac nihilominus superstites ægros fuisse, 4. de usu part. c. 17. sed quum in exitialibus dysenterijs id fieri dicat, 5. de usu part. c. 12. ad tempus tantum ea, quæ relicta superest, ægros sustentari, sentiri videri potest.

cibi fastidium etiam febris
accefferit; salus omnino est
desperata. Vires enim cor-
poris dissolvuntur, & tan-
dem superveniente sudore
frigido ægri moriuntur.
Quando autem dysenteria
furori ac mania supervenit
bonum esse Hipp. ait 5.
aph. 7. per humorum enim
transmutationem, & à ce-
rebro ad intestina transla-
tionem, expectanda mentis
sanitas & furoris solutio:
non tamen omnimoda sa-
nitas: nam & dysenteria,
si diutius perseveraverit,
etiam in periculum ægrum
adducit.

Solvitur autem illa po-
tissimum mania, quæ pri-
maria ac propria affectio-
ne cerebro laborante, ex
biliosis humoribus eo per-
latis nascitur. non illa, quæ
per consensum fit: qualis in
febris ac morbis acutis
subinde accidit. Lienosis
& dysenteriam supervenire
idem affirmat bonum esse.
de quo jam ante, ubi de dia-
rhœa à liene, latius dictum.

De

De Tenesmo.

Le&.99. Maij 8.

Tenesmus est frequens
desidendi cupiditas ad
quem pauca muccosa, raro
cruenta, vel nulla sequun-
tur excrementa². Sympto-
ma est recti intestini, quod
dysenteriam sæpenumerò
comitatur, & sæpius eam
quæ à biliosis ac acribus
& mordacibus humoribus
oritur. tunc enim biliosi
humores vel seorsum, vel
cum excrementis ad inte-
stinum rectum delati il-
lud irritant, & cupiditatem
excernendi irritant, hæren-
tiumque illic excremento-
rum opinionem, & ea deji-
ciendi desiderium movent.
à quibus humoribus &
quandoque rectum intesti-
num exulcerari contingit,
sed tamen rarius. & tunc
propriè Tenesmus dicitur.

Contingit verò Tenes-
mus fieri propter recti in-
testini inflammationem⁴,
veluti quandoque internè
hæmorrhoides vehemen-
tius dolentes inflamman-

1. Παρὰ τὸ τεῖνεσθαι το-
μόριον, ὁπέπονθεν, καὶ
πρὸς ἐκκρίσιν βιά-
ζεσθαι. Hincolim βιάσ-
μὸς dicebatur.

2. Quidam in hoc lapi-
des excrevere; quod ta-
men non vidi. Gal. 6. de
loc. affect. c. 2.

3. Affine enim malum
est. Nicandri comment.
Sæpè etiam præcedit.

4. Tali Tenesmi specie
T. Pompon. Atticū cor-
reptum vitam inedia fi-
nirisse, Nepos refert,
quum prius per lumbos
fistula puris erupisset.
In vita Attici. Lumbos
causa, autē honestè pro-
cat partem quæ
circa intestinū directum
est. Paulus hanc in-
flammationem œdema-
tosam esse scribit.

H h

5. *Pondere enim, & aliquando etiam asperitate Sphincterem vesicæ quidem immediatè, Recti verò intestini mediatè, per illum scilicet, irritando, frequentem desurgendi cupiditatē excitat.*

6. *Quod à Græcis non annotatum, usus tamen ostendit, & Avicenna quoque recensuit.*

tur. tunc enim assiduum desiderandi etiam adest desiderium, de quo latius suo loco. Sed & duris excrementis, quæ σκύβαλα dicuntur, in intestino recto habentibus desiderandi cupiditas & inanis quidam conatus succedit. Calculo etiam magno in vesica existentibus frequenter etiam tenesmus

comitatur, cui non est remedium nisi calculo exciso.

Tenesmus igitur qui cum dysenteria molestus est, absque exulceratione intestini fiat, calidis lenitur fomentis: & citius siccis, quam humidis. Intestinum enim rectum quum substantiam habeat membranofam, & mucoso humore imbuitur, calido & sicco fovetur, gaudet. Fomenta ista fieri possunt ex furfuribus, floribus chamæmeli, milio, aut simili aliquo calfactis, & in oblongo tenuique sacculo impositis, ac ano admotis. Sic & asseres calidi, vel bacilli calentes ex foco sumpti panno aliquo involuti pro-

profunt. Potest & tegulæ,
aut ferro, aut lapidi ignitis
vinum inspergi, vel solum,
vel cum aceto mixtum,
ejusque fumus calens reci-
pi. Fomenta verò etiam
ex flor. chamam. meliloti,
anethi, sem. ammios, aut cu-
mini in aqua aut vino de-
coctis, subinde conducunt:
potissimum quando flatus
simul molesti sunt. Com-
mēdantur & exiguæ glan-
des, licinia vulgò appel-
lant ex licio, thure, ladano,
& alijs astringentibus ad-
dito opio, si dolor vehe-
mens, & croco opij corre-
ctorio. sed ab his abstinē-
dum quamdiu licij loco
Officinæ succo periclymi-
ni & perperam utuntur, sed
quando pro licio, vel ma-
tiche, vel hypocystis vel
aliud astringens sumitur;
utilis erit hujusmodi glan-
dium usus.

Ab exulceratione si tenes-
mus fiat, eadē sunt rem. ad-
hibēda, quæ adversus inte-
stinorum exulcerationem.
Si ab excrementis duris,

7. *Alias enim omittere
Narcotica satius erit,
ne Sphincteris Paraly-
sin faciant.*

8. *Vehementer enim ca-
lidus & incidens est:
ideoq; irritando sphin-
cterem, malum auget.*

erunt hæc humectantibus
& mollientibus enemata
mollienda, ut ex decocto
malvæ, bis malvæ, flor. chlo-
mæmeli, cum ol. amygd.
dulcium, vel viol. vel chlo-
mæmelino. Quod si verò in-
adèd dura fuerint ut fistula
clysteris nequeat imponi
parandum erit ex supradictis
etis balneum, in quo æge-
tandiu sedere debet, donec
fæces emollescant. &
tunc neque sponte expun-
gentur, vel enema quale
prius dictum est, vel ol. viol.
vel amygd. dulc. per syrin-
gem injiciendum, aut le-
ve aliquod medicamentum
propinandum.

Prognosis.

9. Accedit quod expul-
sio fæcum alvi non so-
lum ope facultatis ex-
pultricis Intestinorum,
sed & actione musculo-
rum Abdominis pera-
gatur; quorum contra-
ctione fæcus itidem de-
pellitur.

Tenesmum autem gra-
vidæ superveniëntem abor-
tum facere Hipp. refert. 27.
aph. 7. Veluti enim recto
intestino inflammato vesi-
ca in viris, sic uterus in mu-
lieribus per consensum af-
ficitur. quapropter gravi-
ter affecto intestino recto,
& uterus propter propin-
quitatem simul laborat,
unde sequitur abortus.

De

De Purulento
Secessu.

Inter intestinorum symptomata, annumerari posse apparet & fluxus quosdam foetidos ac graecolētis puris; quod subinde bis vel ter per diem nullis excrementis permistum excernitur.

Præcedit hunc affectum in mesenterio inflammatio, qua in abscessum conversa tandem pus per venam aliquam proximam in cacacitatē intestini influit, ac inde foetidū excernitur.

Remedium huic malo secundum repertum, sed hoc vitio laborantes, quum reliquarum partium sanitate fruuntur, etiam multis annis superesse possunt.

vine mixti per alvum excrevit: subsequentibus nigris, & viridibus dejectionibus. quibus dolores nonnihil, minuantur. Dedimus rhabarb. & similia lenia purgantia. & post illa sine calore detergentia & leniter astringentia, ut decoctum hordei cum betonica, & glycyrriza, addito mel-rosac. Foris linimentum ex ol. rosac. & chamamel. cum auco cerato santalino. Convaluit.

1. Cujus unus meminit Fernellius παθολογ. l. 6. cap. 7. Apud Rhazin tamen ista reperiuntur: Rupto in corpore abscessu maturo sanguini mistum pus confertim prodit; si is in ventre, aut locis laxos rectosque meatus ad ventrem habentibus, fuerit. Sin minus, ut ex thorace, paulatim prodit. In divisionibus c. defluxu ventris.

2. Cui dolorem adesse quamvis Fernel. hoc neget, observavimus quandoque R. D.

3. Quidam diu de tensione sub liene ad umbilicum usque conquestus, & feбри laborans, post frigus extremorum puris libras octo san-

Leſt. 100. Maij II.

De Colico Dolore.

1. Seu plenioris Intestini, ex quo, & nomen habet, in ea maximè parte quæ cæca est.

2. Prout nempe humores pituitosi, atque hinc orti flatus, locum mutant.

3. Hinc illa ; πρεδὴ
 & πρεδὴ & c. πρεδὴ
 & πρεδὴ & c. In antho-
 logico epigramm. Quin
 & Urine aliquando re-
 tinentur; imò & ^{Causa.}
 evomuntur.

4. Tensione etiam à flatibus, qui ex talibus humoribus produci solent.

5. Ut limonibus, cucumeribus. ex quibus Tiberius in Colicâ incidit. Plin.
 26. c. 1.

6. Quod excretionem impediunt tam humorum, quam flatuum.

7. Ostendit hoc curatio; ut in illo nobis noto P. Sautxo qui colicam sibi familiarem haustu frigida curare solebat.

Colica, affectus est crassioris intestini, quocumque colon dicitur, cum torminibus & magno ventris dolore. qui frequenter non uno loco hæret, sed modo in una, modo in alia parte vehementior existit, accedente alvi tanta constipatione, ut neque excrementa excerni, nec flatus emit- ti queant: quem nausea, & sæpè vomitus comitantur.

Causa efficiens hujus doloris frequenter est crassus ac pituitosus humor lento re suo intestinis adhærens, & excedente frigore & dolore inferens. Quandoque cruda olera, aut fructus crudi & præcipuè astringentes: ut pira, corna, mespila, & similia, à quibus assumptis flatus gignuntur, qui quum exitum non habeant, molestiam ac dolorem inferunt. Sunt & quandoque calidi, acres & biliosi humores, vel inflammatio aliqua doloris colici causa

causa²: sed tamen raro.

Annumeratur & à nonnullis coli doloribus & is, quem fæces & excrementa supra tēpus, & præter consuetudinem diutius retenta faciunt.

Similis colico nephriticus in multis est dolor, sic ut difficulter ab eo dignosci queat: præsertim quando colicus dolor, uno loco hæret.

tunc enim non nisi post aliquot dies diffcremen observari potest; quando videlicet in urinis sabulosa, aut arenæ apparent, vel sanguinis grumi.

tunc demum enim manifestum fit dolorem esse nephriticum. sic & quando dolor non uno loco hæret, sed modo hanc, modo aliam partem ventris occupat, eum affectum esse manifestum fit. Ex frigidis humoribus dolorem tractum ostendet corporis temperamentum frigidius, sitis exigua, vomitus pituitosi, constitutio aëris frigida ac potissimum humida.

8. Vide Cels. 4. c. 13. & libr. qui Medic. inscribitur. c. de humoribus.

Non possunt autē, quum densæ substantiæ sint intestina, ab alijs quam tenuibus humoribus inflammari.

Signa.

9. Calculi descendunt quidem, sed non nisi secundum ductum Vreterum, ad alterum vero locum, vel sursum moveri non possunt.

& quæ præcesserunt ut vivendi
otiosa, satietas, repletio frigori
quens, ciborum potuum morborum
frigidorum & difficilis corporis
coctionis frequens usus
ventriculi cruditas. A re
center assumptis frigidis
contractum esse dolorem
ex relatione laborantis cogit
nosci potest. Ex calido
autem & bilioso humore
re, vel inflammatione factum
colici dolorem, habitus
universi corporis biliosus,
vita laboriosa, vomitus bilio-
sorum, multorum calidorum
usus, & ab his quod percipi-
tur nocumētum, demon-
strant. Quibus si febris
continua accesserit, inflam-
mationis suspicionē affert.

Curatio.

Ex pituitoso
humore.

Ægri tamen sæpe
admittere nolunt, uti
nec Plotinus Philosoph.
quamvis hunc affectum
sæpius pateretur. quod
senem talem curandi ra-
tionem haud decere ar-
bitraretur.

Curatio autem colicæ
ex frigido ac pituitoso hu-
more partim per vacua-
tionem, partim per ea fit
quæ excalfaciunt. Initio
enemata * injici convenit
ex bismalvæ, flor. chamo-
meli, centaurij minoris, pu-
legij, origani, ruthæ, & sem-
ammios, cumini, seselios
ac similium decocto. in cu-
jus

us \mathfrak{z} 1. dissolvendæ \mathfrak{z} 2. 10. In Hierarum & no-
 vel 3. ol. anethini, ol. sem. minibus, & descriptione
 ini, ol. liliorum, ol. chamæ- multum variant libri
 melini, vel etiam rutacei, si medicamentarij. Nos
 dolor vehemens. & adden- Pachij Antiochi audito-
 da \mathfrak{z} 1. diaphœn. elect. In- ris Philonidis Hieram
 di, bened. laxativæ, & non- hoc nomine intelligen-
 nihil hieræ picræ, aut hieræ dam credimus; qui non
 diacolocyntidos, quæ primus quidem hanc in-
 fortior, & nonnihil salis. venit (nam ante illum

Dolore nonnihil sedato, Archigenes, ac Ruffus
 & facibus aliquot expur- descripserant) sed pon-
 gatis, purgantia propinan- deribus, & quibusdam
 da: veluti unum aliquod ex simplicibus mutatis, usu
 supradictis elect. vel spe- illustravit. nulli autem
 cies diaturbith, vel pill. ag- se vivo compositionem
 gregativæ, aut similes, aut dedit, sed per libellum
 aliquod aliud med. quod ad Tiberium Cæsarem
 humores pituitosos educat. misit; qui publicis illam
 bibliothecis posuit. unde

Scribonius Largus ad manus suas pervenisse dicit. Ex-
 hiberi etiam intus potest à \mathfrak{z} ij. ad \mathfrak{z} v. quæ tamen dosis
 satis magna est. In clysteribus non facile peccatur in dosi
 purgantium Electuaria. Non est autem alius Pa-
 chius, alius Antiochus ut ex Aetio vides putasse Renod.
 Vixit ante Gal. atque Asclepiadem. nam Gal. Colicam
 Pachij Antiochi ex Asclepiade libro 9. de med. secund.
 loca, inseruit. Misisse autem ad Tiberium verisimile, quod
 illius principatu id malum irrepsisset, nec quisquam prior
 ipso Imperatore id sensisset. Plin. l. 26. cap. 1. De quo
 morbo & illud Suetonij capiendum, quod convulso latere
 in graviores illum morbum incidisse dicit.

H h 5

Ex calfacientibus con-
veniunt diagalanga, dia-
cyminum, dianifum, diaca-
lamentum, diaspoliticon,
theriaca, mithridatium, sic
& gingiber, piper, sem. ani-
fi, fefelios, ammios, cymini,
& alia ejus generis.

Venter verò ungendus
est ol. rutaceo. liliorum, aut
simili. quod si cum stillati-
tio vini liquore aqua vitæ
vulgò dicta, recoquantur
efficaciora redduntur.

Ab usu fri-
gidorum.

Similia remedia etiam
adhibenda sunt, quando
post frigidorum usum co-
licus dolor ex flatuum re-
tentione invasit: nisi quod
non adeò fortia debeant
esse remedia. quandoq; ex
supradictis elect. unum ali-
quod, ut diacyminum suffi-
cit. Si opus fuerit enemate,
quantitate purgantium im-
minuta addi ipsis convenit
aliquod elect. de baccis
lauri flatus discutiens.

Victus ratio in utroque
affectu cal. & sicca esse de-
bet. abstinendum ab om-
nibus frig. seu fructibus seu
oleri-

oleribus quibuscunq; . Op-
imum, ac generosissimum
vinum conducit.

Leſt. 101. Maij 12.

Ab inflammatio-
ne et acri ac bi-
lioso humore.

Si coli dolor ab inflam-
matione, aut acri materia
fiat ac biliosa; curatio supe-
riori contraria instituenda
est. Inflammatio sangui-
nis missionem requirit, quæ
facienda è communi vena
aut interna dextri brachij;
sed tamen non 11 copiosa.
Si soli biliosi humores ci-
tra inflammationem dolo-
rem excitaverint, à sangui-
nis missione erit abstinend-
um: reliqua remedia fri-
gida & humida esse con-
venit. Enemata erunt pa-
randa ex fol. malvæ, bis-
malvæ, mercurialis, betæ,
violaria, lactucæ & simi-
lium: cum quibus & surfu-
res abstersionis causa ad-
misceri possunt: & sem. lini
aut malvæ ad dolorem se-
dandum. ad hujuscemodi
decocti 1. addendæ 3. 2.
vel 3. ol. violacei, aut rosa-
cei, vel utriusque: ovi lutea
2. aut 3. sacchari rubri 3. 1.
aut 2. diacathol, vel similis

11. Quia Intestina ve-
nas suas ex Porta, non
ex Cava, cujus rami se-
cantur, habent.

12. *Nostrum enim quo
nescimur butyrum, cum
sale parari consuevit;
ut stimuli loco servire,
nec acrimonia, quum
pinguedine obtundatur,
lædare, possit.*

13. *Quod multò tutius.
nam mixta calida qua-
dam materia, quum re-
liquæ partes sunt frigi-
dæ, sæpe decipitur me-
dicus. à refrigeran-
tibus in dolore colico
semper abhorrendum: ac
ubi communia non pro-
ficiunt, balneorum usus
sæpe utilis.*

A retentis fecibus.

compos. lenitivæ $\frac{3}{4}$ β. aut
36. & nonnihil butyri vul-
garis loco salis. Purgan-
tia med. sint ex ijs quæ bi-
lem expurgant: ut infusum
rhabarbari cum syr. ex in-
fusione rosarum, aut cum
manna, vel diaprunum so-
lut. aut diacathol. cum de-
cocto cichorij, vel aliorum
refrigerantium. Ad ventris
inunctionem convenit ol.
rosaceum, vel butyrum lo-
tum, cui addi potest ol.
chamæmelinum ad dolo-
ris sedationem. Balnea in

13. hoc affectu conveniunt
ex decocto malvæ, bismal-
væ, violariæ, additis flori-
bus chamæmeli.

Victus ratio humida &
frigida esse debet. cremor
ptisanæ utilis est: & lactu-
ca sive cruda, sive cocta, &
alia ejus generis. Laudan-
tur & pedes & extremæ
partes vitulorum, ovium ac
similium. Potus ptisanæ de-
coctum, vel tenuissima ce-
revisia, vel aqua frigida, ijs
qui assuevêre.

*A retentis facibus si coli
dolor*

dolor fiat, injiciendum enema molliens ex decocto malvæ, bisinalvæ, flor. chamæmeli & furfurum, addito ol. amygd. dulcium, aut chamæmelino, velut in tensesmo à facibus retentis, & si opus fuerit balneis similibus utendum.

Vtile verò fuerit & his purgans aliquod medicamentum dare quale in colico dolore ex humore pituitoso.

Colicus dolor diuturnus, aut sæpius recurrens, non raro in paralyfin brachiorum & manuum terminatur: 14: consequitur non raro & crurum impotentia. de cujus curatione supra dictum est, ubi de paralyfi. Supervenit verò & quandoque colico dolori quando admodum vehemens, convulsio ac comitialis morbi accessio: & talis dolor gravis, & admodum periculosus. Sic & colicus dolor à biliosis humoribus factus, facile in dysenteriam commutatur: acris

14. Hipp. lib. de humor. in fine, & 6. epid. sect.

3. in articulare morbum terminari observavit. Rationem reddit Langius, quod nervi quidam à ventriculo ad

Prognosis. brachia ferantur: quæ

nulla. alij, quod feratur ad cerebrum humor (cerebrum autem intestinis συμπαχεῖν; indicat comitialis morbus à colica superveniens quandoq;) unde ad nervos brachiorum dilabitur. quod probabile aliquo modo.

Paulus per crisin fieri ait, post colicam à calidis humoribus; tum etiam epilepsiam, verum ego solum post colicam à frigida causa utrumq; affectum observavi R.D.

enim & biliosus ac mordax
 quum sit humor, intestinalis
 radit & exulcerat. quod
 aph. 23. lib. 7. testatur
 Hipp. A sincera, inquit, de
 jectione, dysenteria: sine
 ram siquidem dejectionem
 appellat, merè biliosam
 Exemplaria quædam ha
 bent additam dictionem,
 malum: sed Gaza, Leonice-
 nus, & Cornarius in sua
 versione non habent.

Lect. 102. Maii 28.

De Ileo.

1. Quod anfractus inte-
 stinorum εἰλκνται; vel
 quod flatus ἐν εἰλξεσι
 eorundem coarctentur
 sic dictus. Hinc & Vol-
 vulus appellatur. Bar-
 bari, qui Miserere mei
 &c. appellarunt, ad
 εἰλεῶν respexerunt.

2. Χορδαῖος, quum lo-
 cus circa umbilicū pro-
 minet, à Veteribus dici-
 tur. quod qui locum af-
 fectum tangit, quasi
 chordam tangat.

3. Quia quum intestina constringantur, nec excrementa,
 descendere queant, necessario sursum feruntur.

Ileos tenuioris intestini
 morbus est, acutissimos
 dolores ac gravissima ven-
 tris tormina invehens, præ-
 fertim circa umbilicum, ip-
 sius umbilici & vicinarum
 partium tumore: quando-
 que accedente. Adest alvi
 obstructio, & subinde tan-
 ta, ut etiam ab injecto cly-
 stere nihil subsequatur: co-
 mitatur verò & nonnun-
 quam: vomitus non modo

assum-

assumpti cibi, aut vitioso-
rum humorum, sed & mor-
bo in deterius abeunte,
ubinde ipsorum ventris
excrementorum.

4. *Ac tum duos dies
Hippocrati dicitur. 3.
prorhetic. comm. 66.
Gal.*

Causa doloris ilei, tanta

Causæ,

est intestinorum obstru-
ctio ut deorsum excremen-
torum descensum impe-
liat. Obstruuntur autem
intestina vel à crassis ac
viscidis humoribus: vel à
tuberculo aliquo, veluti in-
flammatione: quandoque
verò etiam à fecibus alvi
induratis, & alicubi in in-
testinorum revolutionibus
compacti: veluti propter ra-
dicem, quando intestina
extra locum suum delapsa
sunt, atque in ijs dura ex-
crementa hærent. Adju-
vat ad has causas non pa-
rum intemperies frigida, &
similiter frigidorum usus,
intestina coarctans atque
constringens.

5. *Quam ad gangrenam
vergentem aliquando vi-
dimus. Vide Archige-
nem apud Aëtium. qui
tale quid etiam vidit.
Inflammationis autem
causa quandoque existit
Intestinorum violenta
nimis tentata, aut etiam
facta repositio.*

6. *Vide Hippocr. 3. de
dieta circa finem.*

7. *Non facit per se, sed
si causa ilei adsit eam ju-
vat. sic etiam vinum fri-
gidum lædit.*

Curatio.

I. Ex inflam-
matione.

Inflammationem autem
vennium intestinorum co-
arctatur non modo calor
circa umbilici partes, sed
et febris continua.

8. *Vel etiam in talo, aut poplite, inquit Trall. Poplitæam tamen secare nunc in usu non est.*

9. *Ne feces duriores comprimendo locum inflammatū, dolorem augeant. Præbent autem Enemata alium etiam usum; fomenti nimirum calorē Phlegmones temperantis, dolorem mitigantis, & leniter discutientis &c.*

10. *Diu enim locum affectum contingere non possunt.*

Hac præsentē, à venæ internæ dextri^æ brachij sectione curatio auspicanda. Deinde exhibenda & ad movenda, quæ inflammationem sedare, dolorem mitigare, & alvum⁹ lubricum reddere queunt: ut sunt enemata ex malva, bisulca malva, mercuriali, folij betæ & violarum, additis exiguo flor. chamæmeli, & fursurum, in quorum decocti^o 1. addendæ 3 2. vel 3 oleorum: partim humectantium ut amygd. dulc. sesamini, vel horum loco butyri: partim refrigerantium ut ol. violarum: & dissolvenda 3 1. medullæ cassiæ fistulæ, aut tantumdem el. lenitivi, aut diacathol. ovorumque lutea duo aut tria & leniendi doloris & lubricandi intestinorum causa. & talia quidem enemata non semel, sed sæpius¹⁰ erunt injicienda. Exhiberi verò & convenit lenientia, ac refrigerantia med. qualia in coli inflammatione. Similis quoque

que victus ratio obser-
vanda.

I I. Ex crassis
humoribus.

Quod si autem à crassis
ac viscidis humoribus ilei
dolor originem habuerit,
cujus testimonium dare
potest febris vel nulla vel
intermittēs, enemata etiam
conducunt, sed fortiora :
& talia, qualia in colico
doloze à frigidis humori-
bus. Plus autem confe-
runt medicamenta assum-
pta: ut diaphœnicon, elect.
indum, vel tale aliquod, vel
pill. aggregat. aut de 8. re-
bus, sed potissimum pillulæ
iliacæ 13 à Rhazi. 9. ad Al-
manz. descriptæ: quæ acu-
tissimos atque gravissimos
ilei ex crassis viscidisq; hu-
moribus dolores una, aut
altera assumptione curant,
bona observata victus ra-
tione: quæ talis esse debet
ut alvus reddatur facilis. ad
quod faciunt humida ali-
menta, ut jura gallorum,
scapponum, & aliarum car-
nium præsertim musculo-
farum; quæ intestina & lu-
brica reddunt & dolores

II. Ileus enim nihil
aliud quam doloris Co-
lici intensio Tralliano
videtur. loco enim, non
causâ differt hæc Ilei
species à Colica dia-
thesi.

12. Quia superiora affi-
ciuntur Intestina, Ileum
nempe potissimum.

13. Descriptio talis est.
℞. Colocyntid. sagape-
ni, ana ʒ x. scammonij
ʒ iiij. ʒ j. f. catopotia.
Dantur obuli. v. seu au-
reus β. Raz. 9. ad Al-
manz. c. 71.

14. *Quæ simul incidere,
& concoctionem humo-
rum istorum promovere,
& discutere possint: nam
quæ potenter calfa-
ciunt, nec simul etiã dis-
cutiunt, sæpe dolorem
augere solent. Gal. 12.
Meth. med. c. 8.*

leniunt. Ab omnibus non
modo potentia, sed & actu
frigidis abstinendum.

Et si quando manifesta
frig. crassorumque humo-
rum adsint signa; uti etiam
licebit aromatis, alijsq; cal-
facientibus ¹⁴ uti in colico
dolore ex causa frigida.

Contingit autem frequen-
ter ut humores crassi visci-
dique, ilei dolorem facien-
tes, non sint frigidi; sed ad-
bilis crassæ ac vehemen-
tius tostæ, quam Vitellinam
appellant, accedant natu-
ram: qui ubi in ileo impa-
cti sunt magnos quoq; do-
lores inferunt, & compu-
trescentes febrem excitant
tertio die recurrentem. sunt
autem tales humores non
modo crassi ac viscidi, sed
& foetidi admodum ac
graveolentes. Apparenti-
bus igitur talibus excre-
mentis una cum febris ter-
tiana, abstinendum erit ab
omnibus calfaciētibus po-
tenter, & utendum alvum
lubricantibus, & dolorem
sedantibus supra dictis.

Quando

Lect. 103. Maii 29.

III. A fæcibus induratis, et prolapsu Intestini.

Quando autem propter ramicē ilei sit dolor, quum videlicet intestinorum aliquod vel in scrotum est delapsū, vel alicubi extra peritonæum excidit, & repletum sit induratis fæcibus ¹⁵ sic ut introrsum & in suum locum reponi nequeat; enemata indere convenit mollientia, ut ex decocto carniū, aut ficuum, fol. bismalvæ, flor. chamæmeli, meliloti, & furfurum: cui addenda sunt alvum lenientia prius dicta, & ol. amygd. dulc. cum ol. ¹⁶ sem. lini, ut videlicet fæces emollescant: quibus remollitis (si non succedant) glans supponi potest, quæ ipsas extrahat atque educat: ut ex speciebus hieræ picræ, vel potius hieræ Logadij, aut similis, aut fortior clyster, priori tamen educto ¹⁷, injiciendus erit. Balnea vero, vel illorum loco fomenta adhiberi etiam poterunt, veluti in colico dolore à retentis fæcibus.

¹⁵. Retinentur autem potissimū quando Ruptura magna est, sed quæ Intestinū coarctet, tumque fæces paulatim exsuccæ sunt & indurantur.

¹⁶. Quod in hoc casu singulare, nam & molles fæces, & vias aperit.

¹⁷. Nam si prius injiciatur, metus erit ne prius, succedente posteriore, ad stomachum propulsum evomatur. In alijs tamen morbis si 24. horis non egerit, spes est esse distributum enema, & ita aliud injici potest.

18. Non enim hic afficitur tenue intestinum. illa enim vix ex loco suo excidunt: sed propter similitudine tantummodo symptomatum ileos dicitur hic Affectus. ideoque imaginem Ilei quidam vocant.

19. Propter retentionem Excrementorum, accedentem febrem & dolorem intensissimū. Multi subito moriuntur, in illa quæ ex Inflammatione fit; quidam etiam ^{Prognosis.} intra tertiam, aut quartam horam, ut Archigen. apud Aët. scribit.

20. Præsertim si febris & singultus jam oborta, viresq; debiles sint: repositis enim intestinis, intra 6. vel 8. horas moriuntur.

Intestinis autem à fæcibus expurgatis, laborandum est ut introrsum repellantur, & in locum suum restituantur. Medicamenta purgantia ¹⁸ per os exhibere parum cōducit, subinde etiam nocet: propellunt enim excrementa deorsum, atque in intestinum, quod à loco suo excidit, impellunt, quod deinde magis repletum difficilius introrsum imponitur, atque in suum locum reducitur. Abstinendum verò & in hoc ilei dolore ab omnium frigidorum usu: & victus ratio talis esse debet, ut alvus reddatur liquida ac facilis.

Acutus autem morbus ¹⁹ ileos est ac periculosus. Gravissimus verò etiam qui propter ramicem ²⁰, & in intestinis duriores fæces hærentes accidit. Hippocr. autem in ileo vomitum, vel singultum, vel desipientiam malum esse tradit, vel convulsionem. aph. 10. lib. 7. Vomitus siquidem in ileo non

non semper adest: frequen-
tius in colicis accidit dolo-
ribus. in ileo autem si acces-
serit, malus est: quia ferè
vix alios quam exitiales do-
lores comitatur, ut Galen.
testatur. Non omnis autem
vomitus æquè malus est:
nam eorum, quæ assumpta
sunt, vomitio minus mala:
Humorum verò corrupto-
rum & foetidorum, alvique
excrementorū maximè le-
thalis est: sic ut teste Gal. 6.
de loc. aff. à tali ilei affectu
vix unquam potuerit ali-
quis sanus evadere. De-
speratus etiam affectus est,
quando singultus superve-
nit: accidit verò propter
vitiosos ac mordaces hu-
mores, qui ab intestinis te-
nuioribus ad ostiolum ven-
triculi regurgitant, atque
ipsum irritant: omnia enim
acria, corrupta, ac foetida
ventriculo inprimis mole-
sta sunt. Fieri verò & sin-
gultus potest propter exce-
dentem, & nimiam vom-
itionem. Sive autem ab hac,
sive ab illa causa fiat, ma-

21. Magna enim similitudo substantiæ intesti-
norum & nervorū, præ-
sertim tenuium, quod in
testudinum nervis appa-
ret.

22. Si ex vermibus do-
lorem, ileum appellat,
quod quidam faciunt,
verum dicit: alioqui
pueri non sunt obnoxij
facile ileo.

lus est: præsertim si vire
sint imbecilles. Mala ve-
rò & desipientia in ilei do-
lore: fit enim quia maligni
vapores, vel etiam humo-
res ad cerebrum perferan-
tur: aut propter oris ven-
triculi affectum, cui cere-
brum consentit. Sic & con-
vulsio valde lethalis habe-
tur, quæ supervenit non
modo compatiēte cere-
bro, sed & nervoso gene-
re. In Coacis verò etiam
surditatem supervenientem
ileosis, malum esse scribit.
ostendit enim & hæc, quod
mali ac vitiosi humores ad
cerebrum perferantur. Aë-
tius ilei dolorem²² familia-
rem ait puerili ætati, & be-
nèficio naturalis humidita-
tis hos evadere: senibus
verò minus esse familia-
rem, eosque si in hunc inci-
dant rarò convalescere. In
Coacis autem ileos inter
morbos numeratur, qui
ante pubertatem non fiunt:
sed ab anno 14. ad 42. su-
perveniunt: quo tempore
naturam omnium morbo-
rum

rum feracem esse Hippocr. ait.

De Vermibus.

Lect. 104. Inn. 4.

TRia vermium sunt genera¹. Quidam teretes ac oblongi instar terræ lumbricorum : alij lati & admodum prolixi : reliqui parvi qui ascarides dicuntur.

1. Sunt & alia vermium genera observata, sed quum omniū eadem ferè curatio sit, non sumus ea in re curiosi.

Oblongi in tenuibus intestinis, vel in monocolo generari existimantur : origo est ex crassis, pituitosis, putrescentibus humoribus, qui ex cibis corruptioni obnoxijis generari in intestinis cum excrementis hærent, & à valido calore naturali in lumbricos commutantur : frequentissimi isti

1. Teretes.

2. Vbi facile humores subsistunt : quia veluti sacculus est. In ventriculo autem non possunt gigni : quia tanta putredo magnum aliquod incommodum inferret. Dixit id Aristot. 1. de affectionibus mixtorū. Vide Scalig. qui in ventriculo gigni posse existimat.

26. exercitat. contra Cardan. Autor libri de Cathartici Gal. adscripti omnes teretes in ventriculo gigni asserit. Paracels. hinc in Intestina descendere ait. Iucutanam lues 80. ante Hispanor. adventum annis invasit, in qua multi ingentem vermium vim evomerent ; quibusdam alvo perrosa foras proruperunt. In puerulo per umbilicum vermen prorupisse novimus, qui tamen convaluit.

3. De tineis, lumbricisque accepimus, inquit Plin. inesse Ægypti, Arabiæ, Syriæ, Ciliciæ populis. è diverso Thraciæ (sic enim ex Theoph. legendum) Phrygiæque omnino non nasci. Minus id mirū, quam quod in confinio Atticæ, Beotiæq; Thebanis innascantur, quum absint Atheniensibus, lib. 27. cap. ult.

4. Sunt nonnulli qui dulcia primū exhibent. & nonnunquam turgidi excernuntur à vino cretico seu malvatico, & ab uvis passis: legitima tamen ea curatio non est. Vide Lemnium de natura, l. 1. c. 21.

in corporibus puerorum gignuntur, rarò in aliorum qui maiorem ætatem habent. 3. Signa istorum vermium non admodum certa, sunt: alijs enim alia ac diversa symptomata superveniunt: quibusdam nauusea adest ac cibi fastidium, alijs appetentia inordinata, & modum excedens: dolor, veluti à morfu nonnullis circa ventriculum, alijs circa umbilicum punctorij dolores: singultus quandoq; accedit, non rarò & febres adsunt erroneæ: in somno tremor aliquando accidit, maximè pueris in quibus pruritus narium & malarum, sive genarum pars sub oculis livens vermium in corpore latentium signum habebit.

Occidunt autem teretes vermes quæcunque amara sunt: ut abrotani, absinthij folia & semina, centaury minus, persicæ arboris folia, ruta, gentianæ & aristolochiæ radices, lupi-

ni, myrrha, semina s. santo-
linæ, tanaceti, & præcipue
sementinæ, quod vulgò se-
men contra lumbricos vo-
catur: aloë, colocynthis, &
cucurbita s. silvestris & si-
nilia amara. Sunt verò &
alia, quæ à tota substan-
tia vermibus resistunt: ut
cornu cervi, unicornu, la-
pis bezoar, bolus armenus,
semen oxalidis, semen co-
riandri, cytri, portulacæ, &
ipsa herba s. sic & coralli-
na s., & carduus benedi-
ctus, & agrostios radix: &
ex compositis theriaca &
mithridatium. Pleraq; ho-
rum teri & in pulveris for-
ma exhiberi possunt cum
in aqua cardui benedicti, aut
portulacæ, aut graminis;
addito etiam syr. de limo-
nibus vel de acetos. citri si
debilis adsit: nisi enim cali-
da, veluti sem. sementinæ,
vel absinthij aliquo refri-
gerante contemperentur, fe-
brem augent & calorem
eorum intendunt. Nec sa-
tis verò est vermes occi-
diffe, sed & si alvus per se li-

5. *Quæ quorundam cha-
mæcyparissus est.*

6. *Quæ Cucurbita Bar-
bara & Pyriformis ab
alijs appellatur.*

7. *Crudi utilitatem ma-
ximam expertus sum.
sin resiccare velimus,
torrendum est. hic cru-
dum magis convenit:
quia proprietas ustione
tollitur.*

8. *Propter salem quem
in se habet. nam si aquæ
calidæ immersa paulum
fuerit, tota albescet ve-
lut sale conspersa.*

9. *Quæ & muscus mari-
nus dicitur.*

10. *Alioquin in intestinis putrescentes graviora symptomata excitant.*

quida non fuerit supradictis admiscendum aliquicquid quod mortuos ¹⁰ vermes expellat: ad quod rhabarbarum additum conducit. Poterit itaque pulvis aliquicquid hunc in modum componi & sem. fement. vel alterius amaræ ꝓ 1. ramentorum cornu cervi, vel unicornu sem. citri, sem. oxalidis ana ꝓ 1. rhabarb. ꝓ 2. misce f. pulvis. cujus plus minus ꝓ 1. dari potest cum aliqua supradictarum aquarum. Poterit verò & talis aliquis pro ijs parari, qui ab amaris abhorrent. & ramentorum cornu cervi, aut corallinæ ꝓ 1. sem. coriandri & citri ana ꝓ ꝑ. rhabarb. ꝓ 1. detur pro vice: aucta etiam rhabarb. quantitate ubi vires robustiores & ætas major. Inter ea .a. quæ exhiberi possunt, utilissima quoque est aloë vel ex hac composita hiera picra: quæ non modo interficit vermes, sed & mortuos, subinde etiam vivos expellit, tum & subinde assumpta vermium generat.

generationi obsistit. Ex supra
 pra verò enumeratis sim-
 plicibus possunt & fo-
 menta, ol. unguenta & ca-
 tapl. fieri quæ umbilico &
 ventriculi regioni admo-
 na vermes interficiunt ac
 expellunt: sic absinthium
 cum aceto tostum pueris
 ubinde profruit: præfer-
 im addito ol. ex absinthio,
 aut rutaceo, aut ex amygd.
 maris: quale ol. etiam so-
 lum umbilico ventriculoq;
 lilitum, quandoq; confert.
 Qui ex hisce componere
 olet cataplasma, herbas,
 radices & semina ex supra-
 dictis quæ volet accipiat,
 & colocyntidos medullam:
 & hæc in aceto donec
 molluerint coquat: deinde
 otusis addat farinam lupi-
 norum, aloëm, myrrham,
 vel alicujus animalis veluti
 ovis aut ovis, & ol. absin-
 thij, rutæ, vel amygd. amar.
 quantum ad cataplasmatibus
 compositionem requiritur.
 Qui verò maluerit unguento
 ti, aceto ex decoctis her-
 bis reliquo, addet aloën,

11. Quia putredini &
 quæ illam procedit, cru-
 ditati resistit.

12. Rara enim & per-
 spirabilia sunt corpora
 puerorum. unde medi-
 camentorum, licet exte-
 rius adhibitorum, vis
 facilius penetrat.

myrrham, fel, oleum absinthij, rutæ, amygd. amar. & cera q. s. & tali unguento uti licebit, vel solo, vel cum theriaca permixto, atque sic emplastri modo umbilico imponi, vel absque theriaca umbilicum & ventriculi regionem isto inungere.

Lect. 105. Iunii 5.
II. Lati.

13. Intra hominem gignuntur tæniæ tricenum pedū aliquando & plurimum longitudine, Plin. l. 11. c. 13. Atqui Intestinorum omnium longitudo tanta non est. Sed respexit forte Plin. aut is ex quo hæc descripsit, ad longitudinem imaginatione compositam ex omnibus abruptis, & per intervalla prodeuntibus patribus; quæ duas, aut tres quandoque ulnas excedunt.

Causæ.

14. Vnde & Tæniarum nomen illis inditum.

15. Aëtius ex Herodoto, ni fallor. Serm. 9. c. 40.

Latus lumbricus non est tereti, aut terrestri lumbrico similis, sed est instar oblongæ, albidæ, tenuis, & angustæ fasciolæ: ¹⁴ qualis illa est, qua mulieres suas comas obvinciunt, qui intestinorum substantiæ secundum longitudinem sic adnascitur, ut existimetur à nonnullis ¹⁵ interior membrana intestinorum in talem lumbricum conversa, quod veritatem non habet: nam illæsis intestinis excidere potest.

Generatio hujus est ex crudis & admodum crassis pituitosis humoribus intestinis secundum longitudinem adhærescentibus. Hipp. connasci pueris existimat

timat & cum ipsis augeri,
atque pubertatis tempore,
ut serius intestino adæ-
quari, & quandoque lon-
giorem ac majorē factum
um stercore exire, atque
articulas ejus excidere
magnitudine seminis cu-
rbitæ, unde & cucurbi-
nus lumbricus dicitur.

Qui autem hunc lumbrici
um in corpore gestant ut
lurimum pallidi sunt, im-
becilles, & ad opera tardi:

Signa,

quandoque inordinata
quadam appetentia labo-
rant: nonnūquam cibum
contumeliant: sed tamen in-
certa hæc sunt signa. Cer-
tissima autem & minimè
fallacia indicia sunt lumbrici
ipsius particulæ semini
cucurbitæ similes, vel ma-
iores, cum excrementis
exsurgentes.

16. Propter frigidita-
tem humorum qui in
corpore existunt.

17. A cruditate humo-
rum os ventriculi obli-
ventium, & suctionis,
sensum impediendum.

Ad curationem horum
vermium requiruntur simi-
lia remedia, qualia ad supe-
riora: quæ tanto fortiora
esse debet, quo firmitus lum-
bricus isto intestinis adhæ-
sit: nec amara sufficit

Curatio,

18. *Dulcia med. non
conveniunt, ut est dia-
phœnicon.*

19. *Non febricitanti-
bus? febris tamen raro
adeſt, morbus enim ali-
quot annorum eſt. qua-
lis ſi febris conjungere-
tur, eſſe non poſſet.*

eſſe medicamenta, ſed ſi-
mul ſatis valenter purgan-
tia eſſe oportet, ut ſunt hie-
ra Logadij, aut hiera Ar-
chigenis, pill. aggregat.
pill. de nitro, & ſimiles quæ
colocynthidem admittunt.
Convenit quoque diatur-
bith, & elect. Indum¹⁸. Fo-
menta, unctiones, cataplaſ-
mata adverſus hos vermes
nihil conducunt. Lauda-
tur verò & ab Aëtio ac
Paulo compoſ. ex nitri, pi-
peris, & cardamomi parti-
bus æqualibus, cujus 3 i.
cum vino¹⁹ aut aqua exhi-
bita fertur conſeſtim lum-
bricos iſtos educere. Sig-
num curationis eſt, ſi ver-
mis rotundus & in pilæ
modum convolutus, excer-
nitur, ut Hippocr. ait. quan-
do enim partes ſolummo-
do, etiamſi duorum aut 3.
ſint digitorum, prodeunt,
reliquo intus manēte, non-
dum curatio perfecta: licet
niſi multo poſt tempore,
particulæ aliquæ excidant.
Viſtus ratio in hoc affectu
eſſe debet ad caliditatem
in-

inclinans : allium in cibo
commendatur : piper, &
alia aromata & sem. cymi-
ni ad ciborum condituram
conducunt. Fugienda quæ-
cunque facile corrumpun-
tur, ut cerasa, pruna, persi-
ca, armeniaca, & similes
fructus, tum & omnes
crudi. Legumina immatu-
ra, & quæcunq; frigidos
generant humores. qua-
lis etiam victus ratio con-
venit ijs, in quorum intesti-
nis teretes generantur ver-
mes.

Ascarides ²² exigui sunt
vermes, in crasso intestino
ab humore aliquo ibidem
putrescente, aut à stercore
illic retento geniti, qui
subinde cum alvi excre-
mentis exeunt, aut post il-
lorum exitum circa annum
hærent.

Adversus hos profunt &
amara quovis modo per
inferiores partes adhibita.
possunt fieri glandes ex
aloë, aut hiera picra cum
melle cocto, addito sale, ni-
tri, vel sale gemmæ. Con-

20. Poma, pira cocta
non adeò facilè cor-
rumpuntur, unde non
ita valde mala.

21. Theophrast. 4. de
stirpib. c. 17. testatur
ex leguminib. lupinos
ervum, cicer sola & ζωσ-

III. As- 22; propter
carides. acrimoniam
& amarorem. Athe-
næus l. 2.

22. Ab ἀσκαρίδω dedu-
ctum hoc nomē, vel pro-
pter mobilitatem isto-
rum, vel quod caseorum
vermiculis quodammo-
do similes, qui non tan-
tum agiliter moventur,
sed & saliant.

23. *Non opus clystere
quia una aut alia ꝯ re-
ctum intestinum imple-
tur. quod sufficit.*

Prognosis.

ducunt & lotiones ex decocto aristolochiæ, vel gentianæ, vel bryoniæ, & absinthij, centaurei, rutæ ac lupinorum: ex quo decocto aliquid etiam cum syr-
syringa in anum injici potest: addito, si placet, ol. absinthij, aut rutaceo. Cum quibus ol. & anum inungitur etiam expediens est.

Teretes autem lumbrici in acuti morbi principio excerni, malum est: non enim à forti ac vincente natura, sed à vi morbi & causa ejus perniciofa expelluntur: nam ut Gal. lib. 4. comment. aph. 24. Quando aliquid initio morbi excernitur, id propter dispositionem in corpore præter naturam contingit: quo tempore natura à causis morbum efficientibus gravatur. atque idcirco in initio alicujus acuti morbi lumbricos exire, malum habetur. Pejus verò si non per alvum, sed vomitione reddantur. ostendit enim majorem naturæ à causis mor-
bificis

bificis oppressione. In
progressu verò morbi con-
coctionis signis apparenti-
bus, veluti circa statum, aut
in ipso statu; & præsertim
in die decretorio expelli
lumbricos bonum est, ut
Hippocr. lib. 2. prædict.
ostendit. Lumbricos, in-
quit, teretes eunte morbo
in judicationē descendisse
idoneum est. tunc enim à
vincēte ac superante mor-
bum natura rejiciuntur.

De Hæmorrhoi- dibus.

Le&. 106. Iunij 7.

Hæmorrhoides : ap-
pellantur : venæ illæ
ad sedem sive anum per-
tingentes, quæ quando pa-
1. Αἱμόρροϊς φλεβὰς
vocat Hippocr. magnas
venas, quæ divisæ mul-
tum sanguinis fundunt.
2. de fract. comm. 24.

Eandem ob causam forsàn venæ circa anum sic vocari cœ-
perunt, quod apertæ multum sanguinis fundant; vel quod
præ cæteris aperiri consueverint. 2. Quæ omniū ferè
consensu ex vena porta deducuntur, Internæ nempe, &
vasa sunt tunicarum directi Intestini. Ista autem ve-
nas comitari ramos Arteriæ Cœliacæ notarunt Anato-
mici recentiores. Externæ verò à cavæ ramis exo-
riuntur, & muscutorum sunt Sphincteris motum pera-
gentium.

K k

3. Qualitate, aut Quantitate, aut Motu ad illas partes, peccantem. sæpe copiosissimum: ut in illo, qui per 45. dies quotidie & ij. (nisi error scriptoris, aut typographi sit) excrevisse narratur.

4. Sive intrinsecæ sint, sive extrinsecæ.

Cæcæ hæmorrhoides.

5. Aloës vel minima particula sumpta venas hæmorrhoidales ilico aut turgidas facit, aut aperit, quod validiora alia medicamenta non faciunt, ut turbith, esula &c.

tent, sanguinem: fundunt. dicitur & ipsum sanguinis per has profluvium, hæmorrhoids: sed frequentissime venæ sanguifluæ hæmorrhoidum nomen obtinent. Sunt autem hæ duplices: quædam etenim interius latent, aliæ extrinsecæ conspectui patentes.

Tument quandoque hæmorrhoides: & si tunc sanguis nullus per has profluat, cæcæ + dicuntur: à quibus verò sanguis fluit apertæ nominantur.

Dolorem autem frequenter cæcæ hæmorrhoides & quandoque, admodum vehementem inferunt; præsertim quæ intrinsecæ sunt: & tunc quidem quando acri ac mordaci aliquo admoto exacerbantur, veluti enemate quod salem multum, aut hieram picram, vel etiam fortiorē aliquem hieram permixtam habet, aut simili aliquo supposito-rio imposito. Intendunt verò & dolorem duræ alvi fæces quando excernuntur.

Dolo-

Dolorem autem intrinsecus latentium hæmorrhoidum etiam vehementiorem & cum calore conjunctum cito sedat⁶ ol. violac. $\frac{3}{4}$ i. aut i β . mensura cum parva syringa per sedem injectum, si frequentius imponatur. Nonnulli hujus loco ol. rosac. utuntur: sed illud minus efficax est. Prodest verò ol. ex violis etiam ad exteriores tumentes ac dolentes hæmorrhoides, cui ovi luteum crudum quandoque admiscetur ut melius adhærescat. additur verò & ol. sem. lini quando nullus calor adest, aut unguentum populi calore præsentente. Utile quoque fomentum ex floribus chamæmeli, meliloti, fol. bismalvæ, & violariæ herba, aut violis ipsis. Sic & cataplasma imponi potest ex radicib. γ bismalvæ decoctis, addita sem. lini & fœnugræci farina, & butyro recenti, aut ol. violaceo. Quod si duræ alvi

fæces hæmorrhoidum do-

6. Nam præterquā quod tam quam rosaceum refrigeret, insuper etiam mollit, quod rosaceum non præstat: quum astringentem quandam habeat.

7. Velut quidam faciunt, ex radicibus cynoglossi. quæ efficax est ad sedandum dolorem auxilium.

Kk 2

§. Cerevisia Gedanensis
quippe crassum succum
ingenerans hic minus
convenit.

lores intendant sive cæcæ, sive apertæ illæ sint, enema-
ta alvum lenientia injicere
convenit : ut ex decocto
carnis absque sale, vel ex
decocto florum & herba-
rum jam dictarum cum ol.
amygd. dulc. & butyro, &
uno aut altero ovi luteo :
quale fæces emollit & ea-
rum absque dolore exi-
tum procurat. Quibus au-
tem enemata displicet, his
subinde danda est manna
aut medulla cassiæ fistulæ,
aut musculosarum carniū
insulsa juscula², aut similia
quæ alvum lubricant & fa-
cilem reddant, observata
idem faciente victus ra-
tione.

Conducit verò sæpè
non modo dolorem lenire,
sed & sanguinem ex ipsis
hæmorrhoidibus evocare
frequenter expedit : veluti
quando admodum tument,
& laborans affectui alicui
sit obnoxius, qui sanguinis
per hæmorrhoides fluore
curari, aut mitior reddi po-
test ; vel quando solitæ
fluere

fluere, præter consuetudinem diutius sunt repressæ. tunc enim sanguinis fluxum per hæmorrhoides provocari maximè expediens est: prius tamè quàm id fiat, si corpus valde repletum fuerit, sanguis erit detrahendus, excubiti vena media, aut interna. neque verendum sanguinem hoc modo revellendum; licet enim sursum videatur retrahi: non cessabit tamen idcirco natura quod reliquum erit impuri ac melancholici sanguinis, per hæmorrhoides ablegare.

9. *Ne malum aliquod partibus inferioribus eorruente sanguine, inferatur.*

Aperit autem hæmorrhoides aloë assumpta, & quæcunque cum hac componuntur. evocat verò & ex his sanguinem frictio frequens cum aspero aliquo, veluti rudi panno lineo, aut cum fici aut symphyti folijs. Aperit verò & has ceparum succus felle bovino admixto, cum lana aut gossypio appositus. Item & cyclamini succus per se, aut cum melle illi-

10. *Gal. ob acrimoniam fecum putat fieri. quod tamen verum non est quum feces multò acriores non provocent.*

tus. Quod si verò istis hæ-
morrhoides non aperian-
tur, sanguisugam unam aut
alteram tumētibus hæmor-
rhoidibus apponere con-
ducet. Vel si hæ ad manum
non sint, scalpello ipsas ape-
rire utile erit, sic enim san-
guine profluente & dolo-
res cessant, & à vitiosis hu-
moribus venæ expurgan-
tur. Hæmorrhoidibus au-
tem obstructis & dolenti-
bus victus ratio convenit
attenuans, ut ex carnibus
volucrum circa aquas non
versantium, & talis, qualis
in curatione quartanæ ac
melancholiæ. Potus sit vi-
num album & tenue, vel
cerevisia tenuis ex bonis
frugibus cocta.

Lea, 107. Iunij 8.

Apertæ.

Apertæ hæmorrhoides
à quibus sanguis profluit
sinendæ, neque has reprimere
expediens est: nisi su-
perfluant aut modum ex-
cedant: per has enim à
nonnullis morbis vel præ-
servari vel liberari homi-
nem contingit: nam ut
Hipp. 6. epid. part. 3. hæ-
mor-

morrhoidibus laborantes
 neque pleuritide, neque pe-
 ripneumonia¹¹, neque pha-
 gædena, neque furunculis,
 neque thermintis, neque le-
 pra corripuntur¹². Sic &
 liberari ac sanari per hæ-
 morrhoidum fluorem con-
 tingit insania aut melan-
 cholia laborantes, eodem
 teste. Insanis, inquit, si va-
 rices vel hæmorrhoides su-
 perveniant, insaniæ solutio,
 aph. 21. 6. Item melan-
 cholicis & nephriticis hæ-
 morrhoides supervenien-
 tes, bonum 11. aph. 6.
 Nam in utrisq; melancholi-
 ci humores insaniæ ac me-
 lancholiæ efficientes cau-
 sæ, per hæmorrhoides ex-
 purgantur. Nephriticis ve-
 rò eadem cōducunt ratio-
 ne, qua à pleuritide ac pe-
 ripneumonia præservant:
 sanguinis videlicet quan-
 titatem minuendo. nec
 enim soli humores melan-
 cholici (licet hi præcipuè)
 sed tum & alij, ac subinde
 purior sanguis per has ex-
 purgatur. Atque propter

11. *Quia copia fervidi sanguinis depletur.*

12. *Quia causa horum malorum, in melanco-
 liam, vel atram potius
 bilem adustione conversi
 humores, per hæmor-
 rhoidas evacuat.*

13. Rursum Hæmorrhoidibus assuefaciendi non sunt, quibus sanguis ater nō colligitur, quum utrinq; excessum utrinque habeant periculum.

has rationes hæmorrhoidum fluor, nec statim, nec temere est sistendus, nisi superfluat 13. Quando autem superfluit, sanguis tenui ac seroso profluente & vires redduntur imbecilliores, faciei color pallidior, & respiratio quandoque difficilior, tunc eas sistere convenit.

Sistunt autem hæmorrhoides astringētia: ut sunt rosæ rubræ, balauſtia, cortices granatorum, calices glandium, plantago, equisetum, verbascum, rubi folia, galla, nuces cupressi, sem. berberis, sem. myrt. & similia. Item hypocistis, acacia, sanguis draconis, alumen, vitriolum & similia. Ex quibus lotiones, fottus, & cataplasmata fieri possunt: ut Rosar. rubrarum, balauſtiorum, cort. granat. cal. glandium ana ʒ 2. fol. verbasci siccorum, fol. rubi, aut myrti ana M. ʒ. nucum cupressi, gallarum, sem. berberis ana ʒ 1. aluminis ʒ 2. f. omnium decoctio

octio in aqua plantag. vel
 aquifeti, vel in aqua chali-
 beata ad consumptionem
 medietatis: colato adde
 nellis rosati, aut syr. ex ro-
 is aridis 3 i. cum hoc
 ubinde abluantur, aut fo-
 reantur hæmorrhoides.
 Potest deinde imponi tale
 cataplasma. & Hypocist.
 cicaciæ, sang. draconis,
 churis ana 3 i. cum ovi al-
 bo & modico ol. rosacei,
 aut myrtini misceantur.
 Huic verò & addi pote-
 unt emplasticam ac resic-
 cantem vim habentia, ut
 bolus armenus, terra sigil-
 lata, vulgaris mumia.

Cataplasmatibus verò loco
 etiam symphyti trita radix
 apposita confert: jam &
 intramentum¹⁴ scriptorium
 cum gossipio impositum
 sistit fluorem hæmorrhoi-
 dum.

Veteres nimium diu pro-
 ducentes hæmorrhoides ex-
 trahere, filo constringere,
 dein resicare, aut urere so-
 lebant; & postea cicatri-
 cem ipsis inducere, ut

¹⁴ Nam ex gallis, vi-
 triolo, & gummi Ara-
 bico componitur, que
 omnia frig. sicca, atque
 adstringentia sunt.

15. Cicatrice enim claudunt. quæ ipsis partibus solidior ac firmiter est, nec per Naturæ motum rursus aperiri potest.

Aphorismus interpretatus.

16. Quæ sepe non proficientibus lotionibus & reliquis medicamentis sanitatem restituit.

Hipp. lib. de hæmorrh. ac Aët. & Paulus faciendum docent. Atque sic curata non amplius aperiuntur sed occlusæ permanent, fluxu earum perpetuo superpresso, quod bonum non est: nam ut Gal. 6. epid. ait, periculosum est si hæmorrhoides in totum superprimantur: atque idcirco Hipp. unam servandam consulit. per quam videlicet melancholicus sanguis expurgari possit: *Adiuturnis*, inquit, *sanato hæmorrhoidibus, si una non ferretur periculum est aquam intercutem vel tabem advenire*, 12. aph. 6. Verum hæc sententia locum non habet quando per ea, quæ prius sunt dicta, hæmorrh. sistuntur: non etenim sic obstruuntur quin suo tempore, quum natura se se exonerare cupit, iterum aperiuntur ac dehiscant.

Victus autem ratio nimium profluentibus hæmorrhoidibus convenit crassos, ac lentos ingenerans humores. ad quod faciunt

tiunt ea, quorum jus gela-
linæ instar concrefcit, ut
sunt pedes & extrema
ovium, porcorum, boum,
& similium animalium: item
& carnes vitulinæ præfer-
tim musculosæ. Vinum
dulce, non tenue, quale
Creticum & Passum. Ce-
revisia crassa, qualis ¹⁷ Ge-
danensis vel alia similis.

*17. Quæ præterquam
quod crassum facit suc-
cum alvum etiam lubri-
cat, quod utile est.*

Caterum quemadmo-
dum Hipp. abscissis omni-
bus hæmorrh. periculum
esse ait adventus ¹⁸ hydro-
pneumatis aut phthisis, ita etiam ni-
mium ac supramodum his-
tæ profluëtibz omnes, aut
volurimas naturæ operatio-
nes, qui sic affecti sunt, of-
fensas habent: nonnulli
verò etiam & hydrope cor-
ripiuntur, ut Gal. com-
ment. 22. lib. 2. aph. ait.

Prognosis.

*18. Quia vitiosi humo-
res retenti hepar, vel
pulmonem invadunt.*

De Inflammatione Jocinoris.

Lect. 108, Junii 11.

Duplex, inquit Gal. mor-
borum genus jocino-
i accidit, unum à sola in-
temperie citra tumorem

præter naturam ; alterum
quando cum intemperie
humor aliquis infestat , vel
inflammatio, erysipelas, aut
scirrhus.

Huc verò & refertur &
obstructio à crassis & vis-
cosis humoribus , & spiri-
tuosa aut flatulentia ejus-
dem distentio.

Causa.

Iocinoris autem inflam-
mationem gignit sanguis
copiosior in ipsius visceris
substantiam , seu *παρ' ἐγγύ-
μα* influens.

Signa.

1. Propter obtusum par-
tis hujus sensum.

2. Vt & omnes inflam-
mationes partium inte-
riorum. illarum enim in-
temperies tum propter
vasorū magnitudinem,
tum propter vicinitatem
cordi communicatur.

3. Quotiescunque enim
in locum frigidiorē
effunditur bilis , mutat
colorem. solet autē ista
bilis in ventriculo potis-
simū colorem illum ac-
quirere.

Comitatur autem hanc
dolor dextri hypochondrii
non pungens , sed magis
cum gravitatis quodam
sensu : febris : continua : re-
spirationis quædam , non
tamen magna difficultas :
tussis sicca & exigua : nau-
sea : cibi fastidium : sitis
magna : lingua initio albi-
da , postea asperior ac ni-
gricans : vomitus synceræ
bilis , quandoq; etiam cras-
sioris ac ovi luteo similis ,
quæ postea : æruginis ali-
quando colorem referre
conspicitur : alvus dura,
nisi

nisi adsit visceris imbecil-
litas.

Oritur autem inflamma-
tio modo in gibba jocino-
ris parte, modo in sima, ra-
tò in utraq; : si in gibba in-
flammatiò nata, tumor sen-
titur, & admota manu do-
lor etiam ejus nonnihil in-
tenditur : & si abdomen
gracile ac tumor magnus,
conspicui etiam patet: tuf-
fis etiam major, & respira-
tio etiam aliquanto diffici-
lior, & dolor ad jugulum
parte dextra extenditur
ideo ut ipsum detrahi vi-
deatur. In sima verò in-
flammatione consistēte, tu-
mor neque sentiri neque
conspici potest: tussis mi-
nus molesta : respiratio li-
berior : sed sitis, nausea, &
sibi fastidium majora : &
vomitus meracioris bilis
frequenter, ac copiosior.
Quum verò utraque joci-
no-
ris pars laborat, dolor
ad nothas costas exten-
ditur, atque respiratio longè
difficilior. Quod si verò
etiam inflammatio erysi-
pe-

4. Quia diaphragma
non afficitur hic.

5. Quod sima pars im-
mediatè ventriculū con-
tingat.

6. Neque enim fieri po-
test ut exactè circum-
scripta diu subsistat:
quod Hepatis caro sibi
continua sit.

latodes fuerit aderit febris
ardens, sitis vehementissima,
lingua nigra & admen-
dum aspera, vomitus mer-
cioris bilis: atq; reliqua on-
nia symptomata majora.

Similis autem inflamm-
mationi iocinoris pleuritis
videtur, sed pleuritis al-
tiori est loco & dolor ejus
punctorius, & tussis cum
spuito cruento. inflamm-
tionis iocinoris dolor inf-
riori est loco, non puncto-
rius, sed gravativus: tussis
absque spuito, ut latius di-
ctum ubi de pleuritide.

Curatio.

Curatio à venæ sectione
incipienda: detrahendus san-
guis ex dextri brachij venæ
interna, aut saltem media sibi
& siquidē una vice tantum
extrahi non potuerit, quan-
tum videbitur, reiteranda
sanguinis detractio. Pur-
gante verò & aliquo medi-
camento opus fuerit, nisi al-
vus fluxa sit: cōducit autem
infusum rhabarb. cui man-
na aut syr. ex infusione ro-
sar. utiliter adjicitur. Hujus
loco poterit & clyster ali-
quis

7. Quod propter insig-
nem in hujus morbo uti-
litatē Iocinoris vita ab
Arabibus dictum fuit.

quibus mollis injici ut ex decocto malvæ, betæ, mercurialis, violarum; cui addendum ol. chamæmel. & rosaceû, & diacathol. ʒ 6. aut ʒ 1. & tantumdem sacchari rubri, & exiguum salis.

Necessaria verò etiam quæ alterant, & calorem contemperant, inter quæ

audatissimum cichorium,

leinde dens leonis, & en-

livia vulgaris, & ex istis

compositi syruipi; quos cum

decocto earundem her-

arum, aut aquis exhibere

convenit. Cum ipsis verò

herbis coquenda quædam

int aperientia & urinam

provocantia: & initio qui-

tem temperata & non ad-

modum calida: ut sunt rad.

paragi, rusci, graminis,

el fœniculi: & tale deco-

rum sæpius exhibendum:

præsertim inflammatione

gibba jecinoris existen-

ti: nam ut Gal. 6. de loc.

F. Gibbæ per urinam, si-

quæ partes jecinoris per al-

iam expurgandæ. In pro-

gressu verò morbi notis

8. Quod simul obstru-
ctiones, quæ cum In-
flammatione partis hu-
jus conjungi solent, ape-
riant.

concoctionis apparentibus
 licebit magis aperientia sine
 paulo calidiora addere
 vulgare hepatorium, co-
 cuta, rad. petrosel. aut ap-
 & syr. de Bizant. qui, si cu-
 aceto fuerit paratus, cras-
 sos ac viscosos humores
 etiam incidit, & potentius
 obstructa aperit. Ac he-
 etiam utendum in sima je-
 cinoris parte inflammatio-
 ne consistente: interim fac-
 pius exhibenda sunt per a-
 vum purgantia, quamquum-
 gibba pars affecta est.

Adhibentur verò &
 hoc affectu epithemata,
 olea, aut unguenta hypo-
 chondrio dextro. Epithem-
 mata fiunt ex succis, deco-
 ctis, aut aquis cichorij, en-
 diviæ, oxalidis & similium
 quibus addi convenit (u-
 visceris robur conservetur
 vel agrimonix, vel rosarum
 rubrarum, vel etiam absin-
 thij succi, vel decocti pan-
 aliqua. sunt autem hæc epi-
 themata non actu frigidat-
 sed tepida admovenda.

Oleo verò utendum et
 rosaceo.

9. Ne scirrhus fiat, in-
 crassatis & impactis
 humo ribus.

rosac. vel cydon. cui mis-
cendum aliquid olei de ab-
sinth. quo Gal. 11. meth.
protinus utendum consulit,
propter eam quam habet
astringendi facultatem, qua
jocinoris robur conserva-
tur, quod conservari debet.
atque hinc jecur non esse
relaxantibus 10 frig. curan-
dum Gal. admonet.

Victus ratio in jocinoris
inflammatione tenuis esse
debet, & ad frig. ac humi-
ditatem inclinans: veluti in
febris synochis & ar-
dentibus. sed abstinendum
est ab omnibus actu frigi-
dis; veluti in omni partium
internarū inflammatione.

Gravis autem ac diffici-
lis morbus est jocinoris 11
inflammatio, cui singultum
supervenire Hipp. malum
esse ait aph. 17. lib. 7. osten-
dit enim & malignam ad-
modum & maximam joci-
noris inflammationē. tum
enim singultus compati-
te ore ventriculi fit, quando
jocinoris inflammatio &
pessima, & maxima fuerit

10. Nostri ævi medici
plerumq; unguēto utun-
tur rosaceo, quod ta-
men, si compositionem
ejus spectes, contra men-
tem Gal. adhibetur.

Prognosis.

11. Propter Principa-
tum, quem inter partes
Naturalibus facultati-
bus inservientes hoc vis-
cus obtinet.

authore Gal. bile videlicet multa ac copiosa admixtum ad ventriculi ostium proflata, atque illud irritante ac mordente.

Quod si verò inflammatio jecinoris in abscessum commutetur, febres quæ eodem desinunt aut mitiores fiunt, sed corpus sensim extenuatur (ut Gal. in Introductorio seu Medico scribit) tandemque laborans deficit ac moritur.

Contingit verò & quandoque pus ex abscessu profluens aliud aliquod ex internis visceribus corrumpere ac inficere, & quandoque subitanam mortem inferre.

De Erysipelate jecinoris nihil hic afferendum, de eo siquidem actum est ubi de febribus ab affectu erysipelatum. quarum quæ Typhodes dicitur, ad erysipelas jecinoris consequitur. Nulla etiam œdematis mentio hic facienda; nam hoc initium est hyposarcae, quæ species est hydropis: de

12. Sanguificatricis viribus languentibus.

13. Nonnumquam per alvum, vel urinarios meatus confertim effluit.

de qua postea agendum.
 Cachectica siquidem hy-
 posarcam præcedens di-
 spositio, jecur cedemate la-
 borare ostendit.

De Scirrho Ioci- noris.

Lect. IIO, Iun. 14.

Scirrus jecinoris pro-
 priè dicitur tumor du-
 rus ac indolens, ab humore
 crasso, limoso, ac melan-
 cholico genitus. & talis
 quidem exquisitus est scir-
 rhus. Minus autem pro-
 priè reliqui tumores duri,
 licet non à melancholico
 succo, & non omnino abs-
 que dolore, scirrhi : appel-
 lantur. & tali scirrho quan-
 doque obnoxium est he-
 par, & quidem frequen-
 tius quam exquisito : nec
 tum semper tumor appa-
 ret, sed quando ejus *παρ' ἐξ*
γυα, seu substantia ejus
 durior reddita : tunc scir-
 rho jecur laborare dicitur.

1. *Vel potius Tumores
 Schirrhosi.*

2. *Quod humores ex
 quibus verus schirrus
 producitur in splene po-
 tius, quam in hepate, se-
 dē suam habere soleant.*

Origo talis scirrhi ab
 humore est crasso ac vis-
 coso, ut plurimum per re-

Causæ,

L I 2

3. *Crassi namque per se humores, qui Tertianas impuras producunt. ideoque citius à frig. & adstringentibus medicamentis indurantur.*

4. *Discussis nempe tenuioribus partibus.*

5. *Præsertim in gibba ejus parte existentis.*

Signa.

frigerantia & astringentia inducunt, veluti per talia tunc frequenter in febribus tertianis, præsertim impuræ usum: quibus hujuscemodi scirrhus frequenter succedit. Oriuntur verò & erysipelate, aut inflammatione nimium refrigeratis. Possunt verò & ex sola visceris obstructione mancurata fieri. Contingit verò & crassos ac viscosos humores quandoque à calore, aut à calidis biliosis humoribus + indurari, atque in lapideam substantiam unam cum jocinoris ipsius substantia converti, quod fere per regium fit morbum.

Non difficilis autem scirrhi jocinoris agnitio est, abdomine extenuato & corpore: nam quum molles ejus durior sit quam inflammationis, facilius tactu percipitur: sed prius tamen quam Ascites supervenerit: nam ubi ille (quod frequenter fit) successerit, præ tumore abdominis scirrhus deprehendi nequit.

Scir-

Curatio.

Scirrhus autem ex cras-
 sis & viscidis humoribus
 post febrem relictis, aut
 quem obstructio præcesse-
 rit, attenuantibus, aperien-
 tibus, & temperatè calfa-
 cientibus curari debet: uti-
 les sunt herbæ, rad. sem.
 um & syr. ac elect. tali
 prædita facultate: de qui-
 bus mox ubi de jocinoris
 obstructione. Topica ve-
 rò admovenda quæ emol-
 liendi ac digerendi vim
 habent: ut est ung. ex ol. li-
 norum, chamamel. & nar-
 dino compositum, præfer-
 im si aliquid ammoniaci
 in aceto dissoluti, aut bdel-
 lij accesserit. Sic & utile
 ol. rutaceum cum ol. sem.
 lini paratum: quod singula-
 rem emolliendi ac dige-
 rendi vim habet. Condu-
 cunt & ea 6, quæ adversus
 duritiem faciunt.

6. Quibus tum potissi-
 mum uti convenit, quan-
 do levioribus malū non
 cesserit.

Victus ratio.

Victus ratio ex optimis
 & facilis concoctionis ci-
 vis esse debet: quos condi-
 ti aceto, vel succo citrio-
 rum, aut limonij utile est: si-
 cuti & simul cum ijs coqui

7. *Vbi calor magnus aut non affuit, aut jam adesse desijt.*

8. *Et quæ ex lupulo amarorem habet; ut illa quæ in usum nautarum parari solet.*

Prognosis.

9. *Quatenus intemperie hæmatosin lædit.*

10. *Tum qua intemperie chymosin; tum quæ vias obstruendo chymi diadosin impedit.*

petroselinum, vel ejus æque foeniculi rad. aliasque herbas: ut origanum, hyssopus, thymum, valde expediens est. Vitanda omnino crassa, viscosa, ac difficilis cōcoctionis: ut sunt carnes boum, & omnes sale mæceratæ, aut fumo duratas, & carnes ferinæ, & omnium palustrium & circiorum aquas versantiū volucrum.

Vinum tenue & album, aut cerevisia tenuis, commendatur: rubrum vinum dulce, crassum, immaturum & omphacites improbandum: sic & multus lactis, aut casei usus.

Omnis autem scirrhus jecinoris hydropem minatur, aut atrophiam, & præcipuè qui exquisitus, qui etiam sanitatem non admittit ut Gal. 14. meth. ait. Sic & durities scirrhusa, quæ inflammationi, aut erysipelati malè curatis, aut nimium refrigeratis successit, aut post morbum regium relicta est; incurabilis quoque existit, maxime ubi

bi hydrops ascites succedat, qui sæpiſſimè ſuccedit.

De Obſtructione

Jocinoris.

Le 2. III. Junij 15.

Obftructione jecur tūc laborare dicitur non quando ipſius ſubſtantia aliquo humore imbuitur; ſed quando tenuēs & exi-
es venæ, per quas alimen-
um diſtribuitur & à ſimis
partibus ad gibbas & ad
venam cavam deferitur, an-
guſtiores factæ ſunt, vel
etiam occluſæ.

Cauſæ interdum ſunt
crassi, ac lenti pituitosi hu-
mores in ipſis anguſtis ve-
narum vijs hærentes: inter-
dum verò multa ſanguinis
copia venas ipſas implens;
veluti in plethora.

Signa obſtructionis ſunt
in dextro hypochoſdrio
gravitatis ſenſus: & urinæ
tenuēs: & ſiquidem lenti
ac crassi ſunt humores qui
venas obſtruunt, febris nul-
la adest, aut poſterius ſu-
pervenit, quando videlicet

1. Tumores ſic ſunt di-
verſi, pro humorum di-
verſitate, ſed obſtructio
meatum, h.e. vaſorum
affectus eſt.

2. Vel etiam dolor ex
tenſione citra tumorem
& febrem.

3. Quod ichoroſa Uri-
narum materia velu-
ti percoletur, partesq;
crassioreſ veluti in cor-
pore retineantur.

L l 4

4. Quia sanguis multus
diu conclusus esse non
potest quin incalescat,
vel etiam putrescat.

humores putrescentes erant
accendunt. A sanguine
verò copia si fiat obstru-
ctio, præter signa quæ p[er]
thoram sive plenitudinib[us]
ostendunt, adest quoq[ue]
bris & frequentissimè
nochus. quem propter
miam sanguinis copia
fieri Gal. testatur.

Annumerant nonnulli
obstructionis causis & fla-
tus jecur distendentes, se-
hos Gal. 5. de san. tuend. a
obstructione differente
facit.

Curatio.

I. A sangui-
nis copia.

5. Quæ propter obstru-
ctionem à sanguine fa-
ctam retenta ultra soli-
tum fuere, tum biliosa,
tum melancholica: Ista
enim leni alvum cum
aperitione ducente me-
dicamento ex corpore
deturbari necessum est,
ne morbos faciant.

Si itaque à copia sanguinis
obstructio jecinoris
fiat: mox sanguis ex dextris
brachij media, aut interna
detrahendus; veluti in syno-
cho & inflammatione jeci-
noris. Post sanguinis mis-
sionem exhibendum ali-
quod erit med. s. quod ea,
quæ in primis ac proximis
venis hærent, expurget: ve-
luti infusum rhabarb. cum
manna, aut syr. ex infusio-
ne rosarum. quod infusum
si factum fuerit cum deco-
cto aliquo aperientium ac
refri-

refrigerantium, præstantius
c. utilius erit: qualia sunt
ad. asparagi, rusci, cicho-
rii, dens leonis, & similia.

Victus rationem oportet
tenuem esse: veluti in
jocinoris inflammatione:
nec multo plenior.

6. Multa enim humorum
copia obstructions fa-
cit, vel saltem auget
factas.

I. Ex crassis
humoribus.

Quando autem obstru-
tio jocinoris ex crassis ac
lentis humoribus, nullaque
accesserit febris, purgans
aliquid med. erit exhiben-
dum; quod lentos ac pitui-
osos humores educat &
facultate aperitiva non de-

stituatur: quale esse potest
de decocto rad. herb. & se-
minum aperientium, in quo
confusa sint folia senæ, &
garicus. Utile quoque dia-
cœnicon, vel elect. In-
debilioribus diaca-
chol. cum simili decocto,
vel cum decocto cicerum
exhibendum. Prius tamen
quam purgans exhibeatur,
humores nonnihil præpa-
rari cōvenit: quod fieri po-
terit exhibitione oxymeli-
s vel syr. acetosi simplicis
vel compositi. Post pur-

7. Exempli gratia; &
Rad. fœniculi, petrose-
lini, ana ℥ β. cuscute,
hepatorij vulg. cichorij
ana M. β. sem. melonum
sem. anisi ana ℥ i. fol.
senæ ℥. v. agarici ℥ i.
Zingib. ℥ β. uvarū pas-
sarum ℥ β. f. decoctio
ad haustum, cui adda-
tur syr. acetosi simpl.
aut compositi ℥ i.

gationem etiam fortioribus aperientibus utendum ut etiam syr. de Bizant. syr. de rad. & similes. Ex simplicibus hepatorium vulgare, cuscuta, lupuli folia, & similia quamdiu non adesse febris. Quod si febris accesserit, sanguis etiam erigendus detrahendus; non prætermissis interim reliquis quæ dicta sunt: nisi quod aperientibus quædam etiam minus calida, sed tamen aperientia erunt admiscenda: ut cichoriū, dens leonis, endivia &c. Aperiant autem & jacinoris obstructiones dialacca, & diacurcuma in Officinis usitata: sed in febribus hæc minus conveniunt. Utuntur & nonnulli unctionibus, ad quas conducit ol. amygd. amarorum & nardinum: præsertim si cum nardi spica aut junco odorato, & sem. apij aut petroselini, & cyperi radice in vino albo tenui, & exiguo aceti ad usque consumptionem horum liquorum decocta fuerint.

Victus

3. Non possunt valde convenire quum obstructio fiat in medio corpore jacinoris, ad quod medicamenta hæc externa vix penetrant.

Victus rationem esse ta-
lem convenit, qualem in
scirrhi curatione.

Obstructio autem joci- *Prognosis.*
noris si diu constiterit, fe-
bris supervenerit: putres-
centib. β . in angustiis vena-
rum meatibus ipsis humo-
ribus: aut tandem scirrhus,
si non curatio adhibeatur,
succedit.

De Iocinoris ex fla- tibus tumore.

Tumor jocinoris aut
præcordiorum, qui ex
flatu gignitur, à cruditate
originem habet: idcirco
post cibum sumptum mo-
lestior quàm alio tempore,
ut quàm jejuno ventri-
culo.

1. Dolor vehemens he-
patis non fit nisi ex apo-
stemate calido, aut fla-
tu. quapropter quum
non est febris, & dolor
est vehemens causa ejus
sunt flatu.

Contra hunc auxiliantur
anisi, ammos, carvi
ceniculi, aut similia: aut ex
his composita tragemata
post cibum sumpta: ad-
dito nonnihil cinamomi,

2. Flatus enim tensione
lacidunt; quam novi chy-
mi accessio auget.

anastiche, rosas, aut semine
oriadri: & sacchari quan-
tum omnium est pondus.

3. Nam levis adstrictio
ut tonus visceris nobi-
lissimi servetur, requi-
ritur.

ex quibus mox à sumptibus
cibo cum modico vino
nonnihil est sumendum.
Adduntur astringentia,
concluso per hæc ventriculi
ostio concoctio rectius
datur melior. Si verò per
severans fuerit ex flatibus
distentio: hierâ picrâ verò
tricus purgandus: & ab
stinendum ab omnibus, quæ
flatus ingenerare queant.

Lea, II.2. Iunij 18.

De Imbecillitate Jocinoris.

Imbecillitas jocinoris dicitur,
quando ipsum viscus
in proprijs actionibus
per solam malam intemperiem
debilitatur: nulla scilicet
neque inflammatione, neque
que alio manifesto morbo
in ipso existente. Propria
autem ejus actio, sanguifi-
catio sive sanguinis est ge-
neratio: quam substantia
sive *παρὰ τὴν φύσιν* ejus opera-
tur. hac actione læsa, af-
fectus dicitur hepaticus, &
hoc laborantes hepatici, si-
ve jocinorosi à Medicis
nominantur.

*1. Propter debilitatam
Retentricem, per acci-
dens; aut Concoctri-
cem, per se.*

nominantur, ut Gal. 8. *τὸ π.*

Nascitur autem imbecillitas vel ab intemperie ipsius visceris, vel ab intemperie humorū, qui in venis aut arterijs proximis continentur: per quam ipsa joci-
moris actio, quo minus munere suo proprio fungatur, impeditur.

Accidit autem ista joci-
moris imbecillitas quando-
que cum alvi cruento fluo-
re. quando videlicet ipsum
hepar chylum attrahit, &
aliquo modo permutat, sed
non retinet. atque tunc flu-
us hepaticus, aut hepatica
ysenteria affectus, nuncu-
atur. Quandoque verò &
absque alvi fluore imbecil-
tas contingit, & tunc at-
tractus chylus retinetur, sed
in bonum sanguinem non
convertitur: ut fit in Ca-
chexia.

Signum autem affectus
hepatici est, quando nullo
modo in jocinore existente ut
dictum est malo, faciei co-
lor + vitiosus ac pallidior

2. Hi tamen nisi viscus
intemperatum, ideoque

Causæ. debile reddi-
derint, affe-
ctus hepaticus haud-
quaquam dici poterit.

3. Et quod excernitur,
ἐξυθῆγε vel *ἐξέξυθῆγε*
περίπλυσσις dicitur, aut
χυλώδης; aut *αἱματώ-
δης διαχώρησις*. Fit au-
tem hoc, vel Retentrice
suo munere non fungen-
te: tumque pauciora, sed
continuo excernuntur;
Vel Expultrice quod
corruptum ac coacerva-
tum est proturbante;
tumque plura, per inter-
valla, sed confertim de-
jici solent. Atque hæc
actio hepatis, prima qui-
dem Cæliacæ; posterior
Vomitui ventriculi, pro-
portione respondet.

4. Humorū enim col o-
ri cutis, potissimum f. a-

Signa. ciei ubi illorum
major conflu-
xus, fit color analogus
est. quare quum tales
sint, quales hepar pro-

ducit, humores, faciei color hepatis diathesin designat.

5. Quod hepar situ Cordi propinquum, & maximis venis connexum sit.

6. Expultricē oris ventriculi irritantium.

7. Humoribusvè saltem secundarijs, primò; post etiam ipsa carne.

redditus sit : & alvi excrementa liquidiora, vel sanguinea, vel sanguini permixta fuerint : ex his enim jecur debilitate laborare, & sanguificam ejus vim debiliorem esse, constat. Et siquidem cum calida intemperie imbecillitas conjuncta fuerit, excrementa loturæ carniū recens matatarum similia sunt, sed frequenter crassiora ac nigriora : subinde etiam biliosa quædam ipsis ammiscuntur. Adest verò & febrilis calor, & sitis, & quandoque vomitus assumptorum, vel vomitus bilis aut aliorum vitiosorum. Et si diutius hæc intemperies perseveret, etiam crassa, pingua, graveolentia, & abundè colorata excrementa redduntur : celli-quescente ipsa jocinoris substantia. Si verò frigida adsit intemperies loturæ quoque carniū similia excrementa, sed liquidiora & dilutiora apparent, & quandoque cruda quædam

quædam ipsis permiscen-
tur, vel crassioris quidam
sanguinis grumi nigrican-
tes: tandem etiam varij
coloris redduntur excre-
menta: sitis adest exigua
aut nulla: appetentia inor-
dinata modo magna, mo-
do remissa.

Quando autem absq; al-
vi profluvio imbecille red-
ditum fuerit jecur, & ex
calida quoque intemperie,
color faciei ad² flavum si-
ve luteum colorem incli-
nat: urinæ rubent: alvus
frequenter dura, ac sicca:
febris non rarò accedit: si-
tis intenditur, & lingua fit
arida: & tandem univer-
sum corpus flavo colore
suffunditur sicut in ictero;
& extenuatur, præsertim si
sicca adsit intemperies: &
quandoque etiam pruritus
accedit. Si quando imbe-
cillitas ex frig. fit intempe-
rie color faciei albicat &
pallidus est: urinæ albidæ
quandoq; tamen & ruben-
tes, sed quæ non perturban-
tur: corpus & præcipue ex-

8. *Propter adauctam
flavem bilem.*

9. *Calore chyli, ac fæ-
cum liquidiorum par-
tem dissipante.*

10. *Ex acrimonia hu-
morum ad habitum de-
latorum.*

11. *Quæ gradu solum,
non etiam specie differunt.*

Curatio.
Generalis.

12. *Quæ tonum quidē addant, obstructions autem non faciant.*

13. *Qui Cinnamomum, casiam, & canellā unum idemque dicunt; rem ipsam dicere credendum est.*

tremæ partes frigent: sitis adest nulla: & cibi fastidium. quandoque pedes non tument, nihil tument, aliquando & ob cachexia deinde hypofarlogia ea subsequitur.

Curatio imbecillitatis ipsius jecinoris per ea fit, quæ composita sunt ex moderatè astringentibus, intemperiem alterantibus, & qui humores cōjuncti sunt ipsorum malitiam corrigentibus. deinde etiam ex iis, quæ contrariam vim habent adversum putrefactiones, quorū plurima u Gal. ait ex aromatum sylva existunt. inter quæ cinnamomum¹³, & casia quæ vulgò cannella, à Gal. præ cæteris commendantur: quæ omnes putredinosas, ac venenosas facultates corrigere affirmantur. Inter medic. verò simplicia, quæ adversus jecinoris imbecillitatem conducunt, sunt & myrobalani ab Arabibus descripti & laudati, ac præsertim citrini nūcupati; quæ astringendi facultatē cum

exiguâ

exigua frigiditate primi, aut
secūdi ordinis conjunctam
habēt, qua jocinori & om-
nibus partibus nutritioni
dicatis profunt, easque ro-
borant: colorem etiam fa-
ciei emendantes. qua de
causa med. hepaticis opor-
tunè adhibentur, vel etiam
per se, præsertim conditi
sumuntur.

Quando igitur per cali-
dam intemperiem jocino-
ris actio debilior reddita,
alvo fluida, & excrementis
cruenta; adhibenda erunt
astringētia roborantia quæ
nonnihil simul refrigerent,
ut sunt rad. tormentillæ,
quinquefolij + rubeæ, bi-
stortæ, & similes: myroba-
lanorum citrinorum, vel
etiam aliorum aridorum
cortices. conducit & agri-
monia à Veteribus eupato-
rium dicta, & ad hepaticas
affectiones ab ipsis com-
mendatum. Quod si verò
& caloris excessus magnus
fuerit, licebit & cichorium,
aut oxalidem addere. Ex
his autem parari potest de-

Particularis.
Quæ cum fluxu
ex cal. interna
peric.

14. Quum astringere
contra Gal. jam in stir-
pium historia demon-
stratum. unde etiam in
vulnerarijs potionibus
adhiberi solet.

Mm

15. Potiones ferè potius
adhibende quia agri si-
ciant.

16. Caro cydoneorum
aut rob de ribes addi
etiam possunt; aut rob
de berberis.

coctū 15 aliquod, cui etiam
incoquēdæ sunt uvæ passæ,
ad jocinoris affectus Gal.
authore utiles. tale deco-
ctum canella cinamomo
vulgari condiendum, vel
speciebus diarrhod. vel
diatrionsantalon. Postea
si libuerit, admisceri pote-
rit aliquis syr. astringens:
veluti de succo granat. aci-
dorum 16, aut de succo cy-
doneorum, aut de rosis ari-
dis, vel myrtinus; prout la-
boranti placere potuerit
cujus gustui consulendum
est. talem potionem bis,
aut ter per diem offerre
expedit. Hujus verò loco
conditum etiam compo-
nere licebit ex conserva
rosarum rubrarum, rob. de
ribes cum trochiscis de
spodio dictis, aut cum spe-
ciebus diarrhodon, aut spe-
ciebus diatrionsant. addito
aliquo supradictorum sy-
rup. ex quo bis tervè in die
plus minus 3 β. erit dan-
dum.

Victus ratio refrigerans
& astringens similiter esse
debet:

debet: cremor hordei ad-
ditis amygd. dulcibus utilis
est: conducit quoque & ci-
bos cōdiri portulaca, oxa-
lide, fructibus mori, corni,
ribesij, aut berberis ¹⁷.

*17. Qui etiam resiccatis
servari potest per hye-
mem.*

Potus sit ptisana cum ci-
namomo decoctum, vel
ipsius cinamomi decoctum
addito aliquo dictorum
astringentium, aut rosis ru-
bris vel earundem conser-
va, vel ligno santalorum,
aut simili aliquo.

In causa frigida omnia
calfacientia cōveniunt, tam
quæ medicamenti locum
habent, quam quæ alimen-
ta sunt. Conditum suffice-
re potest ex conser. rosar.
rubrarum & conser. flor.
rosmarini, addita galanga,
calamo aromatico vulgari,
cinamomo, aut speciebus
aromatici rosati, aut diaga-
langa, quæ miscenda sunt
cum syr. de mentha. & tali
condito utendum veluti
priori.

*Cum alvi fluore
à causa frigida.*

Cibum esse oportet ex
optimis carnibus, quas ci-
namomo, garyophyllis, pi-

Mm 2

18. *Præstaret tum assis
uti infixis garyophyllis.
nam liquida omnia al-
vum movent.*

19. *Sine fursuribus enim
alvum retinet.*

Citra fluxum alvi.

A causa calida.

pere, mace, gingibere, cardamomo condiri refertur vel cum ipsis serpillum, hyssopum, salvia, rosmarinum incoquenda. Vinum laudatur album, clarum, odoriferum. quod etiam præstantius futurum si aromaticis condiatur, quale quod vulgò Hippocraticum dicitur. Panem in quavis imbecillitate cum alvi fluxu convenit purum esse, & benè fermentatum.

Quando autem imbecillitas jocinoris absque alvi fluxu acciderit, & quidem cum intemperie calida, refrigerantibus erit utendum: veluti in acutis febribus ac in jocinoris inflammatione: cichorio videlicet, dente leoni & similibus. quibus agrimoniam addi non parum conducit, propter eam quam habet attritionem qua jocinoris robur auget ac conservat. Dandum verò & aliquod med. quod bilem, & quæ in primis venis hærent, expurget, ad quod nullum rhabar-

barbaro 20. est præstantius. 20. Nam præterquam
quod eo modo, quo in fe- quod alvū ducit, tonum
bribus aut in inflammatio- etiam hepatis conservat
nibus jocinoris, erit exhi- & auget.
bendum.

Victus ratio frigidior
esse debet: quæcunque ex
hordeo mundato, seu pti-
fana parantur, & cum ipsa
coquuntur, utilia sunt: sic
& lactucam, & cichorium
& similia cum cibis coqui
conducit. Vinum fugien-
dum est & quæcunque ex-
calfaciunt.

Quando autem simul
cum frig. intemperie jecur
imbecillitate laborat; ijs-
dem remedijs erit uten-
dum, eademque victus ra-
tione, quibus in jocinoris
obstructione. Rarissimè si-
quidem frig. intemperie ci-
tra obstructionem jecur
afficitur 21.

A causa frigida.

21. Et aperientia ple-
raq; etiam calidam fa-
cultatem habent.

Perseverante autem diu,
fluxu hepatico tandem jo-
cinoris substantia colli-
quescit, & corpore exte-
nuato, vires vitæque defi-
ciunt 22. Jecur autem col-
liquari excrementa pingua

Prognosis.

22. Præsertim quando
fluxus alvi simul adest.

M m 3

admodum graveolentia biliosa, aut livida, aut nigra, aut viridia ostendunt: veluti dictum ubi de diarrhoea. Citra autem alvi fluorem diu permanentem jocundis imbecillitatem cachexia, aut hydrops sequitur, vel ipsum jecur corrumpitur.

Lect. II. 4. Junii 21.

De Regio Morbo.

I. Ab ictide, seu mustela agresti; vel ab Ictero avicula, quæ & galbulus, seu galbula dicitur; quod animalia ista lurida, seu fellei coloris sint.

Vnde & Aurigo, atque ar-

Cause.

quatus morbus dicitur, quod bilis toto diffusa corpore, tam auri quam arcus cælestis luteum colorem, mentiatur. Vnde & Regius dici potuit, quod Reges in vestib. alijsque ornamentis auratis sæpè conspiciendos sese præbeant. nam quæ de cibis, vino, ludo, lasciviaque afferri solent, longius petita videri possunt. præsertim quum omnes propemodum lingue, non à curationis modo, sed à colore hunc morbum denominare voluerint. Et rei medicæ ignarus fuit, qui Arquatum dictum putavit, quod ita stringat corpus ut in arcum ducat.

Icteros sive regius morbus bilis flavæ per universum corpus est suffusio, cutim luteo colore inficiens, qui etiam in oculorum albo manifestissimè conspicuus est.

Tribus autem modis hunc

maximè

maximè : fieri contingit: vel vitio β folliculi flavam bilem continentis: vel propter jocinoris aliquem affectum: vel critico modo.

Vitio autem folliculi accidit, vel quando ipse præ imbecillitate bilem non attrahit, aut attractum non retinet, vel quando meatus folliculi obstructus per quem sese exonerat & bilem flavam ad intestinum jejunum demittit. hoc enim meatu obstructo bilis ad venas regurgitat & sanguini permixta universi corporis cutim luteo inficit colore. Obstruitur autem meatus à lentis, crassis & frequenter pituitosis : humoribus. obstructionem ostendunt excrementa albidā & nulla bile tincta, album oculorum ex luteo pallescens, urinæ bilio-

2. Sunt quidem & alij modi, sed rariores, ut à veneno vel adsumpto, vel aëri permisto, aut per vulnus immisso. Sic à lepore marino adsumpto ἰοφόεις μὲν ὀπίχλοθ' ἐδερχμε γήοις ἰκτέγοις &c. Et ictus à vipera moritur χερόαν χλοανθής. In Norvegia pluit à nubibus befsiola quadrupes magnitudine soricis, pilo vario, Lemner nomen habet. depascitur omnia virentia. consumpto pabulo moriens aerem inficit. unde vertigine & morbo regio corripitur incolæ. Card. & Scalligero attestante testem occulatum vidi. qui ex rupibus procella ablatos in aquâque delapsos ad terram enatare quasi turmatim referebat.

3. Vindicianus celebris & magnus medicus qui temporibus Augustini vixit, à retentis fecibus bilem in totum corpus exprimi scripsit; sed bile per obstructionem pori non defluente ad Intestina feces retineri magis verum est.

4. Et crasse, similes cerevisie Gedanens. agitate spumam habent flavam.

I. Ab obstructione meatus bilis.

sæ, & quæcunque ipsi intinguntur luteo colore insipientes. &, priusquam hoc colore universum corpus fuerit perfusum, non raro etiam circa ventriculi regionem gravissimi cum angustia dolores.

Ab obstructione autem morbum regium aperientibus & abstergetibus curare oportet. utiles sunt radix feniculi, petroselini, apij, chelidonij majoris, ex herbis hepatoriū vulgare, cucuta, centaurium minus, lupuli folia: quandoq; & marabium. quibus si calor adsit, cichorium, oxalis & similia adduntur. sem. conveniūt anisi, amios, nec non cucumeris, cucurbitæ, melonum & similium. quæ licet non calida, aperiendi tamen vim habent.

Ex his decoctum parari potest, cui addendus syr. acet. comp. aut syr. de Bizant. cum aceto, aut de cichorio cum rhabarb. si calor adsit. In tali decocto incoquere etiam licet folia senæ,

5. Qui syr. propter indurata habent vim aperiendi, & incidendi propter acetum.

senæ, agaricum, & nonnihil
 6. rhabarb. infundere. Fie-
 ri etiam possunt potiones
 ex aquis destillatis hepato-
 rij vulgaris, cuscute, ci-
 chorij. in quibus aliquis su-
 pradictorum syr. dissolven-
 dus, & nodulus imponen-
 dus cum rhabarb. 3 i. aut
 3 i. β. Infundūt etiam non-
 nulli in tali iulapio ramē-
 ta eboris, quæ ad fellis mea-
 tum aperiendū conducunt.
 & talis potio utilis est debi-
 libus & delicatis: sic & gra-
 vidis ictero correptis. Po-
 test verò & purgans med.
 exhiberi ex diaphœnicon,
 aut diacatholicon, addito
 diaprunis solut. ut sit med.
 bilem & pituitam educens.
 Post usum talium remedio-
 rum si urinæ non pertur-
 bentur, quod obstructionis
 permanentis certissimū est
 signum, exhibendus pulvis
 lumbricorū terræ cum mo-
 dico vino, vel solus, vel
 cum specibus dialaccæ. qui
 obstructiones fellis à totius
 suæ substantiæ proprietate
 solvit, meatus aperit, uri-

6. Turbith etiam conve-
 nit pro fortioribus. Ra-
 rō sine rhabarb. mede-
 mur ictero; quia valde
 corroborat hepar præ-
 terquam quod bilem
 educat.

7. Quæ non habent mag-
 nam vim, sed ob tenui-
 tatem syr. deducunt.

8. Proprietate occulta,
 nisi ustum sumatur. nam
 nota qualitas *συνπικνὴ*
 est. ustura empyreumate
 acrimoniam, & aliquam
 aperiendi vim adjicere
 fortè posset.

9. Quia non tantum colorem exhilarant, sed namque ad concoctionem perducit.

& hepar corroborant.

10. Præsertim quæ lutam si restat malus facie color; infuso corticum myrobalanorū, præsertim luteorum ex vino emendari potest. aut usu myrobalanorum conditorū. quorum usu non modo color emendatur, sed à morbo regio huic expositi præservantur.

11. Quia per sudores humores sub cutem latentes expurgantur. Hinc illud fortè Lucilij; Nos esse Arquatos ^{Victus ratio.} surgamus, ea-
mus, agamus. Ita Hippocr. Ictérico prodest laborare, sudare, panem (non mazam, quæ propter cruditatē obstruit) edere; bibere vinum album non multum; lavare caput calida, seu potius tepida multa; somno non multo uti. Epid. l. 7. Cibos, potus affueverunt.

aperiētes laudat Gal. in Ictero qui sine febris cū gravitatis sensu in dextro hypochondrio est. s. de

loc. aff. c. 7. 12. Quia tantū bilis in habitum non diffunditur ut in obstructione.

Ex debilitate. a. folliculi fellis si morbus regius acciderit, alvi excrementa tincta sunt: urina subindè perquam exiguum colorata.

faciei

faciei color ex luteo pallescit, sed minus quā ex morbo regio ab obstructione: adest & nausea, cibi fastidium, corporis pigrities ac tarditas, nec non languor assiduus, citra febrem.

Adversus hunc affectum non est opus multis aperientibus, sed magis roborantibus. quæ & jocinori & fellis folliculo languido prodesse queant, ut sunt diarrhodon, diatrionfantal. & similia elect. vel aromat. rosat. quod ventriculo etiam prodesse potest. Utile verò & subinde levi¹³ aliquo med. alvum expurgare, aut simili enemate eluere.

Cibus sit facilis concoctionis: ut ex carnibus volucrum non¹⁴ palustrium: vel ex carnibus vervecinis. Abstinentum ab omnibus calidis bilem ingenerantibus: qualia ex oleribus eruca, nasturciū, cæpa, allium, & similia: piper etiam, atque hujusmodi aromata non conducunt. Ova im-

13. Nam validiora plus viscera debilitando læderent, quam vacuando prodesse.

14. Palustres enim & succi nō optimi, & difficilis concoctionis esse putantur.

15. *Licet calida minime sint.*

III. Ab inflammatione.

IV. Criticè.
16. *Et Naturam rectè agentem Medicus non impedire, sed iuvare, & dirigere debet.*

V. Aveneno.

probantur : quia facile in ventriculo, quem bilis infestat, corrumpuntur¹⁵. Vinum tenue & album confert. tale enim tenues, serosos ac biliosos humores per urinam deducit, quod hoc morbo laborantibus maxime conducit.

Icterus autem ab inflammatione, aut calida nimis jocinoris intemperie, qui cito intra obstructionem folliculi fellis accidit, & in quo excrementa alvi non albida, sed biliosa apparent; pro affectuum ipsorum ratione curandus, ut ante dictum.

Qui autem critico modo supervenit, curatione non indiget:¹⁶ nam per hunc febres & morbi solvuntur.

Contingit verò & nonnunquam à morfu reptilium, aut à venenis assumptis luteo colore corpus infici. talis autem affectus curandus est remedijs, quæ adversus morsus ferarum, à quibus læsio facta, vel adversus venena conferunt.

Gra-

Gravis autem, diuturnus, *Prognosis.*

& ut plurimum exitialis regius morbus ex obstructione folliculi fellis senioribus est, qui 60. annos superant. Sic & curatu difficilis, quando corona capitis luteo colore infecta est: magnitudinem enim affectus ostendit, & bilis in habitum corporis redundantis copiam. Diuturnus etiam admodum morbus regius est ex imbecillitate folliculi fellis. Contingit autem non raro ut qui hoc laborant, calculos¹⁸ in ipso folliculo natos habeant, ut apertis mortuorum corporibus sæpè apparet.

Quibus autem in febribus morbus regius ante 7. diem supervenit, malum Hipp. 61. aph. 4. vehementem enim excessum caloris, aut magnam in jecinore inflammationem morbus regius ante 7. superveniens ostendit, atque idcirco malus, nisi cum rigore & cum manifesta aliqua evacuatione fiat. tunc enim

17. Quia debilis virtus concoctioni humorum non sufficit.

18. Aut eorundem rudimenta, materia ad calculorum duritiem nondum perducta, ut in Bredanano juvene post frequentia animi deliquia ex Ictero mortuo, corpore ejus dissecto vidimus.

19. Rigor quum fiat ab acri bile partes sensiles pungente, & Expultricem irritante, futura evacuationis signum est: per vomitum, alvi dejectionem, sudorem &c.

20. Nam Inflammationem, aut insignem hepatis obstructionem designat.

21. Nam os ventriculi, cum quo cordi maxima sympathia est, insigniter affici significat.

22. Magnis, quia magna difficulter feruntur, & Phlegmatis intolerabilibus Cornarius.

non malum, sed prodest: ut Hipp. lib. 1. epid. exemplum ostendit Heraclidis, cui 6 die accessit morbus regius cum larga sanguinis è naribus eruptione, alvi perturbatione, & per vesicans purgatione, qui & profuit. Huc facit quoque quod 4. de diæt. in acut. scribitur his verbis: In febris biliosa ante 7. diem cum rigore morbus regius accedens solvit febrem: verum si absque rigore accedat perniciosus. rigor autem non fit absque vacuatione. Perniciosus verò ac lethalis morbus regius in febribus ardentibus habetur, quinto die cū singultu accedens. Hipp. lib. de erisib. Sed si in 22 molestis febribus 7. die vel 9. vel 11. vel 14. morbus regius superveniat, bonum; nisi dextrum hypochondrium durum fuerit. alioqui minimè bonum: ut aph. 64. lib. 4. bilis siquidem per universum corpus distributa corporeque luteo colore suffusa.

uso, si adhuc aliqua in joci-
noro restet quæ tumorem,
aut scirrhum facit; conse-
quens est non solum maxi-
mam inflammationē geni-
tam, sed & multam bilē in
ocinore cōputruisse, quod
natum est. citra autē duri-
em & jocinoris tumorem
liebus supradictis morbus
egius superveniens, bonus
est: sunt enim isti dies in
quibus bonæ crises fiunt, ac
morborū judicia salutaria.

Lienis affectus.

Le&. II 6. Iulij 25.

Lienis affectus sunt aut
inflammatio, aut cum ob-
structione durities, vel tu-
mor sive magnitudo ejus.

*De Lienis Inflam-
matione.*

Inflammationem comi-
tatur febris cōtinua, quæ
amen sub noctē & à me-
ridie vehemētior est quam
matutino tempore. adest
& in sinistro hypochondrio
dolor cum gravitatis sive
ponderis, & quandoq; fer-
voris alicujus sensu, & tu-
mor durus.

1. Quo tempore Melan-
cholici humores moveri
solent.

2. Duritie non vera, sed
ex tensione producta.

Curatio.

Nascitur lienis inflammatio à sanguine crasso, l. omoso, ac fæculento: à bilidid fo aut puriore sanguine vi unquam. A sibi etenim fa miliari, ac quo nutritur san guine, citius ac promptius quam ab alio afficitur.

In hujuscemodi autem inflammatione sanguis etiam detrahendus est, & quidem ex sinistri brachij vena in terna, aut ex vena ejusden manus: quæ juxta minorem est digitum. & si una vice non satis visum fuerit de tractû; reiteranda erit sanguinis missio. Post sanguinis missionem exhibenda erunt, quæ per alvum purgent: initiò quidem leviora, ut ex fol. senæ & epi thymo composita, & quandoq; addito agerico, quæ infundi aut macerari possunt in aquis destillatis; aut quod longe præstat, coqui simul cum rad. & herb. non vehementer calfacientibus, quæ spleni conducunt; ut sunt rad. fœniculi, polypodij, fumus terræ, cuscuta,

scolo-

3. Crassior tamen sanguis commodius ex brachio educitur. quin & vena quæ in manu secatur alterius venæ ramus est, Cephalica nempe.

4. Quia cruda adhuc materia, minorativæ dictæ purgationes tantum conveniunt. Validiores enim movendo vim afferunt, nec tamen peccantem humorem amoveant.

5. Nam tam qua Purgat; pituitam nempe hic non peccantem; quam quod insignem aperienti vim habet.

scolopendrium quod cate-
rach Offic. appellant, ca-
pillus veneris aut ruta mu-
raria, borago, buglossum:
quibus etiam cichoriū, oxa-
lidem aut similes addere
utile erit, si febris vehemē-
tior fuerit. Levioris verò
purgationis loco & dia-
cathol. exhiberi potest per
se, vel addito pulvere fol.
senæ, vel cum tali, quale
jam dictum est, rad. ac her-
barum decocto. Processu
verò temporis posteaquam
concoctionis signa appa-
ruerint, validiora erūt med.
exhibenda: poterunt tunc
cortices rad. capp. hepa-
tor. vulg. chamædrys, su-
pradietis addi, & veratrum
nigrum quoque admisceri,
aut confect. Hamech. At-
que hujuscemodi purgatio-
nes sæpius dandæ: nam
quum lien per vias urinæ
expurgari nequeat, fre-
quentius per alvum expur-
gari debet: ut Gal. 13.
meth. scriptum reliquit.

Intermedijs autem tem-
poribus, & præsertim prius

6. *Alij dant etiam cas-
siam, quam tamen non
laudo; quod status ex-
citet.*

7. *Nam gradus pur-
gantium concoctionis
gradui proportionatis
esse debet.*

8. *Emulgentes enim d
Cava; Splenicæ vena d
Porta originem ducunt.*

quam validiores purgationes sint exhibendæ, offerendæ sunt quæ humores præparare & inflammationem fervorē remittere queant, quale est decoctum ex radicibus & herbis supradictis, in quo dissolvendus syr. acetosus compos. aut oxymeli compos. aut syr. de succo fumariæ terræ, quibus addendus syr. ex cichor. si febris vehementior.

9. Quorum calor non usque adeo metuendus, quod sanguis qui in, & circa lienem reperitur feculentus, ideoque minus calidus sit.

Profunt verò & in hujusmodi visceris inflammatione fontus, aut unctiones ex ol. charadriæ, mæmelino, aut anethino, aut utrisque addito ol. rosaceo, aut si calor non obstet ol. absinthij: ut videlicet relaxantibus adsint astringentia visceris robur conservantia. neque enim lien non minus quam jecur solis relaxantibus curari debet: ut Gal. loco jam dicto. additur verò nonnihil vini albi, aut aceti ut oleorum vis ad lienem facilius deducatur. Potest verò & ol. loco cataplasma imponi ex rad. althææ decoctis & farina

ina hordei, sem. lini, ac se-
minis fœnugræci cum exi-
gua quantitate flor. cha-
mæmeli & rosar. rubrar.
quæ cum aqua decoctionis
rad. decoquenda addito
postea ol. rosaceo, aut de
absinthio, nisi calor obftet.

Victus ratio ferè qualis *Victus ratio.*

in inflammatione jocino-
ris : non tamen usque adeo
tenuis, nam morbus lon-
gior est : minus etiam fri-
gida esse debet. minus
enim calet causa inflam-
mationis. Vinum album &
tenue sedata nonnihil in-
flammatione, negari non
debet. cappares¹⁰ cum ci-
bo laudantur. Abstinen-
dum ab omnibus quæ in
quartanæ curatione fugien-
da esse dictum est.

*10. Quia obstructiones
tollunt, quæ cum hac
inflammatione conjun-
guntur.*

Inflammationi autem lie- *Prognosis.*

nis hæmorrhoidum fluxus
supervenienti, utilis est: ut
fatis ostendit Hipp. aph. 11.
6. lib. ubi ait, hæmorrhoi-
des melancholicis super-
venire, bonum : expurgan-
tur siquidem per has hu-
mores crassi ac melancho-

*11. Per quem sanguis
crassus & fervidus eva-
cuari solet.*

Nu 2

lici: quales in lienis inflammatione, & in scirrhotumore non minus expurgari & evacuari conducunt quam in appellata melancholia.

1. Conjunguntur hæc, quia venæ hic, non affecta substantia, vix tali modo affici possunt.

Qui autem indurata Splenis affectione laborant, Splenici dicuntur. Alicubi ut in Cauno Lienosi gignuntur. Pel-la itidem multos Splenicos habuit.

2. Iam quasi Zona liene cinctus ambulo (Lien tumido circumligat Ilia vinclo) Geminos in ventre habere videor filios Plaut. in Curcul. Hinc τέλειοι σπληνίγῃ, nec olfacere, h. e. anhelitum ad olfaciendum profundum ducere, nec ridere, nec sternutare possunt. Horus.

3. Propter obstructions, quod crassum, & tingens est, discernentes. 4. Quartana: in qua die præcedente febrem sunt crude, sequentibus sunt colorate, crasse, turbate.

Curatio

De Lienis Scirrhotumore & Obstructione.

Quando lien durior factus est, tunc scirrhotum laborare dicitur. Indurecit autem ab humore crasso, viscido & melancholico: quando videlicet a hujusmodi humore meatus ejus ac pori obstruuntur & substantia impletur. Adeo tunc in sinistro hypochondrio gravitatis quidam sensus, & si non obstet abdominis crassities, etiam manuum durities lienis sentire potest.

Urinæ frequenter admodum tenues: & diluti coloris: nisi adsit febris.

Curatio autem scirrhi
 lienis per ea fit, quæ cras-
 sos humores diffecare &
 obstructa aperire queant:
 qualia sunt ad jocinoris
 scyrrhū, & obstructionem
 utilia: quibus tamen tanto
 valētiora lieni esse debent,
 quanto crassiore utitur ali-
 mento: ut Gal. meth. 13.
 Præter ea ergo quæ adver-
 sus jocinoris obstructiones
 profunt, ad lienis scyrrhum
 conducunt cort. rad. cap-
 parum, cortic. rad. mori ar-
 boris, cortices tamaricis,
 chamædrys, hepatorium
 vulgare, thymus, epithy-
 mum, scolopendrium, hæ-
 mionitis, phyllitis, sem. vi-
 ticis seu agni casti, sem. ru-
 tæ. Ex compos. syr. de
 epithymo, aut aliquis ex su-
 pradictis componendus:
 dialacca, diacurcuma; &
 inter purgantia diasena,
 confect. hamech. pill. de
 hiera cum agarico præfer-
 rim addito ammoniaco,
 pill. de serapino, pill. ag-
 gregat. Confert verò &
 aquæ ferratæ ? frequens

5. Medetur lienibus
 Teucrium: constat sic
 inventam: quum exta
 super eam projecta es-
 sent, adhæsisse lieni,
 eumq; exinanisse, ob id
 à quibusdam Splenium
 vocatur. Plin. l. 25. c. 5.

6. Asini splenis tumo-
 rem, Asplenon edentes,
 finiunt.

7. Seu spontè tales pro-
 rumpan & naturales
 sint, ut aquæ Spadanæ;
 seu arte parentur.

N n 3

8. *Alia enim viscera nequaquam inflāmant, quum regioni Lienis, reliquis partibus intactis, admoveri possint.*

9. *Quod magis emollit quam oleum commune.*

continusque usus. Atque hujusmodi remedijs : quæcunque ex ipsis confici possunt uti licebit quando febris quartana non obstat : cujus prima ac potior ratio habenda est. Exterius autem remedijs, etiam perseverante quartana, ut licet : ut unctione ex oleo capp. liliorum, rutaceo, vel illo rutaceo quod ex ol. seminis lini paratum est, de quo in jecinoris scirrho. Vel empl. aliquod lienis regioni imponendum : veluti ex ammoniaco, vel empl. de meliloto per se, vel cum empl. de muccilag. permixto.

Victus ratio qualis in obstructione jecinoris observari debet : paulo tamen calidior : aut qualis in quartanis. Capparorum in cibo usus utilis est : Hipp. verò & raphanidis rad. crudam, & apium in aceto intincta edenda consulit : quorum loco nasturtio, aut dracone herba uti non fuerit absurdum.

De

De Magnis Lienibus.

Magni lienes ab Hippocr. dicuntur, qui præter quod multo crasso ac melancholico sanguine obstructi repletique sint, etiam tumidi & valde distenti facti sunt: ex copia videlicet affluentis crassi humoris, quo gravati tandem etiam sphacelo corripiuntur.

Manifestior autem lienis magnitudo, quam scirrhus: nam tumor etiam foris quandoque prominet, & tactu facilius quam scirrhus deprehendi potest: color faciei lividus ac, ut Hipp. aut molybdoïdes, sive plumbi colore: & quandoque idem ait, partes sub oculis attolluntur. Consequuntur autem magnos lienes vel sanguinis per vomitum eruptiones, vel oris & gingivarum graveolentia cum livoribus aut ulceribus: tibiæ, ut in lib. prorrh. Hipp. ostendit.

1. *Non duri nisi valde distendatur à nimia multitudine. Et in isto à Scirrhis lienibus differunt.*

2. *In scirrho plerumque lien non sit manifesto major, sed quandoque etiam minor.*

3. *Vt plurimum in tibijs: quandoque tamen in alijs etiam partibus.*

N n 4

4. Quia humores delati ad cutem in talibus, permixti sunt bili. Libro de affectionibus eadem dicit. part. 19.

Ulcera autem his fiunt qui biliosi sunt & temperamento ut Hipp. lib. de internis affect. ait: Quicumque, inquit, splenem habent magnum siquidem biliosi sunt, hi mali coloris sunt & malis ulceribus scaturient.

Quomodo autem curandi sint quibus sanguis per vomitum eruperit, dictum ubi de sanguinis vomitu.

Oris graveolentiam cum tibiæ ulceribus aut livoribus Hipp. ileam appellat hæmatitem, sive vulvulum sanguineum: recentior ætas Scorbutum & ex prava victus ratione, atque ex frumento; & maxime fecali corrupto, originem hunc habere censeo. Hipp. verò & ab oleorum usu fieri: & ab aquæ potu lib. de internis affectionibus scribit. In lib. de aëre, aquis, & locis, bibentibus aquam palustrem ac stagnantem splenes ait fieri magnos.

Curatio

5. Idque non malè: nam vidi mortuum ex hoc morbo, cui maximus dolor in ventre aderat. R. D.

6. Vel Scorbucum, quasi ventrem lacerans, seu ut Olaus interpretatur, saucians.

7. Crassum enim succum gignūt: præsertim brassica & atriplex.

Curatio hujus affectus Lea. 118. Iunij 28.

usu aliquot herbarum fit: ut 8. Commendatur raphanus major; succus cochlearia, nasturtium hor-
monum, atque arantio-
ense, & vulgo dicta beca-
rum. Utitur plebei Sedo
bunga, quæ tamen reliquis
minimo: verum ejus usus
est minus potens⁸. harum
non admodum tutus est.
aninus, vel plurium⁹ deco-
ctione vim suam amit-
tum ex lacte¹⁰, vino, aut
tunt, ut raphanus ma-
sero lactis pro tenuioribus
jor, cochlearia &c. Ille
ingulis diebus bis tervè
itaque liquorib. potius
haustum, conducit. sic &
immacerandus: hujus
succus earundem cum sero
succus expressus iisdem
aut lacte propinatus. fiunt
immiscendus. quamvis in
ex ipsis & conservæ. quæ
delicatiores. etiam sola
hyberno tempore, quum vi-
ejusdē maceratione con-
rentes herbæ haberi ne-
tenti esse possimus.
queunt, propinantur. Con-
10. Ditiore pro his vino
ducit. quoque easdem her-
Gallico albo utuntur.
bas cum absinthio coqui:
Lac minus probatur
& absinthium¹¹ vulgare,
propter caseosas partes,
præsertim in ipsius initio
quæ obstructions, nisi
quovis modo exhibitum, in
separentur, augere pos-
progressu etiam alijs utili-
sent.
ter admiscetur.

Exhibenda præter hæc 11. Quod Romano, seu
purgantia medicamenta, Pōtico dicto, idēd præ-
quæ crassos faculentos & stat; quod non solū ape-
& detergeat, sed
& corrobores. 12. Valide purgantia qui Scorbulo la-
borant, non ferunt: quod cor affectum, vitalemq; facul-
tatem debilem habeant.

melancholicos humores ex
purgant: veluti compositoque
ex folijs senæ, epithymenij
addito veratro nigro si nece-
ssitas postulat. quibus deinde
conf. Hamech admiscebimus
utile erit. qualia purgantia sunt
non modo in principio, sed
& in progressu ac intermen-
dijs temporibus etiam ex-
hibere expedit.

Providendū ori est co-
lutionibus. quæ cōponen-
dæ sunt partim ex ijs quæ
calfaciūt, partim quæ astrin-
gunt, & partim abstergent
ut ex rosmarino, salvia, thy-
mo, hyssopo & similibus, in
aqua decoctis: quibus ad-
dendum aliquid aluminis:
deinde addendum meli-
rosaceum vel aliud repur-
gatum: adduntur gallulæ
seu nuces cupressi, vel cor-
tices malorum granato-
rum: deinde & cubebæ.

Livoribus¹⁴ in cruribus
aut alijs corporis partibus
apparentibus, non opus est
remedia adhibere. cito
enim quotidiano usu su-
pradiet. herbarum evanes-
cunt.

13. Sunt qui & Ægy-
ptiacū immisceant. cu-
jus tamen usus nisi in
magna necessitate, pro-
bandus non est.

14. Quando scilicet li-
vores tantūmodo sunt.
testantur enim Expul-
tricis vigore crassiorem
materie partem ad ex-
tremas partes à nobi-
lioribus, propulsam.

eunt. sunt tamen qui velint
has partes foveri decocto
baccarum juniperi, absin-
thij, nasturtij aquatilis, &
flor. chamæmeli: aut inun-
gi ung. compos. ex butyro
insulso, juniperi baccis, &
vino albo decoctis. Ulcera
si quæ facta fuerint, pro
conditione curanda sunt.

Victus ratio sit ex opti-
mis carnibus: citius volu-
crum ¹⁶ non palustrium
quam aliorum animalium:
panis quoque ex optimo
tritico, aut alio bono, co-
cto & fermentato. Vinum
album & tenue convenit.
abstinendum ab oleribus,
præsertim atriplice & bras-
sica: tum & à piscibus præ-
sertim stagnorū, aut litto-
ralibus, tum & ijs qui circa
fluviorum ostia versantur:
tum & omnibus impensè
dulcibus ¹⁷, caricis, uvis
passis, vino dulci crasso.
Exercitium validum ¹⁸ con-
venit si fieri potest: nam
ut Hippocr. ait: Curatio
hujus lienis affectus phar-
macis, edulij, & laboribus

¹⁵. Advertendum ne
Gangrana succedat, ut
aliquando in majoribus
fieri solet.

¹⁶. Quod minùs ex-
crementitiū alimentum
præbeant.

¹⁷. Quod obstructions
facere, vel augere so-
leant.

¹⁸. Μόλυσσις namque,
sive cruditas proxima
hujus morbi causa. exer-
citiū autem concoquen-
tem calorem exsuscitat.

Prognosis.

19. Propter causæ peccantis crassitiem & immobilitatem.

20. Et sic quidem ut de repente concidant mensæ adsidentes, aut aliud quid agentes. quod in Islandia sæpius contingere oculati testes, fideque digni narrarunt.

perficitur. Conveniunt laboriores & exercitia maxime ijs, qui sunt natura pituitosissimi, minimè qui natura biliobiles, ut in lib. de affect. scribit.

Diuturna est affectio, & morbus est qui multum in curatione habet opus: quod nisi pharmacorum usu, & bona victus ratione emendetur, lethalis. Quibusdam verò & in hydropem transit: maximè post sanguinis vomitiones, ut etià dictum ubi de sang. vomitu.

De Cachexia.

1. Eæ inter alia & corporis illas designat partes, quæ exterius conspiciuntur: Habitum corporis interpretari solent. hujus vitiata constitutio, Cachexia dicitur: quæ ab Anasarca gradu magis, quam specie differt.

2. Quod crudi, serosi, humores os ventriculi

laxent. 3. Pulmone propter raram suam, ichorib. quasi turgente.

HYdropem & præcipue hypofarcam præcedit Cachexia, sive mala corporis valetudo: nam dispositio est, ut ait Avicenna, hydropem antecedens.

Apparet in hac facies pallidior, corpus solito albidius, caro mollior sentitur, adest frequenter cibid.

fastidium, respiratio difficilior,

facilior, vires debiles: pedes
frequenter sub vesperam
intumescunt: per alvum
quandoque & cruda def-
cendunt: urinæ etiam cru-
ditatis notas habent.

4. *Sero pondere suo,
dum erectū habet æger,
ad declivia vergente.*

Sequitur autem cache-
xia jecinoris imbecillita-
tem; quando propter ejus
intemperiem frigidam, san-
guis probè & perfectè ge-
nerari nequit: sed frigi-
dior, serosior, ac pituitosior
in venis colligitur: qui per
universum corpus distri-
butus, quum ad ipsius ali-
mētum sit parum idoneus,
illud mollius, laxius, ac pal-
lidius reddit. Post longio-
res morbos, veluti dysen-
terias, lenterias, diurnas
febres cachexiam sequi
contingit: sic etiam non
rarò post immodicas san-
guinis profusiones super-
venit.

5. *Qui humidum radi-
cale, caloremque nati-
vum, minuunt.*

Curatio per calfacientia
& resiccantia fieri debet,
veluti in imbecillitate jeci-
noris quæ à causa frigida.
Tantò autem calidiora hu-
jus remedia esse debent

Curatio.

6. *Hæc compos. ventriculi, & Intestinorum ex frig. intemperie, humidaque debilitati specialiter dicata est, ut & Diatrionpipereon.*
7. *Si hypochondrium propter obstructions, aut flatus tensum sit: nam rhabarb. tantum non habet, ut purgare ullo modo possit.*
8. *Vel agarico in vino infuso, aut Mexicana radice.*
9. *Nam fibræ viscerum etiam sine istis ab aquea pituita satis laxata sunt.*
10. *Quod siccus nutrimentum habeant.*
11. *Quod alimētali succo minus circumfluant.*
12. *Medicorū consilium secutus, Paulam ē febris curatam monui, ut vinum biberet, ne in hydropem abiret. Hieronym. in epitaph. Paulæ ad Eustoch.*

quantò hepar magis refrig. geratum est, & morbus diuturnior. ⁶Diagalanganthum, vel etiam diacalamentum, vel etiam diatrionpiper. &, si alvus durior, dialacca, utiles ac cachexiam compositione sunt. Purgatibus med. citra necessitatem non est utendum: & si quādo opus fuerit non nisi leviora danda: vel luti & vinum infusionis fol. senæ, vel vinum infusionis rhabarb. A laxantibus abstinentū, ut manna, cassia, fyr. de infusione rosarum.

Victus rationem cal. & siccam esse convenit: à juvenulentiis quantum fieri potest, abstinendum: utendum assis. cibi condiendi sunt aromatis; ut pipere, zinzibere & similibus, vel herbis calidis, iisque aridis potius quam virentibus, ut origano, hyssopo, thymo, rosmarino, satireia & similibus. Vinum convenit album, tenue, sed generosum. Oportet in cibo & potu parcum esse: nam, ut Hipp. ait: Carnes habent

bentibus humiditas famem
 adhibere convenit. fames
 etenim corpora siccant. qui-
 bus verbis non solum cibi
 parcimoniam, sed & potus
 indicitur. quum enim cor-
 pus per famem resiccandum,
 potus maximè vitandus.
 nā hic citius ac promptius
 corpus implet ac hume-
 stat quam cibus, ut testatur
 Hipp. Facilius est, potu im-
 pleri quam cibus.

Valde conducunt labo-
 res & exercitia, præser-
 tim in jejuno corpore facta.
 Conveniunt etiam balnea,
 præsertim, ut Paulus Ægi-
 meta ait, aluminosa, sulphu-
 rea, nitrosa. Conveniunt ea-
 dem de causa & alia resic-
 candi vim habentia: ut est
 balneum in aqua marina cali-
 da, quod à multis com-
 mendatur.

Cachexia magnitudine ab
 hyposarca differt. quia initiū
 hyposarces est Cachexia.

De Hyposarca.

Cachexia si diu consi-
 stat in hyposarcam ut

13. Nam serum redun-
 dans sensibiliter, atque
 insensibiliter, exbau-
 riunt.

1. Dicitur σαρκίτης,
 ὑποσάρκιδι, ὑπο-
 σάρκα, Ἀνασάρκα, vel
 potius, Ἀνά σάρκα, vi-
 delicet ὑδρωψ. quo po-
 stremo vocabulo disper-
 sio aquosi seri per carnis
 poros optimè videtur
 exprimi.

2. Tum propter suffusum
 Φλέγμα λευκόν; tū pro-
 pter emortuū quasi ca-
 lidum nativum. Hinc il-
 lud; Aquosus albo cor-
 pore languor. Atque il-
 lud. Turgidus hic epu-
 lis, atque albo ventre la-
 vatur.

3. Quia collecti sunt hu-
 mores non, ut in ascite
 intra peritonæum, sed
 extra illud intra cutem.

4. Et ante illum autor
 libri cui titulus, Medi-
 cus, c. de humoribus.

5. Cap. 6.

plurimum transit. in hac
 cies, crura, pedes, brachia
 ac universum corpus
 met, pallidum ac vel
 emortuum apparet. impru-
 forum digitorum, vel alis
 rius rei vestigia diutine
 tinet. tumet verò & ve-
 ter, sed multo quam in
 cite, minus: & ab aquo-
 frigido humore per unive-
 sum corpus diffuso origo
 nem habet. unde & Hypo-
 sarca dicitur. quod videli-
 cet sub carne, vel juxta ca-
 nē humor iste contineatur
 Appellatur verò & Leucop-
 phlegmatia ab ipso albidis
 pituitoso humore. humo-
 autem iste partim à jocin-
 re malè affecto in habitum
 corporis differtur, partim
 ex ipsa carne veluti i
 aquam resoluta emanat, u-
 Paulus ait 4. Afficitur au-
 tem jecur quandoque per
 se & primario: quandoque
 verò per cōsensum. prima-
 rio & per se afficitur, quan-
 do intemperie frigida labo-
 rat: tunc enim ut Gal. 5. de
 loc. aff. qui in corporis
 partes

partes succus distribuitur in
 sanguinem transmutari non
 potest. & refrigeratur quo-
 que corporis venæ, idq; ma-
 ximè quum nullo in joci-
 nore tumore apparente la-
 borans hydropes molestari
 videtur. Per consensum ve-
 næ quando per lienis cau-
 sam, vel ventriculi, vel in-
 testinorum, mesaraicæ ve-
 næ hectica .i. confirmata
 intemperie frigida laborant;
 aut quando vel pulmonis,
 vel septi transversî, vel re-
 num occasione venæ quæ
 in jocinoris gibba parte
 eodem afficiuntur modo.
 Quibus verbis Gal. osten-
 dit se omnis hydropis cau-
 sam in jocinoris refrigerationem conjicere: quod
 quidem in hyposarca veri-
 tatem habere potest, sed
 non in ascite, aut tympani-
 te: quorum causæ aliæ sunt,
 ut suo loco dicetur.

Refrigerari verò & per
 consensum jecur Gal. sen-
 tit, quando plurimus san-
 guis per hæmorrhoides ex-
 cernitur, aut ob muliebrem

6. Et merito neque enim
 αἱματωσίνης lædi po-
 test; nisi affecta illa par-
 te, quæ Sanguificationis
 officina existit: nec di-
 minute coctus sanguis,
 nisi ob refrigeratum ca-
 lorem concoquentē. Ita-
 que causa proxima om-
 nis Hydropis frigida
 est; Antecedens in As-
 cite etiam calida esse
 potest.



7. Μεγάλη διάθεσις,
h.e.vehemens, & confir-
mata in utero præter
naturam cōstitutio pri-
mò illius, mox & alia-
rum partium, præsertim
Hepatis, cui ob magni-
tudinem venarum con-
sentit, calorem natura-
lem aut dissipat, aut
suffocat; ideòque refri-
gerat.

8. Intempestiva san-
guinis missio in
alijs pericu- Curatio.
lum; in Hydrope etiam
interdum mortem indu-
cit. Mittendus igitur
ante alia præsidia, præ-
sertim validiora, in qui-
bus maxima obstructio,
inflammatio schirrosa,
cū validis viribus. Alex.
Trallian.

profluvium, aut quando
continentur menses, aut præ-
ter aliam ingentem uterini
dispositionem. Hipp. verò
& hæmorrhoidum suppressio-
nem hydropis causari
esse posse aph. 12.6. oste-
dit. Et revera quidem per
hujuscemodi sanguinis vici-
cuationes jecur & debilitas
redditur, & insigniter re-
frigeratur, succedente non
raro hyposarca, si modum
lien nullo affectu laborans
Propter mensium verò re-
tentionē, aut hæmorrhoidum
suppressionem rarius
hyposarca, frequentius as-
cites succedit. sanguis siquid-
dem retentus ad lienem re-
gurgitans hunc obstruit &
tumorem in eo excitat.

Sanguinis missio autho-
re Gal. interdum utilis est,
in hyposarca quidem quæ
propter hæmorrhoides aut
menstruas suppressas pur-
gationes acciderit, si ad sint
redundantis sanguinis &
plenitudinis signa. & mox
initio ipsius mali fiat. quan-
do videlicet non nisi ca-
chexia

Chexiæ adhuc signa appa-
rent. tunc enim sanguinem
detrahere expedit. sed ta-
men non multum una vice,
tutius enim est sanguinis
missionē reiterare, & quod
gravat paulatim detrahere.
sic enim nec vires valde
dejiciuntur, nec jecur ni-
mium refrigeratur. Quan-
do verò ab aliqua occasio-
ne alia hyposarca succeffe-
rit, à sanguinis missione erit
abstinendum; non minus
quam in ascite aut in tym-
panite. quos affectus nullus
per sanguinis missionē sa-
nare est ausus, ut Gal. ait.
Med. purgantia in Hypo-
sarca ex quacunque occa-
sione facta fuerit, exhiben-
da sunt: non tamen admo-
dum, vehementia. & quæ
simul jocinoris intempe-
riæ frig. corrigere queant,
ut el. diaphœn. elect. In-
dū, species diaturbith cum
rhabarbaro; aucta nonnun-
quam tamen ipsius rhabar-
bari quantitate.

Quod si verò & in ven-
tre humores aquosi col-

9. Propter virium ex
Alimenti vitio, debili-
tatem insignem.

10. Species enim hydro-
pis plerumque compli-
cant; ut in puella cujus
cute & musculis dissectis
multum quidem, sed se-
ctione penetrante in ab-
domen, integræ urnæ
humoris aquosi proflue-
bant.

〇 〇 〇

11. *Affyrus adolescens Apollinem curationem hydropis efflagitans ab illo ad Apollonium mis- sus est. is illi dixit; Apollo sanitatem tibi pollicetur, sed non dat: volentibus enim tantū il- lā tribuere solet. tu au- tē omnia facis quæ mor- bo penitus adversantur delitijs enim abundas, perpotationibus indul- ges; & madentibus ac penè corruptis intestinis cibum veluti lutum in- geris. Hac monitione ip- sum ad sanitatem re- duxit. Apollonius apud Philostratum.*

lecti fuerint diacartharum utiliter dabitur, aut alijs ac miscebitur. à fortioribus hydragogis abstinendum ex elect. conveniunt dioscori curcuma & dialacca, quæ vim habent aperiendi & bibaci resiccandi: quibus & facis vini arida admisceri potest: quæ in cachexia & hydropsi posarca valde utilis esse aili Commendatur & absinthii usus: præter enim quod calfacit & jecur & lienes roborat.

Victus rationem siccare & calidam esse oportet, veluti in cachexia: cibi & idcirco maximè potus parcimoniosus valdè conducit: sudores, labores, & exercitia multum tū conveniunt: & quæcunque excalfacere & resiccare universum corpus queant.

De Ascite.

1. *Ἀσцитὶς non utrem tantū, sed & corpus hominis vel mortui, vel vivi significat; præsertim ipsum Abdomen, seu ven-*

A Scites hydropis illius species dicitur, in qua venter utris alicujus instans totus distenditur & aquoso humore cum subjectis uterque pluri-

plurimum partibus impletur, superiores verò extenuantur & contabescunt.

Colligitur autem aquosus iste humor in ventre intra peritonæum & intestina reliquaque viscera. Causa non est aliqua jocinoris intemperies, neq; tumor aut exulceratio ejusdem; nisi forte durties aliqua: in

2. Vide Gal. 2. de facul. natural. c. 8. ubi Erasistratū Sirrhum jecoris unicam Hydropis causam statuentem im-
prehendit.

gibba ejus parte, & tanta quidem ut impediat humores ad cavam venam deferri, sic ut regurgitantes per mesaraicas venas in ventris cavitatem incidant: veluti contigisse videtur Bello Armato, cujus Vesalius meminit; in cujus tamen ventrem non aquosi humores, sed sanguis confluxerat, eò loci quò aquosus humor in asciticis colligi solet: ut Vesal. latius refert in lib. de Chyna. & atque idcirco solus jocinoris affectus ad ascitis generationem non videtur sufficere: nisi simul lien male quoque affectus ac tumi-

3. Vidi quorum jocinora erant sphacelo corrupta, alios quorum ulcerata, qui tamē nunquam hydropici: nullius tamen corpus ascitici apertum cujus lien non tumidus & magnus R.D.

4. Gal. sæpè liene ad-
modum schirrhoso, hy-
dropè non subsecutam,
vidisse se testatur. •
Præfag. expulsib. c. 9.

5. Emulgentes enim ex
Cava, Splenicæ ex Por-
ta Vena originē ducunt.

us magnusque redditus
fit. qui etiam solus ad a-
citis generationem & aquos
intra peritonæum collectio-
nem sufficere potest
nam quum lien rarus, mobilis,
ac spongiosus sit benedi-
quidem & secundum natura-
ram sese habens melancholico-
licos humores ad se per-
trahit. hoc enim ejus effe-
officium Gal. testatur 6
de loc. aff. malè verò affe-
ctus etiam crassio rem san-
guinem initio attrahit : per-
quem mole auctus mag-
nusq; factus, non solum san-
guinem, sed & serosos hu-
mores attrahit : ut ex Hipp.
lib. de morbis muliebr. &
ex alijs ejus locis cognosci
potest. Quum autem nulla
ex liene sit via, per quam
humores isti attracti ad re-
nes pervenire, aut demitti
queant; ut etiam Gal. testa-
tur, nec in liene contineri
possint, necessario in vètris
cavitatem incidunt eum-
que utris modo distendunt,
inferioresque partes im-
plentes tumidas eas red-
dunt

dunt: crura videlicet, & scrotum in viris.

Ad curationem autem ascitis non parum refert qualis affectus præcesserit: nam qui post acutas febres, & præsertim post regium successit morbum; aliter curari debet, quam longioribus febribus, aut diuturnis lienis morbis superveniens.

Ascites igitur qui febribus successit diutinis, veluti tertianis impuris; initio ubi jam febris desijt, una aut altera exhibitione diacarthami subinde curatur: si intermedio tempore & post purgationem dialacca, vel simile aliquod med. exhibeatur; observata bona victus ratione, ut in cachexiæ curatione, dictum. Profuit & multis hujusmodi conditum. & Conser. rosmarini, cons. majoranæ ana ℥ 1. spec. dialaccæ ℥ β. aut ejus loco diaturbith Mes. vel utriusque ana ℥ 2. tartari sive facis vini albi ℥ β. quæ si usta

Curatio.

6. *Raro enim non præcedente alio affectu supervenit.*

1. Ascites quæ post longas febres curatio.

7. *Cujus loco utimur diacurcuma, si non haberi queat. extat autem compos. apud Gal. & τόν. 8. Mirabilis Pharnacis Rhizotomi ex Andromacho descripta eadem ferè ingredientia, quæ & Diacurcuma, habens.*

8. *Detergendo laxat alvum, obstructions tollit, atque Intestina siccat.*

* Quæ initio, & quum vires adhuc constant cū utilitate dantur: El-leborū frustra quum jam cutis agra pascentes videas: Venienti occurrere morbo. Quam quidē monitionem, sed nō & El-lebori probamus usum.

2. Quia valde calida, nocet jecori & visceribus interioribus.

10. Succus concretus qui ex India nuper afferri cœpit, quem Gettagemu appellant, & per excellentiam Hydragogus dici non immeritò posset, à g.x. ad xv. datus aquas meracas citra Violentiam, ducit. Exhibetur autem vel per se, addito cordiali aliquo, ut cinnamomo; aut cum alijs elect. vel pilulis.

fuerit efficaciorē reddere compositionem: cum sy de Bizant. hæc miscentur datur singulis diebus mane instar nucis, aut 3 ponderis. Aperit istud coroditum obstructions lienis ac jecinoris, & aquosos humores paulatim resiccet cat.

Post quartanas autem, & post diuturnos lienis affectus si ascites sequatur, non modo quæ dicta sunt; sed frequenter etiam validiora requiruntur * medicam. si itaque supradicta non suffecerint, poterit ad expurgationem aquosi humoris dari succi iridis postquam resederit 3 β. aut 3 6. cum æquali quantitate feri lactis, aut cum aqua cichorij, aut simili aliqua alia; ut videlicet calida ejus vis nonnihil reprimatur ac contēperetur. Vtiles etiam sunt 10 pill. de mezereo Mesuæ: quibus si addatur succus gratiolæ resiccatus, efficaciores reddentur.

Sunt verò & alia hydrago-

ga ut ebuli, bryoniæ radix,
 interior virēs sambuci cor-
 rex, brassica marina 11 sol-
 lanella dicta, laureola, thy-
 nelæa, chamælæa, succus
 cucumeris silvestris qui re-
 siccat elaterium dicitur.
 Omnia autē hæc valde ve-
 hementia sunt, & cum mo-
 estia magna purgant; præ-
 sertim si nō fuerint præpa-
 rata, aut aromata, vel alia
 nō fuerint addita, quæ ipso-
 rum malignitatē reprimant,
 itq; aliquo corrigant mo-
 do. Quibus autem hujusce-
 modi validiora displicent,
 aut vires ad sumenda non
 sufficiūt, illis quod sequitur
 exhiberi potest & Sem. sam-
 buci aut ebuli in aceto ma-
 cerati, tartari vini albi, ana
 ʒ 1. sem. anisi ʒ 1. aut 2. 13 f.
 pulvis ex quo singulis die-
 bus. ʒ 1. aut 1 β. detur cum
 modico vino: paulatim
 pulvis iste purgat, & aquo-
 sos humores absque mole-
 stia deducit.

Admovenda verò & to-
 pica quædam ventri sunt:
 veluti fomenta ex milio aut

11. *Decoquitur in jure
 carnis, vel succi ejus ex-
 hibetur. perturbat ta-
 men corpus. quod etiam
 Dioscorid. scripsit.*

12. *Elaterium apud nos
 cōfectum plerunq; inef-
 ficax. Itaque caven-
 dum ne si id minori dosi
 exhibeatur, nihil; sin
 majori, & exoticum
 rectè factum indatur
 medicamentis, nimis
 agat.*

13. *Potest etiam simul
 addi aliquid cinamomi;
 & sacchari, quibus id
 placet.*

Topica.

14. Quod etiam Aët. commendat . nominat autem binem.

15. Ad imitationē Heracliti, qui stercore seu fimo vaccino oblitum abdomen solis radijs objecit, & imbre serenitatem fecit. h. e. curatus est.

16. Opobalsami loco sumimus ol. laurinum, aut styrac. liquidam.

17. Vel aliquid Vng. de arthanita misceatur, aquas enim ventrem sufflantes, distendentesq; proturbat.

I I. Post ardentem febrem vel iæterum,

malto¹⁴, aut ex sem. cymini, lauri baccis, florib. cadi, anethi contusis in sacculo cōfutis; qui reump vini madefactus ventri imponendus. Vel cataphra¹⁵ admovendū ex farina hordei, aut potius malti, cum stercore caprae aut vacci¹⁶ vel utriusque in lixivio quercus decoct¹⁷ addito sem. cymini, sulph¹⁸ re quibus odor non est ma¹⁹ lestus, & oleo rutaceo, laurino & liliorum. Potest empl. Aristarchi¹⁶ cuius descriptio apud Mesuem exhiberi. nec inutile empl. de meliloto. Ven¹⁷ trē & hypochondria inungi gi etiam conducit ol. rutaceo, laurino, & liliorū; praefertim si non nihil¹⁷ colocyinthidis cum aqua vitae¹⁸ ipsis fuerit incoctum.

Victus ratio veluti in Cachexia convenit.

Quando verò Ascites post febrē aliquam ardentem, aut post regium sequitur morbum, remanente adhuc in sanguine ac venis in-

emperie cal. & febrili quodam calore, ut frequentissime accidit, quæadmodum Gal. testatur fieri 6. de loc. aff. tunc nullum ex supradictis convenit, neque etiam ullum¹⁸ forte hydragogum est exhibendum, utendum est ijs quæ leniter & absque molestia purgant, tum & nonnihil refrigerantibus sed tamen aperientibus. Purgatio dari potest ex rhabarb. ʒ 1. β. vel ʒ 2. cū syr. acetoso & aqua aut decocto cichorij: aut ex speciebus diacarthami addito rhabarbaro. qualis purgatio subinde reiteranda¹⁹ est. Intermedijs tēporibus syr. de Bizant. cū aceto, aut acetosus cōpositus addito syr. de cichorio cū rhab. utiles sunt; præsertim si troch. ex rhabarb. simul dentur, aut trochisci ex berberis. qui in hoc casu multū conveniunt.

Empl. verò & ventri ad-moveri potest ex farina hordei²⁰, bolo vulgari cum succo absinthij, cichorij, aut oxalidis simul permix-

18. *Vires enim ex præcedentibus morbis debilitate, valida Cathartica non admittunt.*

19. *Ut numerus suppleat defectum gradus, & quantitatis.*

20. *Non quod proffit, sed ut ea quæ profunt recipiat ut substantiam habeant.*

tis : addito santal. rubidum
rum, & rosar. rubr. pulveris
& ol. rosac. & exiguo aceto

Cibus sit panis cum fufuribus coctus, probè fermentatus : carnes ovium ac volucrum. quæ cōdieribōdæ sunt succo, oleis, aut fructu berberis, vel succo oxalidis, vel succo limonum, vel pomorum ananarum, vel pomorum acidorum, aut aliorum similium refrigerantium & aperientium

21. Vitanda olera & herbæ, ex his enim Heraclitus hydropem sibi contraxit.

22. Metrodorus Ascite laborans bibebat quidē, sed mox evomebat Cels. id non omnibus convenire scribit. Itaque laudāus magis eques Rom. qui in hoc malo non bibere assuevit.

Paracentesis.

23. Non sanat quidem emissus humor, sed Medicina locū facit, quam intus inclusus impedit. Cels.

Vinum sit album, tenue aqua cichorij vel simili dilutū: quo tamen & parcè utendum. si sitis urgeat, os aceto & aqua permixtis abluendum: aut aceto cum modico vini.

Est verò & alia ascitæ curandæ ratio per sectionem, videlicet quam perforationem & Græci Paracentesin nominant. quæ quomodo sit faciēda apud Paulum lib. 6. c. 50. habetur. Et siquidem hæc tempestivè fiat priusquam interna viscera corrupta fuerint, prodesse potest: sed serius

ius adhibita nullam utilitatem confert.

Sic & subinde ex umbilico, propter tumoris magnitudinem & aquæ copiam oras prominente, aqua extrahitur laneo filo ipsi transmissio. Verum nec eo modo educto aquoso humore

sanitas sequitur ²⁴ si corpus multum sit extenuatum, & dolor aliquis molestus, aut viscera interiora corrupta.

nam ut Hipp. prorhet. 2. Qui ab hydrope superstes esse volet, bonis visceribus præditum esse oportet, simulque facile concoquat & bene spiret: sitque sine dolore & totum corpus æqualiter tepidum habeat, non circa extremas parcolliquatum.

De Tympanite.

Tertia hydropis species Tympanites est, in qua venter solus vehementer distenditur & pulsatus tympani modo resonat, & quidem à flatu plurimo ac se-

24. Quia eruptio umbilici, nisi ad summum ubi malum pervenerit, non supervenit.

1. Qui melius quam Gal.
causam cognovit, qui ad
minorē frigiditatem re-
fert parum sui memor;
quum de med. κατὰ
τὸ π. etiam ad calidita-
tem referat. Vide comm.
in 11. aph. l. 4.

2. Quod cum in ipsa
praxi appareat, huic
magis quam alijs Scri-
ptoribus contrariū ad-
ferentibus credendum.
Vide Aretæum l. 4. c. 1.

Curatio.

perfluo in vētris cavitatem
ut Aët. ait collecto. H
dropem siccum Hippoc
nominat, quod veluti in h
drope venter sit distentu
interim nullus in eo humen
contineatur.

Præcedūt hunc frequen-
ter tormina & circa umb
licum cruciatus, & lumbe
rum dolor. qui neque à men
dicamēto, neque aliter sobl
vitur: ut 4. aph. 11. ubi mor
bum difficilē esse Hippocr
ostēdit. cui & accedit Aët
qui eū ascite magis pericu-
losum, & minus remedijs
obedire affirmat. Paulus
à purgantibus, corpus col-
liquantibus, & urinam mo-
ventibus abstinendum sua-
det, & solis ijs quæ extenua-
re & flatus discutere pos-
sint utendum: & cucurbitas
leves toti ventri adhibēdas.
Et rectē quidem Paulus. ne-
que enim enemata aut alia
med. quicquam proficiunt,
nulla succedente per alvum
aut vesicam vacuatione.
Poterunt itaque ex Pauli
& Aëtij sententia fomenta

ex

ex feminibus flatus discu-
 ientibus adhiberi, veluti ex
 semine cumini, fœselios,
 dauci & similibus, floribus
 chamæmeli, & anethi ad-
 ditis. Deinde & cucurbi-
 ulæ absque scarificatione
 ventri admoveri. Morbus
 autem acutus est, pauco-
 rum dierum, & maximè
 ethalis.

Aëtius verò & omnem
 hydropem periculosum
 esse ait. Recentiores si-
 ne hypofarcam sive ascie-
 m, qui 6. menses excessit,
 incurabilem censent. ne-
 que enim diu vel in habitu
 corporis, vel in ventris ca-
 vitate aquosi humores con-
 tineri possunt, quin vicinas
 partes vitient, atque cor-
 rumpant. quibus corruptis
 nullam salutis spem su-
 peresse, ex Hippocr. secun-
 do prœphet. verbis satis
 manifestum. Post sangui-
 nis verò vomitionem &
 modum periculosum esse,
 hydropem, eodem lib. Hip-
 pocr. scribit: Cui, inquit
 multum sanguinis sursum

3. Neque enim humor,
 sed potissimū flatus est,
 qui morbum hunc facit.

4. Exempla vide in Ob-
 servat. medicinalibus
 R. Dodonæi cap. 38.

5. Hinc illud de Cran-
 tore qui hydropem mor-
 tuus est: Ε'πέκλυσε καὶ

σέ κ' ἐγέντως
 ἡ νόσων κα-
 κίστη.

6. Quod non nisi Princi-
 palibus visceribus lœsis,
 fieri consueverit. Ex
 Leucophlegmatia qui-
 dem neminem nisi pro-
 pter suum, vel Medicī
 errorem mori Bertrut.
 adserit; sed id sic gene-
 raliter verum non esse,
 experientia testatur.

7. Prava harum singula-
 rum constitutio; pejor
 autem multo ipsarum
 permixtio. Aret.

8. Mulier quædam cura-
 ta fuit; sed post in san-
 guinis vomitū recidens
 periit.

9. Quando ratione hydropis auctæ, & non ex alia aliqua causa supervenit. talis enim tussis potest esse non letalis.

ac deorsum eruperit & febris insuper accesserit, eunus multa aqua repletum iri timorem. atque hic hydrops brevissimi est temporis, ex quo paucissimi evadunt. Sic & omnis hydrops ex acuto morbo malus est, non enim sedat febrē, sed dolorem infert & mortem, ut Hipp. 2. prognost. statim initid. Non minus verò periculosus ac letalis est, quando cum regio accedit morbo. Solet enim in tali hydropi non solum lien male esse affectus, sed & jecinoris aliaque pars in lapideam duritiem conversa. Hydropi autem laborantibus, tussis etiam superveniēs, malum, ut Hippocr. aph. 35. lib. 6. dicit, quod quidem maximè veritatem habet, quando non sicca tussis est. Quod si vero ea quæ expuntur etiam corrupta, aut purulenta fiunt, pessimum, ac omnino lethale. ostendit enim sputum purulentum pulmonis substantiam ab aquoso humore vitiata.

c corruptam¹⁰. Ait quo-
ue Hippocr. hydrope la-
borantibus ulcera¹¹ in cor-
pore facta difficulter sana-
i. 6. aph. 8. nam copia af-
luentium humorum ea re-
picari non patitur. deinde
verò quū & illi acres mor-
dacesq; sint, ulcera reddūt
deteriora. Superveniens
autem fortis ventris fluxus
ijs qui leucophlegmatia sive
hypofarca detinētur, à mor-
bo liberat. 7. aph. 29. siqui-
dem initio¹² hydropis ipsius
accidat & priusquam ali-
quod viscus vitiatum sit. su-
perabundantia enim hu-
morum per ventrem ex-
purgata, ab hydrope ægro-
tos sanos ac liberos reddit.

10. Quod in disiectis
corporibus quandoque
visum.

11. Fiunt ut plurimum
in tibijs.

12. Nam postea à de-
bilitate virium superve-
nit.

De Renum Affecti- bus, & de Calculo.

Leſt. 124. Iulij 9,

In renum cavitate ex craf-
sis, lentis ac viscidis hu-
moribus calculi generan-
tur, vi & potentia ipsius
caloris ipsorum renū craf-
sos ac viscidos humores
in calculosam substantiam

1. Affectus hic Cœl.
Aureliano Lithiasis, &
Calculatio dicitur.

P p

2. Scribon. vocat Arenam sabulosam.
 3. Horum mictio λιθ-
 γία dicitur.

4. Præsertim si non la-
 ves, sed asperi atque in-
 æquales fuerint.

5. Atque adeò etiam ex-
 cedant. quemadmodum
 in Virgine quadam, cu-
 jus historiam cum for-
 ma Calculi, ad me misit
 Chirurgus Dordracenus
 M. Boumannus.

6. In colico dolore non
 hæret fixus, sed flu-
 ctuat.

vertentis. Sunt autem calculi admodum minuti ac
 veluti arenæ quâdoque: ac
 quando majores: & subid-
 de tam grandes ut per ur-
 teras ægre & cum dolore
 ac molestia descendunt
 quandoque verò & adeo
 magni ut renum cavita-
 tem totam impleant: quo
 tamen non nisi rarissimè
 accidit. Arenulæ autem
 ac minores calculi citatim
 molestiam cum urina fre-
 quenter descendunt: nisi
 lentis, viscidis, crassisq; hu-
 moribus eos implicari cõ-
 tingerit. quod ubi accidit
 plures coherentes magni
 alicujus calculi notam re-
 ferunt, ac cum non minori
 dolore ac gravitate des-
 cendunt, atque tunc non
 raro vomitiones accedunt,
 atque alvi obstructio tanta,
 ut non solum excrementa,
 sed ne flatus quidem libe-
 rum habeant exitum; veluti
 in dolore colico. Dolor ve-
 rò & circa lumbos ac hy-
 pochondria hæret, qui
 quandoque & adeò vehe-
 mens

mens est ut eum febris comitetur. quod ubi fit, de renum inflammatione periculum imminet. Quando autem calculus alicujus magnitudinis in motu est, & per ureteras descendit, sanguis non raro cum urina miscetur: quæ frequenter non prius sanguinea esse definit, quam calculus ex uretere in vesicam inciderit.

Curatio.

Quando igitur calculus molestus fuerit, dolores & vomitiones adsunt, & non raro urinæ tenues: dolori occurrendum erit & viæ latiores ac patentiores faciendæ quò calculus, & facilius, & cum minori molestia descendere queat: ad quod plurimum conducit enema, ex decocto malvæ, bismalvæ, parietariæ; violariæ, si calor adsit; floribus chamæmeli, meleloti, & nonnihil furfurum tritici. in hujuscemodi decocti
 1. addendæ erunt diacathol. ʒ 6. aut ʒ 1. vel

7. Tum quod fæcibus ex Intestinis subductis urinarij meatus minus premantur, atque angustentur: tum quod instar fomenti interius admoti eosdem meatus laxent.

8. Diacath. satis magnam crassie quantitatem habet. Cassia autem humectat; ideoque & vias urinarias laxat: calorem, qui à Nephritide vix abest contemperat: leniter alvum movet.

Pp 2

tantundem cassiæ medom
læ, ol. amygd. dulc. ʒ 2.
3. aut ol. amygd. & violæ
præsente calore: ana ʒ ʒ
ß. - - - -
sacchari rubri ʒ 1.
unum aut duo lutea, & 1-3,
lis exiguum. Et tale eno
ma quo citius injicitur, h
-etiam plus confert: reit
rare sæpius verò licet de
lore perseverante.

Fomenta autem sæpius
adhibenda sunt parti do
lenti: ex ijsdem herbis & aid
floribus addito sem. lini & nil
fœnigræci in aqua decoct
ctis.

Post fotum inungendub
erit locus ol. amygd. dulc
vel ol. sesamino, vel ol. sem
lini: addito ol. scorpionum
quando dolor nonnihil
fuerit remissior factus,
vel etiam ol. chamæmeli-
no, aut anethino.

9. Prius enim si adhibe-
rentur tam strenua, ne
phlegmonem Renū aut
inducant, aut maiorem
faciant, metuendum es-
set.

Poriones.

Propinare quædam con-
venit quæ vias laxiores
reddant & mitigent: quale
decoctum quod sequitur.
Rad. brusci, asparagi ʒ ʒ.
glycyrrhizæ ʒ 6. uvarum
pass.

pass. mundatur ꝯ 1. fol.
 malvæ, bis malvæ M 1. fru-
 ctuum alkekengi ꝯ 1. f. de-
 coctio in aqua q. s. ad ꝯ 1.
 ꝯ. detur mane & vesperi
 haustus. atque huic deco-
 cto cicerum rubrorum ad-
 dere expedit & sem. anisi
 ꝯ 1. aut ꝯ 1. ꝯ. quando do-
 lores remissiores fuerint
 facti: tunc enim non mo-
 do vias laxiores reddet, sed
 & ad calculi expulsionem,
 & facilem descensum non
 parum conferet. Datur ve-
 rò & quandoq; ol. amyg-
 dalar. dulc. recenter ex-
 pressi plus minus ꝯ 1. cum
 jure carnis aut caponis, aut
 cum modico vini, si febris
 non obstat; quod dolores
 valde lenit & lubricas vias
 reddit. Quod si laborans
 enema sumere recuset, tūc
 in decocto superiore, aut
 in liquore alio, veluti in jus-
 culo carnis aut caponis, aut
 in aqua betonicæ, vel simili
 infundi potest rhabbari
 ꝯ 1. ꝯ. vel 2. ac deinde co-
 lato addi mannæ electæ
 ꝯ 1. ꝯ. vel 2. vel si calor ad-

fit syr. ex infus. rosarum
 ℥ 2. vel 3.

Loco supradictorum
 med. alvum lenientium da-
 ri potest medullæ casiaë fi-
 stulæ recēter extractæ ℥ 1.
 cum rhabarb. plus minus
 ℥ 1. & sacchari q. s. in for-
 ma boli: nam alvum laxam
 & apertam esse plurimum
 refert. intestina facibus
 gravata præter quod dolo-
 rem intendunt, etiam cal-
 culi descensum impediunt,
 dum vias comprimendo
 angustiores reddunt.

Quod si verò dolor non
 fiat sedatior, aut calculus
 non descendat, in balneo
 laborans collocandus
 erit, ex decocto malvæ, bis-
 malvæ, parietariæ, floribus
 chamæmeli, meliloti. in
 quo non validè calido sed
 tepido tantummodo sedē-
 dum est, & aliquandiu: non
 tamen nimis diu immo-
 randum. subinde autem re-
 petendum est balneum, sed
 tamen non nimis frequen-
 ter: nam diuturnior in bal-
 neo mora & frequentior
 ingres-

10. Quum Epicurus cal-
 culo laborans quatuor-
 decim diebus Urinarum
 retentione fatigatus es-
 set, in pelvim aquis ca-
 lētibus plenā descendit,
 petijtq; merū ad sorben-
 dum sibi dari, atque mo-
 nens amicos ut suorum
 decretorū memores es-
 sent, inter verba defecit.
 Diogen. Laert. Rectè
 sanè per balneum laxa-
 tis vijs, vino veluti recte
 calculum emoliri cona-
 tus est. Defecit autem
 vel propter extremam
 virium debilitatem, vel
 quod nimis diu in cali-
 da moratus sit. quod ca-
 pendum monet author
 1. de Renum affectibus.

ingressus subinde vires de-
jiciunt.

Si autem simul cum cal-
culi dolore & febris ac-
cesserit, sanguis erit detra-
hendus si vires & ætas con-
senferint: & quidem ex
cubiti vena partis dolentis:
& ijs quæ adhibentur, sive
enemate sive potionibus,
refrigerantia quædam ad-
hibeantur; ut prius dictum
est.

Sedatis autem utcumque
doloribus & vijs laxiori-
bus redditis si calculus non
sponte excidat, exhibenda
erunt quæ illum expellant:
cujusmodi sunt omnia uri-
nas moventia. Prodest la-
chryma abietis: vulgo te-
rebinthina Veneta 3 3. aut
4. pondere data: quæ cal-
culos in ureteris hærentes
expellit, & simul alvum mo-
vet. utile autem hanc aqua
cichorij vel lactuæ quan-
doq; lavare, videlicet quan-
do calor adest. Conducit
verò & cicerum rubrorum
decoctum. Confert verò
ad calculi expulsionem non

II. Pro hac tamen Cy-
pria vera, quando ha-
beri potest, utendum.

parum betonica, & veronica, tum & virga aurea quæ non modo calculum expellit, sed & per lentos ac viscidos humores co hærentes, dissolvit. poteritque autem una harum, aut plures simul in vino decoqui si febris non obstat, aut in jusculo carniæ, aut in pti-sanæ decocto, si præses febris sit. aut alteri alicui decocto addi. quovis enim modo sumptæ profunt. His autem potentiores sunt rad. pimpinellæ saxifragæ: quæ & supradictis si opus fuerit addi poterunt, vel seorsum in jusculo aliquo decoqui. Ad calculum vero & arenularum expulsionem cõmendatur & elect. lithontribon: quod cum saccharo in tabellari forma formatum exhiberi potest. Si autem calor metuatur, admiscebitur speciebus hujus, vel æqualis portio, aut paulo minor specierum diatragacanthi frig. aut trochiscorum de alkekengi & cum aqua betonica

onica, & bardanæ, aut
um decocto glycyrrhizæ
c saccharo. q. f. forma-
untur tabellæ sive rotulæ.

Sunt qui specierum li-
ontripticon 2. cum san-
uinis hirci 1. & aqua mi-
j solis aut simili, aut cum
decocto cicerū exhibent.

multo autem ac frequen-
sanguinis hirci 12, ut cun-
ue etiam præparatus sit,
su abstinere præstat. exi-

ua enim quantitas nec
rangere, nec expellere po-
est: magna verò etiam no-

et. Extant verò & aliæ
multæ 13 apud varios au-
hores ad calculum fran-

gendum, vel expellendum
ommandatæ compositio-
es ex multis ac fortibus

diureticis permixtæ: item
& aquarum destillatarum
x diureticis in vino mace-

atis descriptiones. Hujus-
o dissolvuntur. Horum acidorum fontium loco vitriola-
a recentiorum nonnulli exhibent, cum certa pernecie cal-
ulo laborantiū, ni maxima cum cautione id fiat. vesicam
nim aliasque partes per quas urina labitur, adurere; at
alculum jam factum nihilominus cōminuere non potest.

12. Nam exemplū quod
adamantē frangat puto
nos decipit. Quedam
usu hujus aphthis con-
tractis mortua est.

13. Sunt nonnullæ acidæ
venæ fontium, quæ hanc
habent virtutem ut cal-
culos, qui nascuntur in

corporibus hominū, po-
tionibus discutiant. Fie-
ri autē naturaliter quod

acer & acidus succus
subest in ea terra, per
quam egredientes venæ
intingunt acritudinem.

& ita quum in corpus
inierunt dissipant quæ
ex aquarum subsidētia,
ac in corporib. & con-

crescentia offenderunt.
Vitruv. l. 8. c. 3. Probat
autem hoc fieri posse

exemplo testarum ovo-
rum, plumbi, margari-
tarum, silicum: quæ ut
lenta ac saxea sint, ace-

o dissolvuntur. Horum acidorum fontium loco vitriola-
a recentiorum nonnulli exhibent, cum certa pernecie cal-
ulo laborantiū, ni maxima cum cautione id fiat. vesicam
nim aliasque partes per quas urina labitur, adurere; at
alculum jam factum nihilominus cōminuere non potest.

cemodi autē fortibus diu-
reticis non temerē est uten-
dum: nam potentiora diu-
retica quod tenue est in
sanguine segregant, ac per
urinas expellunt, crassius
verò indurant, ut Gal. 5.
simp. facult. testatum reli-
quit. quam ob causam à
potenter diureticis absti-
nendum; nec illis utendum
vel dolore ex calculo præ-
sente, vel etiam in sanitate
præservationis causa: nisi
magna aliqua necessitas
urgeat. Sunt verò & ex fa-
miliaribus nonnulla quæ
calculi dolorem lenire, &
eundem simul expellere (si
non magnus est) queunt:
quale est florum chamæ-
meli ex vino decoctum,
quod calidum cum exiguo
pulveris nucis moschatae
propinatum dolorem sæpe
lenit, ac calculos ac arenu-
las expellit. Sic & quando
magnitudo doloris urget,
& enemata ac fots nihil
profunt, vires autem de-
ctæ ac debiles sint, nec ad
balneum ferendum satis
validæ

validæ Philonis antidoti

2. aut 3 1. ¹⁴ cum exiguo
ini, aut alterius liquoris
exhibita multum conducit:
dolores enim mox sedat &
renulas expellat, sed nec
emerè hoc med. utendum.

Victus rationem dolore
rigente tenuem esse oportet
& humectantem. juscu-
um aliquod, veluti capon-
is satis esse potest. Potus
sit ptisanæ, glycirhizæ &
uvarum passerarum deco-
ctum præsentē febre: illa
verò absente, vinū album,
tenuē, & dilutum. Quum
verò calculus in motu,
quod urinæ cruentæ osten-
dunt, liberalior etiam po-
tus concedendus & impe-
randus est, ut plurima vi-
delicet reddatur urina, quæ
calculi & arenularum est
vehiculum: citra enim ve-
hiculum descendere ac ex-
cerni nequeunt.

Liberatus à calculi do-
loribus si deinceps sanus
esse voluerit; ab omnibus
abstinere debet lentum &
crassum succum ingene-

14. *Quædam jamjam
quasi moritura hujus usu
plus arenularum quam
urinæ excrevit, & sana
eravit.*

Præservatio.

15. Sic multi post febres & in quibus frequenter usi saccharo, arenulis post laborant: concrescit enim calore, veluti saccharum candi.

16. Notavit hoc bene Alexand. Trall. l. 9. in eoque sepiissime turpes errores committuntur.

17. Quod Erasmus alicubi ex sua experientia testatur. valde enim calculosus erat.

Prognosis.

rantibus: & à fructibus frig. & crassos humorum gignentibus: à multo quoque sale & fassamentis: ita & à saccharo quibus huiusmodi usus non assuetus. At retinendum verò & sanantis tempore à multis fortibus diureticis, ne dum calculos speratur frangendos, vel expellendos, alij id generentur, ut supradictum est. Si juvat aliquando uti aliquo, quo renes arenulis expurgari queant, cicerum decoctum sufficere poterit, vel alia leviora non impense calida, ut asparagus, rad. feniculi, petroselinum, vel etiam pastinaca cum cibis cocta: sic & hodie lera ex malva, urtica, chardifolio, & similibus. Videri enim convenit ad renes expurgandos album: illis vero repurgatis, rubrum præferendum: nam dum vias reddit angustiores humores crassi minus ad renes perferri possunt; quos eo album deducit.

Ad prognosticon facit 6. aph.

aph. 6.

ph. 6. Renum & vesicæ vi-
a in senibus difficulter sa-
antur: qui tamen non tam
e nephritico seu calculi
odore, quam de alijs re-
um ac vesicæ affectibus
enit intelligendus. Huc
erò & adduci potest 4.
ph. 75. & omnes subse-
quentes ad finem usque.

De Stranguria, & Dysuria.

Stranguria & Dysuria, Lect. 126. Iulij 42.
Symptomata sunt affe-
ctuum circa vesicam & ad
urinæ excretionē pertinen-
tium. Stranguria seu urinæ
stilitudine dicitur: quando
guttatim & guttatim de-
stillat urina, & assiduam ad-
miniculationem irritationem
facit. Dysuria verò appel-
latur: quando cum difficul-
tate & conatu aliquo uri-
na redditur, sic ut & vis
quædam adhibeatur.

Stranguria autem fit, aut
propter urinæ ipsius acri-
moniam, aut propter re-
tentionis vesicæ imbecilli-

1. Atque etiam dolore,
quod particula *δύς*, *uō*
in voce *Dysenteria*, sig-
nificat. Sufficit autem
ut *Dysuria* sit, alteru-
trum adesse.

2. Expultricem etiam si
paucissima sit, irritan-
tem.

3. Retentricis, id quod tatem: ab intemperie fr̄
in vesica colligitur non factam. Stranguria propterea
retinente. Hac laboran- urinæ acrimoniam, ardor
tes Submejulos vocant. urinæ vulgò nuncupaturque

Ardor urinæ.

Incontinen-
tia urinæ.

Causa.

4. Hinc turpioris h.e.
venereæ voluptatis no-
tam in Epicuro puta-
runt Stoici, quod Dysu-
ria laboraret.

5. Aut semen corruptum
ut in Gonorrhœa vene-
rea.

6. Cap. 4.

7. In mulieribus minimè
quia uterus interponitur
inter intestinum inflam-
matum & collū vesicæ.

8. Potest & ab exhibitis
acrioribus, ut cantha-
ridib. ol. sulphuris &c.
fieri.

quæ verò propter facultatibus
imbecillitatē ipsius vesicæ
ac refrigerationē accidit
urinæ nominatur incontinen-
tiā ac præter voluntate
exitus. Acris autē redditur
urina vel propter renū
tium, vel alterius partis quæ
cum urinis humorū suorum
vitia seu cacochymiā suam
aut pus (ut quando aliqui
abscessus eruperit,) trans-
mittunt, ut ait Gal. 6. de loc. aff.
6. Sic & acris redditur
urina quādo vesica propter
vicinæ partis inflammationem
per consensum supra quā
modū incalescit: veluti propter
inflammationem recti
intestini in viris, & uteri in
mulieribus. quod & Hipp. qui
testatur 5. aph. 58. Recto
intestino, inquit, aut utero
inflammationem patiente,
urinæ accedit stillicidiū.

Urinæ autē difficultatem
sive dysuriam afferunt in-
flammatiō, abscessus, ulce-

ra,

a, intemperies, præsertim
ig. vesicæ, spiritus flatuo-
is, potētia expultrix imbe-
illis, vel in vesica calculus.

Posteaquam igitur pro-
ter acrimoniam Strangu-
a ac Ardor urina conti-
erit, exhibenda erunt om-
ia humectantia, & nonni-
il refrigerantia: ut est de-
octum ptisanæ cum juju-
is, aut sebesten, addita gly-
rrhiza. sic & dari potest

ecoctū. rad. althææ, aut
ol. ejus cum jujubis, sebe-
en, fructibus alkekengi,
m. cydoneorū & sem. 4.
ig. majoribus, addita gly-
rrhiza & uvis passis. in quo
ecocto dissolvi poterit
r. de violis aut de jujubis,
si alvus durior est, syr. ex
fusione rosarum. in talis
ecocti portione quadam
fundi poterit rhabarba-
m, ac deinde colato ad-
manna: quando videlicet
eius aut expediens fuerit
vum lubricam reddere.

non admodum tamen con-
nit alvum multum expur-
re, neque enim utile est

9. Viciū hoc, ut non
diuturnū plerunq, mo-
lestissimum tamen. Fri-
gidam mictionē nostra-
tes appellant.

Curatio. Ejus causa ut
I. Ex ardo- plurimū usus
re urinæ. cerevisiæ re-
centioris, accedente ex-
terno totius corporis,
& præsertim pedum fri-
gore.

10. In magna quantita-
te: quia pauca cito ad
vesicam non pertingunt.
Quod si æger magnam
quantitatem simul de-
tractet sumere, frequen-
tia adsumptionis id pen-
sandum: nam quod pau-
cum est magnam acri-
moniam diluere, vel ob-
tundere non potest.

11. Nam ardorem uri-
næ etiam sanis fortia in-
vehunt medicamenta.

12. *Troch. diaphysalidon* Græcis dicitur.

13. *Vt eluatur quod in Urethra, præsertim in flexu ejus circa Perinæum hæerere solet; ipseque meatus oblinatur.*

14. *Quæ duo ob tenuitatem non concresecunt ingruios.*

Topica.

humores à vijs urinæ dēstīnā-
tere. Possunt vero & syr. de or-
violis, de jujubis, aut de melle, ei-
pavere cum aquis destīnātibz
propinari, ut cum aquis mu-
ctucæ, intybi, nenupharis, portu-
lacæ, plantaginis, nigellæ, &
similium. Vtiles quoque pōp-
veres ex rad. althææ, & ad-
ditibus alkekengi, glycyrrhizæ,
za, sem. 4. cōmunibus audiat
joribus & sem. papaveris, &c.
Sic & conferunt troch. de melle
& alkekengi tam illi quæ illi
Mesue, quam alij qui à Pēsi-
lo & Aëtio describuntur.
Confert & conditum multo
conserva flor. malvæ, & de
conserva flor. nenupharis, &
addito sem. malvæ, pūq; de
jujubarum aut sebesten, & de
ciebus diatragacanthi frīdū
cum syr. de violis, aut de or-
jubis, aut utroq; permixtum
Per virgam, si dolor vehē-
mētius urgeat, infundi pōt
terit 13 muccago sem. c. melle
don. psyllij, aut malvæ cuo
decocto ptisanæ facta
itē & hydromeli dilutum
atque post ejus egressum mul-
lac asinæ, aut mulieris. Pd. e-
terat

rit & perinæum & pubes
 ngi ol. nenupharino ac
 iolaceo. Cibus sit ptisana,
 el cum ea¹⁵ decocta. Co-
 ui etiam cum cibis lactu-
 as, intybum, & malvas
 onducit. Melones, pepo-
 es, cucurbitæ, poma, &
 ujsmodi fructus frig. ac
 umidi permittuntur. Potus
 it ptisanæ decoctum, vel
 enuissima cervisia¹⁶ aut
 tiam vinum album dilu-
 um. Larga autem & co-
 iosa potatio etiam albi
 ic tenuis vini¹⁷ conducit;
 quando videlicet tantum
 ibitur ut priusquam cōco-
 qui queat ad vesicam, def-
 cendat & excernatur: quod
 & Hippocr. lib. de affect.
 satis probare videtur. Con-
 ducit, inquit, (in stillicidio
 videlicet urinæ) intrinsecus
 corpus humectare; Alvum
 quoque per cibos à quibus
 fluida fiat; vesicam verò
 per potus à quibus urinæ
 plurimum fundatur.

Stranguria autem quæ
 uteri aut recti intestini in-
 flammationem comitatur

15. *Veluti jus pulli cum
 ptisana decocti, quod
 lentore, & pinguedine
 quadam sua, omnes uri-
 næ meatus velut incru-
 stando munire potest.*

16. *Recentior: nam mox
 acrimoniam ob tenuita-
 tem suam contrahit.*

17. *Quale Rhenanum
 est. cujus calfacti usu so-
 lo, præsertim si nux my-
 ristica immaceretur, fla-
 tuosa Dysuria curari so-
 let.*

II. Strangu-
 ria ex inflam-
 matione.

Qq

non aliam requirit curatio-
nem quam ipsæ postulant
inflammationes quibus sa-
natis stranguria cessat.

III. Strangu-
ria ex frigida
intemperie.

Stillicidium verò urinæ
quod citra dolorem con-
tingit & urinæ quoddam
est involuntarium proflu-
vium, quale senioribus ac-
cidit partim ex debilitate,
partim ex refrigeratione
resolutis cervicis vesicæ
musculis contrariam om-
nino curationem requirit:
calida ac sicca omnia con-
veniunt. Convenit & vini
potio: quam & Hipp.
aph. 48. lib. 7. stranguriam
solvere ait: à causa nempe
ut Gal. interpretatur frig.
ortam. quamquam & aliam
si largius bibatur curare
queat ut jam ante dictum
est. Pubem & perinæum
in hoc affectu ungi utile
est ol. vulpino, costino, lau-
rino, vel etiam de euphor-
bio, & si quæ sunt alia quæ
vesicam calfacere & reso-
lutis partibus conducere
queant. Differt autem af-
fectus iste non parum à
Dia-

18. Meracioris, & po-
tentioris. id enim vox
Σώφρονος apud Hipp. sig-
nificat.

19. His enim subjacet
Sphincter cujus actio,
Urinam nempe conti-
nendi, laesa est.

Diabete: nam in hoc stillicidio urina paulatim, guttatim nec multa simul excernitur, neque ulla sitis laborantem premit. In diabete autem multa, copiosa & frequenter urina redditur: aliquando & in fomino ignorantibus profluit: & sitis magnaue bibendi cupiditas assidue assunt.

Dysuria sive difficultas urinæ curari debet pro efficientium causarum conditione. Si inflammatio vesicæ^æ hujus causa fuerit, vena erit secanda & quidem interior dextri cubiti. Inflammationem autem ostendit circa pubem ac perinæum simul cum febris continua dolor vehemens, & urinæ difficultas. De hujuscemodi dysuria scribit Hipp. 7. aph. 48. ubi ait: Urinæ stillicidium, & difficultatem venæ sectio solvit. nec enim ad ullum vesicæ affectum venæ sectio conducit quam ad inflammationem. Vena secta uti-

Le&. 127. Iul. 13.

De Dysuria.

I. Ab inflammatione.

20. Cum plenitudine seu plethora, & virium robore.

Q9 2

le erit enema quale in dolore ex calculo, additis refrigerantibus; veluti quansop is do febris cum calculi adetbs illo dolore. Danda etiam quap ma in ardore urinæ convevno niunt. Cum syringa quoup s que in vesicam injiciendansiol sunt ibidem dicta. Oleio etiam ijsdem utendum, auis illorum loco cataplasmanisq imponendum ex rad. bifid. b malvæ decoctis & malacm væ ac lactucæ folijs, cum oleis amygdal. dulc. & vio. iv larum: Observata victus ratione ut in Ardore urinæ, Post inflammationem ab- fcessus & vesicæ ulcera Gal. inter dysuriæ causas numerantur cōment. aph. 48. lib. 7. Horum autem signa sunt sanguinis, puris & squamularum mictus cum urinæ graveolentia, ut hipp. aph. 4. aph. 81. Si sanguinē, inquit, aut pus minxerit aut squamulas, & gravis adsit odor, vesicæ exulcerationem significat. & præsertim quidem si dolor circa anum ventrem pecti-

21. *Non diu consistit. Statim enim rumpitur & fit ulcus.*

22. *Quâ plus quod à vesica, ab illo quod ex renibus, distinguuntur.*

nem ac foemur incidat, ut
mox præcedens habet aph.

Existente igitur in vesica
ulcere sive ex abscessu ru-
pto, sive alia de causa facto,
abstergentibus erit uten-
dum & ijs quæ urinas ali-
quo modo, sed leviter
moverent. Hydromeli utile
est, & aqua decoctionis
ptisanæ cum melle rosato.
Prodesse poterit decoctum
ex rad. rusci, asparagi, gra-
minis, glycyrrhizæ, fru-
ctuum alkekengi, quibus
& addi poterit virga aurea:
quæ præter quod abster-
gendo clementer urinas
moveret, etiam consolidandi
ulcera potentiam obtinet.
Per syringam utiliter in ve-
sicam injicitur hydromeli
vel aqua decoctionis hor-
dei cum melle rosato. In-
unctionibus, aut cataplas-
matis si modo non magnus
adsit dolor, nihil opus. Vi-
ctus ratio non refrigerans
sed temperata esse debet,
ac ex optimis bonique ali-
menti cibis. ab omnibus quæ
urinæ acrimoniam inten-

11. Ex ulcere,

23. Nam validiora pro
caloris majoris modo
etiam magis acria sunt,
atque acriorem urinam
faciunt; ideoque malum
augent, non minuunt.

24. Quæ omnia aut nul-
lum, aut exiguum ca-
lorem habent.

25. Quia dolor quum
non assit ejus ratione
non conveniunt: & sor-
didiora reddunt ulcera.

Q 9 3

dere possunt, abstinendum: ut sunt multa aromata & herbæ quædam acres, ut eruca, sinapi, nasturtium, radicula, allium, cape, & similes.

III. Ab intemperie frigida.

Quando frigida intemperies & ut Gal. ait, flatus urinæ difficultatem fecerit, præsertim aliquo humore frig. vias obstruente, utendū cal. ac diureticis urinas moventibus. Ex frig. autem dysuriam fieri apparet, quando nulla inflammationis, nulla abscessus, aut ulceris, aut calculi vesicæ signa assunt; neque calor juxta vesicæ regionem sentiatur; & potissimum si ab externo frigore vesicam lædi contigerit.

Curatio.

In hoc casu conveniunt diuretica etiam fortiora: ut sunt petrosel. apij vulgaris, petroselini Macedonici dicti, & pimpinellæ saxifragæ tum rad. tum semina. item & ²⁶ betonica herba ac ejus rad. sem. præterea feselios, dauci, amios, milij solis & similia. ex quibus decocta

26. Quæ sola cum vino bibita calculum nonnunquam expellit. & valde diuretica est, licet ad caput tuum valere putatur.

Decocta cum aqua aut cum
vino, si opus fuerit, parari
possunt; aut pulveres qui
cum vino exhiberi queunt.

Huc facit etiā elect. lithon-
thripticon potenter urinas
provocās; cujus specierum
3 i. cum decocto, aut alio
liquore dari potest. Fetus
verò ex parietaria, malva,
anetho, arthemisia, floribus
chamæmeli ac meliloti uti-
les sunt. Sic & cataplas-
ma ex parietaria cum ol. li-
liorum pubi impositum.
Vnctiones similiter con-
ducunt ex ol. liliorum, cha-
mæmelino, scorpionū ad-
dita axungia 27 cuniculi.
Victus ratio calidior esse
potest. Rad. petrosel. fœ-
niculi, ac pimpinellæ saxi-
fragæ cum cibis utiliter
decoquantur. Potus vinum
album, tenue aut cerevisia
tenuis, nec turbida nec aci-
da, aut hydromeli.

Propter calculum autem
urinæ difficultas, sanari
non potest nisi illo sublato.

Difficiles autem & ægrè,
aut non curabiles affectus

27. *Quæ in provocanda
urina etiā ab interme-
diæ ætatis medicis, com-
mendatur.*

A calculo.

Prognosis.

Q 9 4

28. De qua tamen intelligi ex mento hippocr. non posse aph. liquet ex sequentibus. Nisi febre superveniente urina copiose fluxerit, quod & Gal. in comment. satis ostendit.

stranguria ac dysuria in senioribus sunt: ut 6. aph. 6. de quo prius dictum. Quibus verò ex urinæ stillicidio ileos supervenit in 7. diebus pereunt, ut Hipp. aph. 44. lib. 6. Quod de stillicidio ac difficultate urinæ veritatem habere potest propter magnam aliquam vesicæ inflammationem: nam si adeo magna hæc fuerit, ut etiam intestina hinc dolore afficiantur, lethalis habenda.

De Ischuria.

1. Fit læsa Naturali, non Animalis Vesicæ facultate.

Causæ.

Ischuria sive urinæ retentione ab iisdem causis fieri potest à quibus difficultas: & à talibus facta similibus quoque rem. curari debet. Possunt verò hujus & aliæ esse causæ: veluti obstructio vel renum, vel meatus vesicæ: quandoque verò & duræ faeces in intestino recto hærentes, quæ cervicem vesicæ comprimantes urinæ exitum prohibent. Renum obstru-

obstructionē testatur pon-
 deris circa lumbos sensus
 et quæ præcesserunt urinæ
 enues: circa vesicam nul-
 lus tumor aut alterius mor-
 bi signa. Obstruuntur au-
 tem renes vel à calculo,
 vel à crassis viscidisque hu-
 moribus. In utroque casu
 utile enemata, aut leve ali-
 quod purgans med. adhi-
 bere: ac deinde balneum,
 ut in dolore à calculo. Ve-
 sicæ autem obstructionem
 non raro: dolor & tumor
 supra pubem ostendit. Ob-
 structio etiam vel à calcu-
 lo, vel à crassis fit humori-
 bus. Occurrendum au-
 tem huic immissione ca-
 theteris. si enim calculus
 obstructionem fecerit, ca-
 thetere repulsus liberum
 relinquet urinæ exitum.
 Prodest verò & in hoc ca-
 su hominem supine cuban-
 tem crura habere valde
 elevata, & corpus ejus
 nonnihil concuti. sic enim
 calculus è meatu excidit.
 Quod si verò non calculus,
 sed crassi humores meatus

2. Vel à maxima copia
 arenularum, ut in am-
 plissimo viro cujus Rem
 sinister, Urina propter
 ingentem arenularū co-
 pia retenta, multum su-
 pra distentus erat.

3. Et quidem acerrimus
 quod se ditiosi illi qui in
 obsidione Hierosolymo-
 rum postrema, ervis in
 Oream inmissis, ac
 Urine exitu sic interce-
 pto cibos ob famem ab
 alijs occultatos, extor-
 quebant.

4. Vel à Caruncula, seu
 Verruca in Orethra ex
 Gonorrhæa venerea, sub-
 nata.

5. Fortiora, quia quæ abstergent leviter hic nihil proficiunt.

6. Quæ in superiori parte, aut latere Penis facienda; quod inferius facta sectione vulnus in fistulam plerunque desinat.

7. Expressione, suctione, aut tractione quæ fit ad vacuum. Vide Prosperum Alpinum de medicina Ægyptiorum.

obstruant, & catheter immis-
missus parum profuerit; fo-
tibus & balneis utendum;
postea etiam diuretica si
opus fuerit, & propidanda,
qualia in dysuria à causa
frigida.

Si autem calculus in
meatu virgæ hæreat aut se-
ctione, & aut alio modo
eximendus erit.

Si autem duræ fæces in
intestino recto hærentes
urinæ exitum remorentur,
cujus suspicionem facere
potest alvus prius dura &
astricta quam fuerit urina
suppressa. In hoc casu ene-
mata injicienda sunt; quæ
sæpe sola expurgatis faci-
bus profunt: atque idcirco
in omni urinæ suppressione
& utiliter adhibentur, &
ab ipsis curatio incipitur.

F I N I S.

Auctores cum sacri tum pro- fani in hoc Opere citati.

Adrianus Iunius.
Aegineta.
Aelianus Spartanus.
Aetius.
Agrippa.
Alcinous.
Alexander Trallianus.
Anastatus Lusitanus.
Anastasianus.
Andernacus.
Antoninus.
Anthonijs ab althomari.
Anthologia Epigrammat.
Apuleius.
Aretaeus.
Arnobius.
Aristoteles.
Arrianus.
Athenaeus.
Averrhoës.
Avicenna.
Basilus Magnus.
Bertrutius.
Botallus.
Capovaccius.
Cardanus.
Caelius Aurelianus.

Cedrenus.
Clemens Alexandrinus.
Columella.
Commentator Thycididis.
Commentator in Horatiū.
Cornelius Celsus.
Cornarius.
Crato.
Curtius.
Diodorus Siculus.
Diogenes Laertius.
Dion Cassius.
Dionysius Aegaeus.
Dioscorides.
Ecclesiasticus.
Epictetus.
Erasmus.
Eusebius.
Eustathius.
Eutropius.
Fernelius.
Festus.
Fracastorius.
Fuchsius.
Galenus.
Gaza.

Gel-

Gellius.
Georgius Logotheta.
Gordonius.
Gulielmus de Saliceto.

Heraclides Ponticus.
Henricus Stephanus.
Herapollo.
Herodianus.
Herodotus.
Hesiodus.
Hieronimus Mercurialis.
D. Hieronymus.
Hippocrates.
Hollerius.
Homerus.
Horatius.
Horus.

Iacobus de partibus.
Ioannes Heurnius.
Ioannes Leo.
Ionas.
Iornandes.
Ioubertus.
Isidorus.
Iulius Firaucus.
Iulius Pollux.
Iuvenalis.

Langius.
Lemnius.
Leonicens.

Livius Patav.
Lucianus.
Lucilius.
Macer.
Marcellus.
Martialis.
Massaria.
Mezues.
Michael Saronarola.
Montanus.
Moyfes.

Nepos.
Nicander Scholiast.
Nicephorus Calist.
Nicephorus Gregorius.
Nicolaus Alexandrinus.
Niger Medicus Patavinus

Oddus de Oddis.
Olaus Magnus.
Olympiodorus.

Paulus Diaconus.
Paracelsus.
Palladius Sophista.
Pausanias.
Philo.
Philostratus.
Phocion.
Plato.
Plautus.
Plinius Secundus.

Plutarchus.
Polybius.
Proco.
Prosper Alpinus.
Radzevil.
Rhazes.
Regum lib.
Renod.
Rondeletius.
S. Aurelius Victor.
Salius.
Samoniacus.
Scaliger.
Scribonius Largus.
Seneca.
Simocatus.
Solinus Polyhistor.
Soranus.
Stephanus Atheniensis.
Stobaeus.
Suetonius.
Suydas.

Tertullianus.
Theocryptus.
Theodorus Priscianus.
Theophrastus de histor.
plant.
Theophilactus.
Tyro Maximus.
Trotula.
Thucydides.
Valerius Maximus.
Valescus de Taranta.
Varro.
Vegetius.
Vesalius.
Vindicianus.
Vitruvius.
Volaterranus.
Wierus.
Xenophon.
Xiphilinus.

In

In Praxin
D. REMBERTI DODONÆI
recens in lucem editam.

Magni Praxin habes en DODONÆI,
Votum quæ tenuit peritiorum,
Certè degenerem nihil Parenti,
Quamvis posthuma: nam manum sagacis
Experta est medicam SEBASTIANI,
Phæbæâ AMSTELIIS qui primus arte.
Tandem hic non benè scrineis latentem,
Fecit promeritam videre lucem.
Quin si quid minus obvium, minusve
Dictum, quod cupidas moretur aures,
Notis eliquidat probis, politis.
Non hîc cura viri stetit, sed omne
Artis quod latet abditum recessu,
Cordatâ dedit eruditione.
Auctori Scholion quam DODONÆO
Pulchrè consonat, & ille huic vicißim!
Fulta his stabit Ἰατρικὴ columnis,
Et florem cito pristinum resumet.
Quin, Coius quoque quod Senex stupeſcat,
Vitam quod faciat longam videbis,
Artem quod faciat brevem videbis.

G. Rijchius Med.

Præcipua menda sic emendanda: Prior numerus paginam, posterior lineam, a textum, b parergon denotat.

1. 5. b quem
 1. 13. b ephemeræ 19. re-
 pertum
 2. 7. b peripheriam
 6. 17. b Quod ad feb.
 8. 29. a lupulum,
 4. 23. a sem.
 13. pr. b quas
 15. 10. a oxalidis: syr.
 16. 8. a assueverunt
 19. 19. b Komulus
 8. penult. a omnes in-
 spiramus, qui si
 19. antep. b at medicus
 13. 18. b reddat. 21. fa-
 ctum Xiphilinus
 16. 4. b guaiaci
 8. ult. b cava
 19. 27. a ficuum
 4. 5. b tamen non
 15. 9. a excepto tamen
 7. ult. a Si
 100. 17. a somnus pe-
 nult. proficientibus
 103. 12. a omnino
 105. 12. b magna
 106. ult. b intelligendum
 107. 25. a tamen odore
 cito molestæ.
 109. 12. a prohibendos
 28. induitur. b ult.
 confectum.
 11. 22. a sed ijs, quæ
 4. b non habetur
 13. 18. b allatum
 114. 4. b fere solet in for-
 minis 16. a copiosæ
 autem vacuationi
 116. 11. a gravent,
 117. 3. b turbare 6. Ti-
 mæo.
 118. 4. b angustiam 9. a
 possumus
 122. antep. b adversatur
 7. a debet
 123. 8. b minerale
 126. 9. a alopecia, antep.
 ophiafis
 127. 21. a ratione 20. b
 sole, 27. magnæ.
 135. 2. a venerea (stump
 137. 6. b reperire: mole-
 138. 3. b meatū habebat,
 140. 5. b fere
 146. 17. a exiguus
 150. 11. a fæces educat,
 152. 2. a ardentis
 153. 5. b nimium
 158. 9. b Tardar.
 159. 14. b recepto cura-
 bat, hoc. 17. humores
 168. 22. b præternaturali
 171. 23. a somnus
 174. ult. b attractum. pr.
 a ab aëre
 179. 10. b Tardar.
 181. 22. a Cum affluxu
 183. 21. b succus
 186. 4. a vacuatione
 188. 22. b tamen hoc

190. penult. b Antholo-
 196. 4. b alijs (gico
 202. ult. a regis Saporis,
 208. 19. a & contra
 209. 11. a amœna. penult.
 b excrevisse
 210. 12. b immittatur
 212. 28. b reddant
 15. a est: in his
 213. antep. b hellenic.
 216. 4. b quem (xum.
 218. 14. b ascendunt ple-
 221. 27. a utcunque
 226. pen. a apomelite
 228. pen. a vulneratio
 229. 22. a offensam,
 11. b sanguis
 230. ult. b illi
 239. 15. b mentiebantur:
 Leviozem
 243. 4. a inanitione
 250. antep. b palpitatio-
 ne ult a apoplexiæ
 252. 12. b cydarim
 16. platearum
 258. 3. b spuma. 15. ce-
 rusæ 6. a immittenda
 259. 5. b philosophiam
 non tanquam
 263. 10. b ignorantia id,
 266. 29. a vesicatorium
 270. 6. a lithmum
 274. penult. materiam
 283. 19. a oculos epi-
 phora 28. orthopnœa
 284. 4. a provenire,
 285. ult. a capiti
 288. 10. a fuerit; aut
 291. 9. b tussim

298. 2. b $\omega\epsilon\iota$ 22. jecoriorum
 12. a febriē fieri (pocr
 303. 8. a crasso 28. Hippo
 308. 7. b devestiri. 18. cau
 sum cœpisse à thurib
 313. 16. a menses (suffitu
 337. 28. a si qua
 338. 14. a ubi ad
 344. 11. a diacodion
 362. 20. a copioso
 381. 17. b fœtent
 405. 4. a vinculis
 411. 6. a premuntur
 421. 4. b $\pi\lambda\acute{\alpha}\delta\omicron\nu$
 425. ult. a calida
 426. 27. b eum ex pe-
 nult. Asclepiades
 427. ult. a cruditatis quo-
 438. 10. b spasmum (que
 445. 10. a citrinorum
 454. 23. a lævitas
 466. 4. a lienterix
 492. 7. b lædere
 500. 5. b similitudinem
 5. a certa sunt;
 524. 9. a flatulenta
 538. 4. a & similibus.
 19. diacurcuma
 539. 6. a supervenit:
 7. angustis
 541. 10. b $\chi\omicron\lambda\acute{\omega}\delta\eta\varsigma$; an-
 tep. confluxus fit,
 551. 8. b $\gamma\upsilon\sigma\iota\varsigma$ $\iota\kappa\pi\epsilon\rho\epsilon\iota\varsigma$
 592. 4. a timor est.
 600. 11. a præsens
 601. 21. a commendatæ
 In hexasticho Coryphæis
 Τέλα.

*Appendix mendorum emendatorum præ nimia
festinatione antea omifforum.*

fine Præfationis, oc-	per. 6. a ex qua
cupationum agmina,	128.14. b educant.
non nimis	133.18. b per consen.
.lin.20. punctularis.	141.26. a oleo rosaceo,
3. a vires ferāt, 12. len-	154. pr. b cucurbitulis
os 21. b Asclepiades	155.25. a elect. Indum,
14. sua sponte	174.15. b Vidi interf.
antep. b Oddum	190. pr. b phœnigmus,
7. b Vnde diffic.	321. ult. a phthisis
7. a progressu antep.	335.9. b irritantur.
liu perseverant,	359.25. a difficili
7. b adustione	364.16. b invenisse
22. a paroxysmū sub-	366.17. a annumerari
sequente, pen. b quar-	396.8. b <i>κνίσσα</i>
anam sperantib.	424.18. a <i>Βεγδονεψία</i>
6. a additis & medi-	431.7. b crassiusculè
camentis convenienti-	445.6. b sistat.
23. a vere si (bus.	465.11. b narcoticā
pr. a mittendus;	478.11. b Cedren.
4. b Eustath.	502. pen. b vermem
6. b Razis loq.	504.5. a certa sunt;
ult. a paulo lib.	509.5. b cruditate hu-
20. b <i>Αγρόμ</i> ,	morum
ult. a lethargici	543.2. b flavam
6. b Clemens Alex.	560.24. a agarico
8. b inguinaria	561. pen. b venæ
22. b veneno mixtū,	564. ult. b turbatæ.
9. a meliorem	567.2. b distendantur
antep. a condiri	581.13. b reprehendit
29. a æger aliquo	584.5. b poscentes
2. b tamen lev.	607.7. a ardor urinæ
4. a collectus vom.	611.2. b dysuria
2.11. a tamē compos.	614. pen. b caput tantum
4.8. b habent	617.3. b ren
7. pr. b tamen hum.	Cetera verò correctu fa-
2. antep. b enim in su-	cilima sunt.

